




Ghidul Plantelor medicinale uzuale

Folosirea plantelor medicinale se bucură de o veche tradiție la noi în țară. Părintele istoriei, Herodot, a scris despre iscusința geto-dacilor în utilizarea lor multiplă. Aceasta se explică, pe de o parte, prin faptul că în mediul natural favorabil de la noi s-a dezvoltat o floră remarcabilă, în general, și medicinală, în special (pe teritoriul României vegetând peste 3700 de specii, adică mai mult de jumătate din cele ce vegetează în întreaga Europă, din care peste 700 cu proprietăți medicinale), iar pe de altă parte, datorită faptului că populația autohtonă în secolele și milenii de dăinuire neîntreruptă pe același teritoriu, îmbrățișând ocupații strâns legate de natură, a avut prilejul să o cunoască îndepărtat, să o iubească și să o folosească în variate scopuri.

FLORENTIN GRACIUN
MIRCEA ALEXAN
CARMEN ALEXAN

Ghidul Plantelor medicinale uzuale





redactor
MIHAI ZAHARIA

coperta și prezentarea grafică
arh. JACK COHN

Tehnoredactor: Gh. Docu



Ghidul plantelor medicinale uzuale

text

ing. FLORENTIN CRĂCIUN

dr. biolog MIRCEA ALEXAN

ilustrații

biolog CARMEN ALEXAN

BUCUREȘTI 1994



Ghidul plantelor medicinale uzuaje

CUPRINS

Introducere 10

I. Plante fără flori sau cu flori fără învelișuri florale colorate . . .

A. Plante fără flori

Lichenul de piatră (<i>Cetraria islandica</i>)	14
Coadă calului (<i>Equisetum arvense</i>)	16

B. Plante cu flori fără învelișuri florale sau fără învelișuri florale colorate

Jneapănul, Pinul montan (<i>Pinus montana</i> ssp. <i>mughus</i>)	18
Ienupărul (<i>Juniperus communis</i>)	20
Mesteacănul (<i>Betula verrucosa</i>)	22
Stejarul (<i>Quercus</i> sp.)	24
Nucul (<i>Juglans regia</i>)	26
Popul negru (<i>Populus nigra</i>)	28
Salcia (<i>Salix</i> sp.)	30
Dudul (<i>Morus</i> sp.)	32
Hameiul (<i>Humulus lupulus</i>)	34
Urzica (<i>Urtica dioica</i>)	36
Viscul (<i>Viscum album</i>)	38
Troscotul (<i>Polygonum aviculare</i>)	40
Reventul (<i>Rheum</i> sp.)	42
Frasinul (<i>Praxinus excelsior</i>)	44
Ghimpele, Holera (<i>Xanthium spinosum</i>)	46
Porumbul (<i>Zea mays</i>)	48
Pirul medicinal (<i>Agropyron repens</i>)	50
Obligeana (<i>Acorus calamus</i>)	52

II. Plante cu flori albe

A. Corola cu petale libere

Ipcărigea, Ciuinul alb (<i>Gypsophila paniculata</i>)	56
Săpunarița, Ciuinul roșu (<i>Saponaria officinalis</i>)	58
Traista ciobanului (<i>Capsella bursa pastoris</i>)	60
Păducelul (<i>Crataegus</i> sp.)	62
Zmeurul (<i>Rubus idaeus</i>)	64
Murul (<i>Rubus fruticosus</i>)	66
Fragul (<i>Fragaria vesca</i>)	68
Porumbarul (<i>Prunus spinosa</i>)	70
Cireșul, Vișinul (<i>Cerasus</i> sp.)	72
Salcinul (<i>Robinia pseudacacia</i>)	74
Fasolea (<i>Phaseolus vulgaris</i>)	76
Nalba mare (<i>Althaea officinalis</i>)	78
Crășinul (<i>Rhamnus frangula</i>)	80
Chimionul (<i>Carum carvi</i>)	82
Anasonul (<i>Pimpinella anisum</i>)	84
Coriandrul (<i>Coriandrum sativum</i>)	86

B. Corola cu petale unite

'Volbura (<i>Convallulus arvensis</i>)	88
Ungurașul (<i>Marrubium vulgare</i>)	90
Urzica moartă albă (<i>Lamium album</i>)	92
Roinița (<i>Melissa officinalis</i>)	94
Măghiranul (<i>Majorana hortensis</i>)	96
Busuiocul (<i>Ocimum basilicum</i>)	98
Socul (<i>Sambucus nigra</i>)	100
Coadă șoricelului (<i>Achillea millefolium</i>)	102
Mușetelul (<i>Matricaria chamomilla</i>)	104

III. Plante cu flori galbene

A. Corola cu petale libere

Rostopasca, Negelarița (<i>Chelidonium majus</i>)	108
Muștarul alb (<i>Sinapis alba</i>)	110
Muștarul negru (<i>Brassica nigra</i>)	112
Trei frați pătați (<i>Viola tricolor</i>)	114
Sunătoarea (<i>Hypericum perforatum</i>)	116
Cătina (<i>Hippophaë rhamnoides</i>)	118
Coadă racului (<i>Potentilla anserina</i>)	120
Cerențelul (<i>Geum urbanum</i>)	122
Turița mare (<i>Agrimonia eupatoria</i>)	124
Sulfina (<i>Melilotus officinalis</i>)	126
Teiul (<i>Tilia</i> sp.)	128
Feniculul (<i>Foeniculum vulgare</i>)	130

B. Corola cu petale unite

Ciuboțica cucului (<i>Primula officinalis</i>)	132
Luminărica (<i>Verbascum</i> sp.)	134
Pătlagina (<i>Plantago</i> sp.)	136
Ghințura galbenă (<i>Gentiana lutea</i>)	138
Iarba mare (<i>Inula helenium</i>)	140
Pelinul (<i>Artemisia absinthium</i>)	142
Tarhonul (<i>Artemisia dracunculus</i>)	144
Podbalul (<i>Tussilago farfara</i>)	146
Arnica (<i>Arnica montana</i>)	148
Gălbenelele (<i>Calendula officinalis</i>)	150
Schinul (<i>Cnicus benedictus</i>)	152
Păpădia (<i>Taraxacum officinale</i>)	154

IV. Plante cu flori roșii

A. Corola cu petale libere

Macul roșu de cîmp (<i>Papaver rhoeas</i>)	158
Coacăzul negru (<i>Ribes nigrum</i>)	160
Măceșul (<i>Rosa canina</i>)	162
Osul iepurelui (<i>Ononis spinosa</i>)	164
Răchitanul (<i>Lythrum salicaria</i>)	166
Răskoagea, Sburătoarea (<i>Chamaenerion angustifolium</i>)	168
Nalba de grădină (<i>Althaea rosea</i> var. <i>nigra</i>)	170
Nalba de cultură (<i>Malva silvestris</i> var. <i>mauritanica</i>)	172
Nalba mică, Cașul popii (<i>Malva neglecta</i>)	174

B. Corola cu petale unite

Afinul (<i>Vaccinium myrtillus</i>)	176
Merișorul (<i>Vaccinium vitis idaea</i>)	178
Plămînița (<i>Pulmonaria officinalis</i>)	180
Talpa giștii (<i>Leonurus cardiaca</i>)	182
Salvia (<i>Salvia officinalis</i>)	184
Cimbrul de grădină (<i>Satureja hortensis</i>)	186
Șovîrvul (<i>Origanum vulgare</i>)	188
Cimbrisorul de cîmp (<i>Thymus serpyllum</i>)	190

Cimbrul de cultură (<i>Thymus vulgaris</i>)	192
Țintaura (<i>Centaurium umbellatum</i>)	194
Valeriana, Odoleanul (<i>Valeriana officinalis</i>)	196
Brusturele (<i>Arctium lappa</i>)	198
Anghinarea (<i>Cynara scolymus</i>)	200
Armurariul (<i>Sylibum marianum</i>)	202
V. Plante cu flori albastre sau violete	
A. Corola cu petale libere	
Lemnul dulce (<i>Glycyrrhiza glabra</i>)	206
Inul (<i>Linum usitatissimum</i>)	208
Scaiul vinăt (<i>Eryngium planum</i>)	210
Stinjenelul (<i>Iris germanica</i>)	212
B. Corola cu petale unite	
Tătăneasa (<i>Symphytum officinale</i>)	214
Levănțica (<i>Lavandula angustifolia</i>)	216
Mătăciunea (<i>Dracocephalum moldavica</i>)	218
Isopul (<i>Hyssopus officinalis</i>)	220
Menta, Izma bună (<i>Mentha piperita</i>)	222
Ghințura albastră, Luminărica pământului (<i>Gentiana asclepiadea</i>)	224
Albăstrelele (<i>Centaurea cyanus</i>)	226
Cicoarea (<i>Cichorium intybus</i>)	228
Index de denumiri populare românești	230
Index de denumiri științifice	231
Index de denumiri în limba franceză	232
Index de denumiri în limba germană	233
Index de denumiri în limba maghiară	234
Index de denumiri în limba rusă	235
Dicționar de termeni fitoterapeutici	236
Bibliografie selectivă	239



FRUCTE



FRUNZE



COAJĂ



MUGURI



FLORI



PLANTA ÎNTREAGĂ



RĂDĂCINA



CODIȚE




SEMINȚE



TAL



STIGMATE





INTRODUCERE

Le întâlnim la tot pasul, dar necunoscându-le nu le dăm atenție: un fir de iarbă, o floare, alt fir de iarbă... și-n seva lor, în substanțele active depozitate în „cămărilor” celulelor pot sta vindecarea multor suferințe, alinarea multor dureri.

Asistăm astăzi la un paradox: în timp ce utilizarea plantelor medicinale este într-o vertiginoasă ascensiune (atât ca materii prime în industria de medicamente, cât și sub forme simple, casnice), tot mai puțini sînt cei care le pot recunoaște și recolta. Este în parte o consecință a urbanizării, a îndepărtării celei mai mari părți a populației de ocupații în legătură directă cu natura, care pentru cei mai mulți dintre noi a devenit doar un cadru de recreere la sfîrșit de săptămînă sau în vacanțe, fugare și superficiale prilejuri de a mai păstra contactul cu ea.

Folosirea plantelor medicinale se bucură de o veche tradiție la noi în țară. Părintele istoriei, Herodot, a scris despre iscusința geto-dacilor în utilizarea lor multiplă. Aceasta se explică, pe de o parte, prin faptul că în mediul natural favorabil de la noi s-a dezvoltat o floră remarcabilă în general și medicinală în special (pe teritoriul României vegetînd peste 3700 de specii, adică mai mult de jumătate din cele ce vegetează în întreaga Europă, din care peste 700 cu proprietăți medicinale), iar pe de altă parte, datorită faptului că populația autohtonă în secolele și milenii de dănuire neîntreruptă pe același teritoriu, îmbrățișînd ocupații strîns legate de natură a avut prilejul să o cunoască îndeaproape, să o iubească și să o folosească în variate scopuri.

Lucrarea de față își propune să fie un modest sprijin pentru cei interesați în a recunoaște plantele medicinale cel mai frecvent utilizate pentru a le putea recolta pentru „farmacia casnică” sau chiar pentru a valorifica surplusul, ca importantă sursă de venituri suplimentare, activitate accesibilă și persoanelor cu forță de muncă mai redusă. Sînt prezentate în acest sens numai produse cu acțiune certă, a căror utilizare este avizată de Ministerul Sănătății,

comercializate ca atare sau în formule de ceaiuri combinate prin magazinele Plafar și rețeaua farmaceutică.

Ținînd seama de interesul tot mai mare pentru cultivarea lor nu numai în unități agricole, ci și în grădini, parcuri și spații verzi, deoarece la multe specii se îmbină în mod armonios scopul ornamental cu cel al utilizării medicinale, precum și în gospodăriile personale, sînt prezentate într-un mod accesibil elemente sintetice privind tehnologia de cultură.

Pentru a fi cît mai util masei largi a celor interesați, sînt prezentate cele mai importante indicații terapeutice, plantele medicinale constituînd adjuvante recunoscute în numeroase afecțiuni.

Ghidul cuprinde 104 monografii succinte ale celor mai uzuale plante medicinale care sînt însoțite de planșe color în scopul de a fi recunoscute cît mai ușor.

Monografiile sînt structurate după cum urmează:

- denumirea plantei în limba română (din multitudinea de denumiri populare s-a selectat cea mai frecvent și unanim redată în lucrările de specialitate), denumirea științifică, denumirile în limbile franceză, germană, maghiară și rusă, precum și poziția sistematică a speciei;
- caracterizarea morfologică, succintă, a plantei, cu cîteva elemente mai semnificative care să ajute la recunoașterea ei;

- partea utilizată și perioada optimă de recoltare indicată cu cifre romane (ex. V—VII însemnînd că planta se recoltează din mai pînă în iulie);

- ecologia și răspîndirea speciilor în flora spontană, precum și zonele cele mai indicate pentru cultivarea lor;

- la speciile de cultură, tehnologia de cultură cu principalele elemente privitoare la plantele premergătoare, îngrășămintele recomandate, lucrările pregătitoare pentru însămînțare sau plantare, însămînțarea (plantarea), lucrările de întreținere și recoltare;

- principiile active cele mai importante care explică acțiunea farmacologică a plantei;

- acțiunea farmacologică;

- recomandări pentru întrebuințările plantei în condiții casnice, subliniindu-se, în mod deosebit, cele majore care reprezintă o adevărată carte de vizită a plantei;

- modul de întrebuințare, atît în uz intern, cît și în uz extern;

- ceaiurile combinate Plafar în a căror formulă intră respectiva specie;

- la produsele la care este cazul, se menționează contraindicațiile și riscurile de confundare cu alte specii nemedicale.

În scopul accentuării caracterului practic al ghidului, pentru ușurința determinării, s-a pornit de la un element extrem de ușor de detectat, respectiv culoarea corolei, speciile fiind grupate în plante fără flori sau fără învelișuri florale (sau dacă acestea există, sînt necolorate), plante cu flori cu corola albă, galbenă, roșie sau albastră (violetă), elementul respectiv fiind figurat printr-un pătrat din respectiva culoare plasat în colțul din dreapta de sus al planșei. Pentru a se ușura și mai mult determinarea plantelor cu flori avînd corola de o anumită culoare, s-a făcut subîmpărțirea în flori cu corola din petale libere sau din petale unite, un element, de asemenea, lesne de recunoscut. Cele cu petale libere au fost figurate printr-un pătrat din segmente colorate, alternînd cu segmente necolorate, în timp ce caracterul „petale unite” a fost figurat printr-un pătrat plin.

În cadrul unei grupări astfel constituite (de ex. „flori galbene cu corola din petale libere”), speciile au fost trecute în ordine sistematică, conform Florei R.P.R.—R.S.R.

De asemenea, pe planșe s-a indicat și proveniența plantei, respectiv din flora spontană sau culturi, precum și simbolul părților de plantă care se utilizează. Se consideră a fi din flora spontană și speciile cultivate în alte scopuri (alimentar, ornamental etc.).

Autorii

1. PLANTE FARA FLORI SAU CU FLORI FARA INVELISURI FLORALE COLORATE

PLANTE FARA FLORI



PLANTE CU FLORI
FARA INVELISURI FLORALE
SAU
FARA INVELISURI FLORALE COLORATE



**CETRARIA ISLANDICA (L.) ACH. — FAM.
 PARMELIACEAE**

**Fr.: Lichen d'Islande; G.: Isländisches Moos; M.: Izlandi
 zuzmó; R.: Islandski lišainik.**

Lichenul de piatră sau de Islanda cum se mai numește are talul în formă de tufă mică, cu lobi divizați în două și răsuciți, brun-verzui pe fața superioară, mai deschiși pe fața inferioară.

Partea utilizată. Talul (Lichen Islandicus) — IV—XI.

Ecologie, răspândire. Pe stînci și pe platourile din zona alpină, uneori în jnepenișuri, îndeosebi pe Muntele Mic în Banat, Țarcu, Godeanu, Masivul Retezat, Munții Făgărașului, Parîngului, Sibiului și în județele Maramureș, Bistrița-Năsăud, Covasna, Harghita, Mureș și Suceava.

Recoltarea. Talul se desprinde ușor de pe substrat. Acolo unde este abundent, se poate strînge chiar cu grebla pentru fin. Imediat după recoltare se curăță de resturi de mușchi, urme de iarbă, alte impurități.

Principii active. Mucilagii (70% solubile), acizi lichenici, principii amare.

Acțiune farmacologică. Emolient al căilor respiratorii și digestive; antitusiv; tonic aperitiv și stomachic; stimulează secreția biliară și pancreatică; antivomitiv; febrifug.

Recomandări majore. Cataruri respiratorii (bronșite, laringite, traheite).

Alte recomandări. Anorexie; atonie gastrică și dispepsii; afecțiuni hepatice; insuficiență pancreatică; vomă (la gravide, în migrene, rău de mare, greață după anestezie); stări febrile.

Mod de administrare. Decoct (1 linguriță la cană, la care se adaugă un vîrf de cuțit de bicarbonat de sodiu) care se bea rece, în înghițituri mici pentru vomă și cald pentru celelalte recomandări; tinctură (20 g la 100 ml alcool) din care se iau 30—50 picături pe zi, timp de 8 zile.



EQUISETUM ARVENSE L. — FAM. EQUISETACEAE

Fr.: *Prêle*, *Queue-de-cheval*; G.: *Ackerschachtelhalm*; M: *Mezei zsurló*; R.: *Hvošci palevoi*.

Plantă perenă ierboasă, erectă, cu tulpini de două feluri (în ordinea apariției), fertile, de culoare brună, terminate cu un spic și sterile, verzi (înalte de 30—70 cm), costate, cu ramificații verticilate.

Partea utilizată. Tulpinile sterile (*Herba Equiseti*) — VII—IX.

Ecologie, răspindire. Această plantă crește în locuri umede, culturi prășitoare, rișe argiloase, la margini de cale ferată, îndeosebi în zona de deal, mai abundentă în Transilvania, centrul și nordul Moldovei, zonele de deal din Muntenia și Oltenia.

Recoltare. Tulpinile se taie cu secera sau cuțitul de la 5—6 cm de la sol.

Principii active. Acid silicic (din care 10—20% solubil), saponine, flavonoide, săruri de potasiu, urme de ulei volatil, un principiu amar, vitamina C.

Acțiune farmacologică. Diuretic (inclusiv cu acțiune ușor antiseptică); declorurant; remineralizant; hemostatic; neutralizant gastric; expectorant; antieczematos; antisudorific.

Recomandări majore. Afecțiuni renale (inclusiv în infecții urinare), hidropizii, albuminurie, gută.

Alte recomandări. INT. — Afecțiuni cardiace; adjuvant în TBC pulmonar; anemii; prevenirea cariilor și fortifierea unghiilor fragile; hemoroizi; dismenoree; hematurie; sîngerări ale mucoasei nazale, hemoptizii; gastrite hiperacide, ulcer; tuse cu expectorație. EXT. — Ulcere varicoase; eczeme; transpirația fetidă a picioarelor (împreună cu *Salvia*).

Mod de administrare. INT. — Decoct (1 lingură la cană), 2 cani pe zi, cald, înainte de mese; macerat la rece (6—8 ore, în aceleași proporții); pulbere (1 vîrf de cuțit pe zi, ca remineralizant). EXT. — Decoct foarte concentrat (100 g la litru).

Intră în formula ceaiurilor diuretice 2 și 3 și antireumatice.

Confuzii: se pot face cu alte specii de *Equisetum*, dintre care cea mai toxică este *E. palustre* (*Barba ursului* de



bahne), care are, în general, un singur fel de tulpini, cu spice sporifere terminale, iar ramificațiile în secțiune au 5 muchii și sînt goale la interior (la *E. arvense* sînt pline).

Alte specii: *E. silvaticum* (*Rușinea ursului*) — cu ramificații foarte subțiri, plecate în jos; *E. maximum* (*Coadă calului mare*) — mult mai viguroasă (întă pînă la 1,20 m și groasă de 1—1,5 cm), foarte ramificată (ramificații cu 8—11 muchii), goală la interior.

PINUS MUGO TURRA SIN PINUS MONTANA MILL.
SSP. MUGHUS (SCOP.) WILLK. — FAM. PINACEAE

Fr.: Pin de montagne; G.: Berg-Föhre; M.: Törpefenyő;
R.: Sosna.koha.

Jneapănul sau pinul montan este un arbust tîrîtor cu ramuri ascendente, cu aspect tufos, înalt pînă la 2—3 m, frunze aciculare lungi, grupate cîte 2 într-o teacă.

Partea utilizată. Mugurii (Turiones Pini), recoltați înainte de a se desface — III—IV.

Ecologie, răspîndire. Etajul alpin (1500—2300 m), deasupra pădurilor de conifere, în mase compacte sau pîlcuri, vegetînd într-un climat rece, cu precipitații abundente și vînturi puternice. Se întîlnește în tot lanțul carpat, cu deosebire în M. Rodnei, Călimani, Iezer-Păpușa, Sebeșului, Parîngului, Retezat, mai rar în Apuseni (în masivul Bucegi este specie ocrotită).

Recoltare. Mugurii se rup cu rămurica de susținere pînă la 3 cm. Se usucă la umbră și cît mai rapid, pentru a nu se desface.

Principii active. Ulei volatil, tanin, rezine, vitamina C.

Acțiune farmacologică. Emolient și antiinflamator pentru aparatul respirator; antiinflamator al căilor urinare; antireumatismal; antiseptic și cicatrizant.

Recomandări majore. Bronșite, traheite, laringite, tuse de diferite etiologii.

Alte recomandări. INT. — Pielite, cistite, uretrite; adjuvant în calculoza renală. EXT. — Reumatism; plăgi. COSM. — Calmant al tenurilor înroșite, congestionate și iritate.

Mod de administrare. INT. — Infuzie (1 linguriță la cană), 2—3 cani pe zi; sirop pectoral din 100 g muguri zdrobiți, macerați 12 ore în 100 ml alcool, peste care se toarnă 1/2 l apă clocotită și se strecoară după 6 ore, adăugîndu-se 650 g zahăr care se dizolvă la cald, completîndu-se cu apă pînă la 1 l. EXT. — Băi antireumatismale cu infuzie; loțiuni ale tenului, de asemenea cu infuzie.

Intră în compoziția ceaiului antibronșitic și aromatizantului pentru băi.



JUNIPERUS COMMUNIS L. — FAM. CUPRESSACEAE

Fr.: Genévrier commun; G.: Wacholder; M.: Boróka;
R.: Mojjevelnik abiknavennii.

Arbust cu frunze aciculare, dispuse în verticile de câte 3 și fructe false — pseudobace, negre-albăstrui.

Partea utilizată. Pseudobacele (Fructus Juniperi)

X—XII (putîndu-se prelungi pină în primăvară).

Ecologie, răspîndire. Specie invadantă în întregul lanț carpat (700—1400 m), adesea în pîlcuri sau tufărișuri, în rariști, poieni, pășuni, putînd vegeta pe solurile cele mai sărace. Recoltabil în cantități mai mari în toată Transilvania (mai puțin jud. Sălaj și Satu-Mare), Moldova (jud. Bacău, Neamț, Suceava, Vrancea), Muntenia (Argeș, Buzău, Prahova), Oltenia (jud. Gorj, Vîlcea).

Recoltare. Prin lovirea sau scuturarea ușoară a ramurilor pentru a nu se desprinde și pseudobacele verzi; sub locul de recoltare se pune o prelată.

Principii active. Ulei volatil (cu pinene, borneol, camfen, cadinen), substanță amară (Juniperina), acizi organici (glicerici, 1-ascorbic, acetic, malic, formic), rășini.

Acțiune farmacologică. Diuretic cu acțiune directă asupra parenchimului renal; dezinfectant puternic al căilor renale, digestive, respiratorii; tonic-stomachic; carminativ; sudorific și depurativ; ușor hipoglicemiant; antireumatismal.

Recomandări majore. Afecțiuni renale și ale căilor urinare (cistite, uretrite) de natură infecțioasă și inflamatorie; edeme cardio-renale.

Alte recomandări. INT. — Reumatism, gută; dispepsii, atonie gastrică; colite de fermentație, balonări; bronșite acute sau cronice; gripă; diabet; ateroscleroză. EXT. — Reumatism; eczeme, acnee, alte dermatoze; guturai.

Mod de administrare. INT. — Infuzie (1/2—1 linguriță la cană) care se bea în cursul unei zile; decoctie slabă (cca 20 pseudobace la litru) luată în cursul unei zile; tinctură (20 g macerate 8 zile în 100 ml alcool), 20—25 picături de 2—3 ori pe zi. EXT. — Fricțiuni antireumatice cu ulei (5% în alcool) sau cu oțet aromatic (50 g macerate 2—3 zile în 100 ml alcool, peste care se toarnă 1 l oțet, macerîndu-se 7—8 zile); băi sau



comprese cu decoct (20—30 g la litru); fumigații cu ienupere puse pe jar contra guturaiului.

Intră în formula ceaiului antireumatic.

Contraindicații. În doze mari irită căile urinare, putînd duce la hematurie. Contraindicat pentru persoane cu leziuni ale căilor urinare și pentru gravide.

Confuzii. Se pot produce cu pseudobacele de Juniperus sabina L. (cetină de negi), care sînt toxice. Caractere de deosebire: Pseudobacele au o cicatrice în formă de stea cu 3 colțuri (la J. sabina cu 4 colțuri), de regulă cu 3 semințe (la J. sabina numai 1—2); frunzele sînt aciculare, pungente, dispuse în verticile de câte 3 (la J. sabina sub formă de solzi imbricați).

BETULA VERRUCOSA EHRH. — FAM. BETULACEAE

Fr.: Bouleau; G.: Birke; M.: Közönséges nyírfa;
R.: Bereza pavislaia.

Arbore înalt pînă la 30 m, cu frunziș rar, luminos, flori unisexuate grupate în amentii, scoarță albă și netedă care se exfoliază specific în fișii circulare.

Partea utilizată. Frunzele (Folium Betulae) — V—VIII.

Ecologie, răspîndire. Specie întîlnită mai ales în păduri de deal, putînd urca pînă în zona montană în păduri de amestec cu coniferele, în întregul lanț al Subcarpaților. Cel mai ușor se recoltează frunzele unde mesteacănul apare invadant în tăieturi, doborîturi sau arsuri.

Recoltare. Se strujesc ramurile în stadiul tînăr, cînd sînt încă lipicioase. După înlăturarea resturilor de rămurele, muguri, frunze brunificate, se usucă la umbră, în strat subțire.

Principii active. Saponine, substanțe amare, mucilagii, tanin, ulei volatil, betulină (glicozid flavonic), alantoină, acid cafeic.

Acțiune farmacologică. Diuretic puternic cu eliminare masivă de acid uric, colesterol și alte toxine; depurativ; antiinflamator articular și cutanat; coleretic; tonic capilar.

Recomandări majore. Întreaga gamă a afecțiunilor renale inclusiv calculoză;

Alte recomandări. INT. — Edeme cardiorenale; reumatism, gută, artroză; azotemie (uremie); hipercolesterolemie; afecțiuni hepatice. EXT. — Igienă capilară; iritații cutanate.

Mod de administrare. INT. — Infuzie (1—2 lingurițe la cană la care se adaugă la răcire un vîrf de cuțit de bicarbonat de sodiu, lăsîndu-se 6 ore în repaus) cîte 2—3 căni pe zi. EXT. — Infuzie de 3—4 ori mai concentrată.

Intră în formula ceaiurilor antireumatic și diuretic 2.



QUERCUS ROBUR L. — FAM. FAGACEAE.

Fr.: Chêne; G.: Stiel-Eiche; M.: Kocsányos tölgy;
R.: Dub.

Arbore viguros cu ramuri noduroase întinse orizontal, scoarță brăzdată adânc, frunze caracteristice, penat-sinuate, fructe (ghinde) de asemenea caracteristice. **Partea utilizată.** Scoarța (Cortex Quercus) care se recoltează și de la alte specii de Quercus — III—V.

Ecologie, răspindire. Speciile de Quercus ocupă peste 21% din suprafața pădurilor noastre, începând din zona de câmpie și pînă în zona dealurilor.

Recoltare. Primăvara, la începerea circulației sevei, se recoltează numai scoarța netedă a ramurilor de 3—5 cm cu grosimea pînă la 10 cm, de pe arborii rezultați din tăieri. Recoltarea se face prin inelare (se fac tăieturi inelare la distanță de 10—30 cm, care se unesc apoi printr-o tăietură în lung, rezultînd fragmente în formă de tub) sau prin așchiere (în acest caz se detașază și lemn, care nu este admis în produs).

Principii active. Taninuri, substanțe triterpenice, derivați flavonoidici.

Acțiune farmacologică. Astringent și antiseptic asupra florei microbiene; hemostatic; cicatrizant.

Recomandări majore. Diaree, enterite.

Alte recomandări. INT. — Hemoragii, scaune cu meleu, antidot în otrăviri cu alcaloizi și unele metale. EXT. — Gingivite sîngerînde; hemoroizi; boli de piele; ulceratii, degerături; transpirația excesivă a mîinilor și a picioarelor; leucoree.

Mod de întrebuințare. INT. — Decoct (2 lingurițe la cană) care se bea în cursul unei zile. EXT. — Decoct concentrat (2 linguri la cană) cu care se fac gargarisme, băi locale, comprese, spălături vaginale. Intră în formula ceaiului antidiareic.



JUGLANS REGIA L. — FAM. JUGLANDACEAE

Fr.: Noyer; **G.:** Nussbaum; **M.:** Diófa; **R.:** Areh grețkii.

Cunoscut arbore fructifer, foarte viguros, cu frunze imparipenate, flori unisexuate, cele masculine în amentzi negricioși, cele femeiești în vârful ramurilor.

Partea utilizată. Frunzele (*Folium Juglandis*) — VI—VII coaja verde a nucii (*Pericarpus Nucis juglandis*) — VIII—IX.

Ecologie, răspîndire. Specie cultivată în întreaga țară, prin livezi, grădini, vii, curți, la marginea șoselelor, mai ales în regiunea podgoriilor, uneori se întîlnește sălbăticit prin păduri din regiuni cu influență mediteraneeană (Banat, sud-vestul Olteniei, vestul Munteniei).

Recoltare. Frunzele prin strujirea foliolelor de pe axul principal; pericarpul se cojește imediat după recoltarea nucilor.

Principii active. Tanin, ulei volatil, un principiu amar (*juglandină*), juglonă, flavonoide, vitamina C.

Acțiune farmacologică. Astringent (antidiareic și antihemoragic); antidiabetic cu scădere accentuată a glicemiei; ușor hipotensiv; antisudorific; tonic; cicatrizant.

Recomandări majore. Diaree, enterite; hemoragii.

Alte recomandări. INT. — Diabet; hipertensiune; transpirație excesivă (îndeosebi cea nocturnă a bolnavilor TBC); scrofuloză și rahitism (inclusiv în uz extern). EXT. — Răni; leucoree, eczeme.

Mod de administrare. INT. — Infuzie (1—2 lingurițe la cană), 1—2 cani pe zi. EXT. — Infuzie mai concentrată (2—3 linguri la cană) pentru cataplasme sau băi locale. Intră în formula ceaiurilor dietetic și antidiareic.



POPULUS NIGRA L. — FAM. SALICACEAE

Fr.: **Peuplier noir**; G.: **Schwarzpappel**; M.: **Fekete nyárfa**; R.: **Asakori**.

Arbore înalt pînă la 30—35 m, putînd atinge diametri de 2 m, se deosebește de celelalte specii de plop prin frunzele deltoide (triunghiulare).

Partea utilizată. Mugurii (Gemmae Populi) — II—III.

Ecologie, răspîndire. Plopul negru se întîlnește în regiuni joase, pe aluviuni, prin zăvoaie, lunci, poieni umede, abundant în Lunca și Delta Dunării, ca și în luncile principalelor riuri, în partea dinspre aval a acestora. Plantat pe marginea șoselelor de cîmpie.

Recoltare. Mugurii se recoltează nu cînd sînt desfăcuți, ci cînd încep să se umfle și sînt viscoși datorită secretării unui clei. Deoarece recoltarea direct de pe arbore este mai puțin productivă, se va urmări ca strîngerea mugurilor să se facă în locurile unde se taie astfel de arbori.

Principii active. Glicozizi fenolici (salicina, populina), ulei volatil, tanin, saponozide.

Acțiune farmacologică. Antiseptic al căilor urinare și respiratorii; diuretic cu eliminare de acid uric; sedativ al durerilor reumatismale; expectorant; astringent; cicatrizant.

Recomandări majore. Stări inflamatorii ale căilor respiratorii (bronșite, traheite, laringite) și urinare (cistite, pielite); hemoroizi.

Alte recomandări. INT. — Litiază urică; dureri reumatismale; febră musculară; tuse (în faza de coacțiune). EXT. — Reumatism; arsuri.

Mod de administrare. INT. — Infuzie (1 linguriță la cană), 1—2 cani pe zi, în mai multe reprize. EXT. — Fricțiuni antireumatismale cu tinctură (20 g macerate 8 zile în 100 ml alcool) timp de o lună; ulei (200 g muguri fierți 1—2 ore pe baie de apă în 500 ml ulei), ca unguent în hemoroizi, fisuri anale, arsuri. Intră în formula aromatizantului pentru băi.

Confuzii. Spre deosebire de mugurii altor specii de plop cei de plop negru sînt ascuțiți și lungi pînă la 2 cm (la plopul alb și cel tremurător sînt ovoizi și mult mai mici — 3—4 mm la plopul alb și 6—7 mm la cel tremurător).



SALIX SP. (S. ALBA L., S. PURPUREA L., S. FRAGILIS L., S. PENTANDRA L., S. CAPREA L. Ș.A.).

Fr.: Saule; **G.:** Silber Weide; **M.:** Fehér füz; **R.:** Iva.

Arbore înalt pînă la 20 m, cu coroană neregulată, frunze lanceolate, flori unisexuate grupate în amenți (mîțișori) caracteristici.

Partea utilizată. Coaja (Cortex Salicis) — III—VI.

Ecologie, răspîndire. Specie de lunci și zăvoaie, cu cerințe mari față de umiditate, pe toate văile râurilor, în deosebi în zona de cîmpie.

Recoltare. În perioada de circulație abundentă a sevei, scoarța se jupoaie cu ușurință de pe ramurile tinere de 2—3 ani.

Principii active. Glicozizi fenolici (salicina, populina), tanin, flavonozide.

Acțiune farmacologică. Antireumatismal; analgezic; febrifug; astringent (antidiareic și hemostatic); ușor sedativ nervos; cicatrizant.

Recomandări majore. Reumatism (atît în uz intern, cit. în uz extern).

Alte recomandări. INT. — Diaree; hemoragii; stări febrile; nevralgii gutoase; răceli; stări depresive, insomnii. EXT. — Răni, ulceratii, hemoroizi; stomatite și faringite.

Mod de administrare. INT. — Decoct (1 lingură la cană 1—2 cani pe zi; pulbere (2—3 g/zi) luată între mese.

EXT. — Decoct concentrat (2—3 linguri la cană) pentru băi, loționări și gargarisme.

Intră în compoziția ceaiului antireumatic.



MORUS SP. (M. ALBA L., M. NIGRA L.) — FAM. MORACEAE

Fr.: Mûrier; G.: Maulbeerbaum; M.: Eperfa; R.: Tut.

Acest arbore este cultivat în principal pentru frunzele sale folosite ca hrană pentru viermii de mătase.

Partea utilizată. Frunzele (Folium Mori) — VI—VIII.

Ecologie, răspândire. Dudul este cultivat în aliniamente stradale, pe marginea șoselelor, în curți, în toată zona de câmpie și deal, iar uneori crește sălbăticit în păduri de luncă, mai cu seamă în sudul și vestul Olteniei, Banat, Muntenia, sudul Moldovei.

Recoltare. Prin ciupirea frunzelor fără pețiol sau prin strujire, dar apoi se rupe pețiolul.

Principii active. Tanin, acid folic, arginină, provitamina A, acizi organici (acetic, propionic), cetone; butiramină.

Acțiune farmacologică. Hipoglicemiant ușor; astringent.

Recomandări majore. Diabet.

Alte recomandări. Enterite cronice.

Mod de administrare. Infuzie (2 lingurițe la cană), 2—3 căni pe zi, de preferință în amestec cu alte antidiabetice (frunze de salvie, afin, nuc ș.a.).

Intră în formula ceaiului dietetic.



HUMULUS LUPULUS L. — FAM. CANNABINACEAE

Fr.: Houblon; G.: Hopfen; M.: Komló; R.: Hmeli abiknavennii.

Plantă erbacee volubilă, cu frunze lobate asemănătoare viței-de-vie, din flora spontană, care este și cultivată pentru industria berii.

Partea utilizată. Inflorescențele femele „conurile” (Strobuli Lupuli) — VIII—IX.

Ecologie, răspindire. Crește în flora spontană din zăvoaie, lunci, tufișuri, crânguri, pe garduri, în zona de câmpie și deal, până la altitudinea de 800—1000 m, în Transilvania (jud. Neamț, Suceava, Vrancea), Muntenia (jud. Argeș, Brăila, Giurgiu, Prahova), Oltenia (jud. Vâlcea), Delta Dunării. Se cultivă pentru industria berii, în special, în bazinul Tirnavei Mari.

Recoltare. Conurile încă verzi și cu bracteele alipite se culeg prin ciupire, con cu con, cu pedunculul sub 1 cm.

Uscarea se face la umbră, pe hîrtie, iar praful galben-verzui care se scutură se folosește împreună cu produsul.

Principii active. Ulei volatil (cca 1%) cu sescviterpene, esterii valerianici, mircen, geraniol, principii amare (humulona, lupulona), flavonoide, tanin.

Acțiune farmacologică. Sedativ nervos major; anafrodisiac; tonic-aperitiv și stomachic; diuretic cu eliminare de acid uric; calmant al durerilor menstruale; coleretic-colagog; activează circulația sanguină; antitrichomonazic; astringent.

Recomandări majore. Hiperexcitabilitate generală și sexuală; insomnii.

Alte recomandări. INT. — Anorexie; anemie; dispepsie atonică; gută, reumatism; diskinezie biliară și colecistită; menstrue dureroase; tulburări circulatorii. EXT. — Trichomonoză vaginală. COSM. — Acnee și seboreea tenului.

Mod de administrare. Infuzie (2 linguri la cană) care se bea cu 30 minute înainte de culcare; conuri ținute într-un săculeț de tifon în dreptul nărilor (contra insomniilor). EXT. — Spălături vaginale cu infuzie



concentrată (2 linguri la 100 ml apă); infuzie cu o lingură la cană în tratamente cosmetice. Intră în formula ceaiurilor calmant și sedativ.

URTICA DIOICA L. — FAM. URTICACEAE

Fr.: Grande ortie; **G.:** Grosse Brennessel; **M.:** Nagy csalán; **R.:** Krapiva dvudomnaia.

Plantă erbacee perenă, binecunoscută la noi în țară, cu frunzele avînd peri urticanți caracteristici.

Partea utilizată. Frunzele (*Folium Urticae*) — VI—IX. Se mai citează și rădăcinile (*Radix Urticae*), însă pentru a evita distrugerea bazinelor nu se recomandă recoltarea.

Ecologie, răspîndire. Urzica este o plantă tipic antropofilă, adică legată ecologic de așezările omenești sau de locuri în care a intervenit activitatea umană (pe lângă case, garduri, magazine, în locuri gunoite, în special pe lângă stîne). Mai crește pe malul apelor și în tăieturi de păduri, în toată țara.

Recoltare. Fie prin strujirea direct de pe plantă a frunzelor, cu mîna înfășurată într-o cîrpă sau mînușă groasă, fie prin cosirea părții aeriene și strujirea ulterioară, dar înainte de a se produce ofilirea. După recoltare, frunzele nu se țin inghesuite, presate, deoarece se încing și se înnegresc.

Principii active. Complex vitaminic (provitamina A, B₂, C, K), clorofilă, flavonoide, mucilagii, acid pantotenic, cetone.

Acțiune farmacologică. Depurativ de bază; diuretic cu eliminare masivă de acid uric; declorurant; expectorant și antitusiv; antidiabetic; astringent (antidiareic și antihemoragic); tonic general; tonic capilar; cicatrizant.

Recomandări majore. Eczeme rebele, psoriazis, peelinguri (atît în cură internă, cît și în aplicații externe), precum și în cura depurativă de primăvară.

Alte recomandări. INT. — Litiază renală, reumatism, gută; edeme cardiorenale; bronșite; hemoroizi, hemoragii interne, hemoragii uterine, dismenoree, sîngerări ale mucoasei nazale; stări diareice (inclusiv acțiune antimicrobiană puternică); avitaminoze. EXT. — Igiena capilară; ulcere varicoase; stomatite, gingivite, amigdalite.

Mod de administrare. INT. — Infuzie (1 lingură la cană), 2—3 cani pe zi; sirop depurativ (250 g frunze macerate 12 ore în 1,5 l apă în clocot și 500 g zahăr) din care se bea 50—100 g pe zi. EXT. — Decoct concentrat



(3—5 linguri la cană) pentru loțiuni capilare (1—2 ori pe săptămînă), spălături locale, comprese. Intră în formula ceaiului antibronșitic.

VISCUM ALBUM L. — FAM. LORANTHACEAE

Fr.: Gui; G.: Vogelmistel; M.: Fehér fagyöngy;
R.: Amela belaia

Specie semiparazită pe arbori, verde și peste iarnă, înaltă pînă la 60 cm, prinsă de substrat prin haustori puternici. **Partea utilizată.** Frunzele cu rămurile tinere (Folium Visci cum stipites) — I—XII.

Ecologie, răspîndire. Vîscul crește semiparazit pe aproape toate speciile de foioase, mai rar pe conifere, putînd apărea și pe arbori fructiferi (cireș, prun, măr, păr). Răspîndit în toată țara, mai ales în Transilvania (toate județele, dar în special Cluj, Sălaj, Bihor, Brașov, Mureș), Moldova (Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Vrancea, Vaslui), Delta Dunării, mai puțin în județele de deal din Muntenia și Oltenia.

Recoltare. Îndeosebi în perioada de iarnă, deoarece se distinge mai ușor din coroana arborilor și se evită ușor confuzia cu vîscul de stejar (*Loranthus europaeus*) care are frunze căzătoare. Ramurile tinere se trag cu un cîrlig prins la capătul unei prăjini lungi. Se îndepărtează ramurile mai groase și fructele (cu ajutorul unei perii aspre).

Principii active. Saponozide triterpenice, alcooli (viscoli), amine (colină, acetilcolină), aminoacizi, vitamine (C, E), glicozizi, polipeptide (viscotoxină).

Acțiune farmacologică. Hipotensor accentuat; vazodilatator coronarian și periferic; antispasmodic.

Recomandări majore. Hipertensiune.

Alte recomandări. Ateroscleroză și tulburări circulatorii; crize de astm, tuse convulsivă, sughițuri persistente; migrene (legate de creșterea tensiunii).

Mod de administrare. Macerat la rece (2 lingurițe în 1/2 litru apă, 6—8 ore) care se consumă în cursul unei zile; pulbere (2 vîrfuri de cuțit pe zi).

Contraindicații. Persoane care au suferit accidente vasculare. În cazul unor tulburări de ritm cardiac și respirator se renunță la tratament.

Confuzii. Caractere de deosebire față de *Loranthus europaeus* (Vîscul de stejar):

— vîscul medicinal rămîne verde peste iarnă (v. de stejar are frunze căzătoare);



— frunze verzi-gălbui și aproape sesile (la v. de stejar verde-închis și pețiolate);
— fructe albe, grupate câte 3 (la v. de stejar gălbui și dispuse în mici ciorchini).

POLYGONUM AVICULARE L. — FAM.
 POLYGONACEAE

Fr.: Renouée; G.: Vogelknöterich; M.: Porcsinfű;
 R.: Gareț pticii.

Plantă anuală, mică, mai ales tîrîtoare, cu frunze ovate mici cu manșoane membranoase (ochree) la bază, flori mici, grupate la subsuoara frunzelor.

Partea utilizată. Partea aeriană (Herba Polygonii) — VI—IX.

Ecologie, răspîndire. Troscotul este o plantă legată ecologic de așezările omenești, crește pe terenuri virane, la marginea drumurilor, a șanțurilor, în diferite culturi. Se adaptează pe orice tip de sol, suportă bătătorirea. Este răspîndit în toată țara, mai ales în zona de cîmpie și deal.

Recoltare. Plantele se smulg și se curăță de rădăcini sau se cosesc acolo unde cresc în masă.

Principii active. Glicozid flavonic (avicularina), tanin, acid salicilic.

Acțiune farmacologică. Diuretic; remineralizant; ușor hipotensiv; astringent; tonic-aperitiv; cicatrizant.

Recomandări majore. Afecțiuni renale, reumatism, gută.

Alte recomandări. INT. — Hipertensiune; convalescență, TBC pulmonar; diaree; hemoragii; anorexie. EXT. — Răni; hemoroizi.

Mod de administrare. INT. — Infuzie (1—2 lingurițe la cană), 2—3 căni pe zi, în cure de lungă durată. EXT. — Băi locale, cataplasme cu decoct concentrat (3 linguri la cană).

Intră în formula ceaiului gastric 2.



RHEUM PALMATUM L. VAR. TANGUTICUM MAXIM,
RH. OFFICINALE L. — FAM. POLYGONACEAE

Fr.: Rhubarbe; G.: Rhabarber; M.: Rebarbara;
R.: Revent tangutskii.

Plantă erbacee de cultură, perenă, foarte viguroasă (1,50—2,50 m), în primul an numai cu rozetă bazală, din anul II și cu frunze tulpinale foarte mari (ajungând pînă la 1 m), palmat-lobate, pețiol gros succulent, flori purpuriu închis, mici, grupate în panicule compuse, terminale.

Partea utilizată. Rizomii (Rhizoma Rhei) — III—IV și IX—XI.

Ecologie, zonare. Această plantă solicită umiditate ridicată în sol, cît și în atmosferă, soluri adînci, fertile, cu conținut ridicat în calciu (cele mai indicate brune sau brun-roșcate de pădure). Se recomandă cultivarea în jud. Brașov, Sibiu, ca și în zona Subcarpaților.

Tehnologia de cultură. Premergătoare — cereale păioase de toamnă și prășitoare care eliberează terenul devreme.

Îngrășămintă — fosfor 80—100 kg/ha și potasiu 40—50 kg/ha încorporate la arătura de bază împreună cu amendamente calcaroase 3—3,5 t/ha; azot 60—70 kg/ha, primăvara; în anul II—III cite 30—40 kg/ha fosfor și potasiu, toamna la ultima prașilă și tot atît azot primăvara la prima prașilă mecanică.

Pregătirea terenului. Arătură, adîncimea de la 28—30 cm, lucrare cu cultivatorul și nivelatorul. **Însămînțare** — în pragul iernii cu semănătoarea SUP-21 cu limitatoare de adîncime, la 70 cm interval și 1—1,5 cm adîncime, cu 6 kg/ha. **Lucrări de întreținere** — plivit și prașit imediat ce rîndurile se disting, rărit cînd plantele au 2 perechi de frunze la 40—50 cm plantă de plantă pe rînd; în anul I, 1—2 prașile manuale și 1—2 prașile mecanice, în anul II și III, cite 2 prașile manuale și mecanice. **Recoltare** — cu plug fără cormană în toamna anului III, la încetarea vegetației.

Principii active. Oximetilantrachinone; taninuri.

Acțiune farmacologică. Laxativ pînă la purgativ drastic, în funcție de doză; tonic aperitiv; coleretic-colagog; vermifug.

CULTURI



Recomandări majore. Constipații.

Alte recomandări. Anorexie; diskinezie biliară; helmintiaze.

Mod de administrare. Pulbere; infuzie (1—1/2 lingurițe la cană) care se bea dimineața. Se calculează doza astfel încît să asigure 0,10—0,20 g pentru efectul tonic — aperitiv, 0,25—0,50 g ca laxativ și 1—4 g ca purgativ drastic.

Contraindicații. Constipație cronică (deoarece acțiunea purgativă este urmată de constipație).

FRAXINUS EXCELSIOR L. — FAM. OLEACEAE.

Fr.: Frêne; G.: Esche; M.: Magas köris; R.: Iaseni vîsokii.

Arbore viguros, înalt pînă la 35 m, cu frunze penat compuse și fructe samare simple.

Partea utilizată. Frunzele (Folium Fraxini) — V—VII.

Ecologie, răspîndire. Specie cu largă amplitudine ecologică, frasinul apare frecvent ca specie ornamentală pe străzi și în spații verzi, fiind rezistentă la noxe (fum, gaze, praf).

Recoltare. Se strujesc foliolele de pe pețiolul principal și se usucă la umbră, în strat subțire.

Principii active. Tanin, glicozizi flavonici (rutina) și cumarinici (fraxina), acizi organici, vitamina C.

Acțiune farmacologică. Diuretic cu eliminare de acid uric; depurativ; laxativ ușor; coleretic — colagog; cicatrizant și antiinflamator hemoroidal.

Recomandări majore. Reumatism, gută, uremie.

Alte recomandări. INT. — Constipație; diskinezie biliară. EXT. — Leucoree; hemoroizi; răni greu vindecabile.

Mod de administrare. Infuzie (o lingură la cană), 2—3 căni pe zi.

Întră în formula ceaiului antireumatic și a pulberii laxativ-purgative.



XANTHIUM SPINOSUM L. — FAM. COMPOSITAE

Fr.: Lampourde; **G.:** Distel, Dornige Spitzklette;
M.: Szerbtövis; **R.:** Durnişnic igolciatii.

Plantă ierboasă comună ca buruiană, recunoscându-se după tulpina înaltă de 80—90 cm, bogat ramificată, cu spini galbeni, trifurcați, de 2—3 cm, foarte înțepători, la subsuoara fiecărei frunze, fructele elipsoidale, lungi de 8—12 mm, cu spini mici îndoiți la capăt, la vîrf cu 2 ghimpi mai lungi și mai duri.

Partea utilizată. Partea aeriană (Herba Xanthii spinosi) — VII—IX.

Ecologie, răspîndire. Specie comună în zona de cîmpie și deal, crește în preajma așezărilor umane, pe lângă drumuri și căi ferate, în locuri necultivate.

Recoltare. Datorită spinilor, recoltarea se face cu mănuși groase, tăindu-se cu o foarfecă lungă sau cuțitul, ori cu sapa bine ascuțită.

Principii active. Acid cafeic, acid clorogenic, flavone, fitosteroli, saponine, tanin, ulei volatil.

Acțiune farmacologică*. Antiinflamator și anticongestiv; dezinfectant; cicatrizant.

Recomandări majore. Adenom de prostată (preventiv și curativ, inclusiv postoperator) și alte stări inflamatorii ale prostatei.

Alte recomandări. Cistopielite; litiaze renale (pînă la mărimea unui bob de piper).

Mod de administrare. Decoct (1 g la cană) care se bea înainte de mese cu 1/2 oră, 2 căni pe zi în primele 6 luni de cură, apoi cîte o singură cană pe zi. Cura durează 6—18 luni în afecțiuni de prostată, 3—5 luni în cistopielite și cure de întreținere toată viața în litiaze renale. Se recomandă asocierea cu un diuretic. Se evită consumul de condimente, fructe acre, lactate fermentate, alcool.

* Descoperirea proprietăților terapeutice ale plantei este prioritate românească, datorată unui colectiv de la I.M.F. Cluj-Napoca, sub conducerea conf. dr. Pavel Petcu.



ZEA MAYS L. — FAM. GRAMINEAE

Fr.: Maïs; G.: Kukuruz; M.: Törökbúza; R.: Kukuruză.

Porumbul este una din cele mai importante cereale, în mod secundar și cu importanță medicinală.

Partea utilizată. Stigmatetele — popular „mătasea“ (Stigmata Maydis) — IX—X.

Ecologie, răspindire. Plantă cerealieră larg răspindită, îndeosebi în zona de cîmpie, mergînd pînă în cea de deal, în întreaga țară.

Recoltare. Materia primă de cea mai bună calitate este dată de porumbul în lapte, la care stigmatetele sînt verzi. Se poate recolta și de la porumbul maturat, o dată cu depănșarea, îndepărtîndu-se părțile înnegrite, uscate.

Principii active. Săruri minerale (potasiu, calciu, siliciu), fitosteroli, saponine, ulei volatil, alantoină, vitamine (C, E, K).

Acțiune farmacologică. Diuretic energic și neiritant, cu proprietăți ușor sedative; eliminare de urați; hemostatic; coleretic.

Recomandări majore. Afecțiuni ale aparatului urinar (litiază renală, cistită, colici nefretice, albuminurie).

Alte recomandări. Edeme cardiorenale și insuficiență cardiacă; azotemie; reumatism și gută; colecistită și diskinezie biliară; dismenoree, tulburări de menstruație.

Mod de administrare. Infuzie (1 linguriță la cană), 2 căni pe zi, în scop diuretic doza se poate dubla.

Între în formula ceaiurilor diuretic 2 și 3 și hepatic.



AGROPYRON REPENS (L.) BEAUV. — FAM. GRAMINEAE

Fr.: Chiendent; G.: Quecke; M.: Tarackbúza; R.: Pîrei palzucii.

Graminee perenă, înaltă de 0,2—1 (1,5) m, cu spicul din spiculețe comprimate lateral, dispuse în niște scobituri pe axul spicului, rizomul stolonifer lung de câțiva metri, ramificat, cu noduri la cca 5 cm, învelite în frunzulițe membranoase mici.

Partea utilizată. Rizomii (Rhizoma Graminis) — III—IX.

Ecologie, răspîndire. Pirul este o buruiiană de cultură care înțelenește terenurile prost întreținute. Mai crește pe coaste uscate, aride, nisipoase sau argiloase, din cîmpie și pînă în zona montană inferioară. Zonele cele mai importante: centrul și nordul Moldovei (jud. Bacău, Neamț, Botoșani, Suceava) și Transilvania (jud. Bistrița-Năsăud, Hunedoara, Harghita, Covasna, Brașov, dar în special Cluj și Sălaj).

Recoltare. În urma arăturii de primăvară sau de toamnă se trece cu grapa sau cu boroana, strîngîndu-se rizomii în grămadă (pentru cantități mici cu grebla); se spală imediat după recoltare, apoi se zvîntă și se înlătură părțile aeriene, rizomii pătați, înnegriți. Se usucă la soare sau în încăperi bine aerisite. După uscare se freacă cu pînză de sac pentru îndepărtarea resturilor de rădăcini și a tecilor de frunze.

Principii active. Inulină, mucilagii, urme de ulei volatil, săruri de potasiu și siliciu, vitaminele A și B.

A acțiune farmacologică. Diuretic și ușor sedativ renal; sudorific și febrifug; remineralizant; antireumatismal; coleretic; dizolvă calculii biliari; excită secreția pancreatică; expectorant.

Recomandări majore. Afecțiuni renale (inclusiv colică renală), cistite.

Alte recomandări. Răceli; adjuvant în TBC pulmonar; reumatism; diskinezii biliare; litiază biliară; insuficiență pancreatică; cataruri respiratorii.

Mod de administrare. Infuzie sau decoct (1 lingură la cană), 3—4 căni pe zi. Intră în formula ceaiurilor diuretic 2 și sudorific.



Confuzii. Față de Cynodon dactylon (Pirul gros) — principalul caracter de deosebire este spicul cu o singură axă la cel medicinal și spicul digitat la Pirul gros.

ACORUS CALAMUS L. — FAM. ARACEAE

Fr.: Acore aromatique; G.: Kalmus; M.: Orvosi kálmos; R.: Air.

Plantă erbacee erectă, cu miros aromat, tulpini cărnoase în 4 muchii purtând o singură frunză îngustă și foarte lungă (50—70 cm), la subsuoara ei cu o singură inflorescență cărnoasă cilindrică, ca un știulete (spadice).

Partea utilizată. Rizomii (Rhizoma Calami) — III—IV și IX—XI.

Ecologie, răspindire, zonare. Specie care crește în locuri mlăștinoase, inundate periodic. În cantități recoltabile vegetează în câteva localități din jud. Timiș (Satchinez, Cenei, Bogda, Beregsău, Banloc), Caraș-Severin (Pojejena). Deoarece prin desecări arealul se restrânge, este cultivată în comuna Satchinez jud. Timiș. În condiții de orezărie poate da rezultate foarte bune și în zona Deltei.

Tehnologia de cultură. Premergătoare — datorită cerințelor specifice, se poate cultiva numai după orez sau pe terenuri pregătite special. **Îngrășămintă** — fosfor 60—70 kg/ha și potasiu 40—50 kg/ha încorporate toamna la desfundare; azot 40—50 kg/ha dat primăvara, devreme. **Pregătirea terenului** — arătură la adâncimea de 30—35 cm cu plug în agregat, cu grapă stelată, lucrare cu combinatorul înaintea plantării. **Plantare** — toamna devreme, la interval de 60 cm, distanță de 30 cm pe rând și adâncime de 6—8 cm, câte 800 kg rizomi la hectar. **Lucrări de întreținere** — plivit și prășit între rânduri în perioadele dintre inundările succesive ale culturii. **Recoltare** — în anul III cu mașina de recoltat MRC-1, 2, apoi rizomii se spală în curent de apă, se despică în lung și se trec la uscat.

Principii active. Ulei volatil (cu azaronă), tanin, substanță amară (acorină), rezine.

A acțiune farmacologică. Stimulent al secrețiilor gastrointestinale; carminativ; antispastic gastrointestinal; sedativ și ușor hipnotic; diuretic cu eliminare de acid uric.

Recomandări majore. Atonie gastrică, anorexie.



Alte recomandări. Balonări, flatulență; colici gastrointestinale; stări de agitație, insomnii; afecțiuni urinare, gută.

Mod de administrare. Decocție scurtă (5 minute) sau macerat la rece (1 lingură la cană) care se bea în cursul unei zile, înainte de mese; tinctură (20 g macerate 8 zile în 100 ml alcool), câte 20 picături înainte de mese. Intră în formula ceaiului tonic-aperitiv.

2 PLANTE CU FLORI ALBE

A. COROLA CU PETALE LIBERE



B. COROLA CU PETALE UNITE



GYPSOPHILA PANICULATA L. — FAM.
CARYOPHYLLACEAE

Fr.: Saponaire d'Orient; G.: Rispiges Gypskraut;
M.: Buglyós dercefű; R.: Kacim metelciatii.

Ipcărigea sau ciuinul alb este o plantă erbacee cu tulpini ramificate, cu frunze opuse lanceolate, flori albe, foarte mici, în inflorescențe laxe.

Partea utilizată. Rădăcinile (Radix Gypsophilae sin. Radix Saponariae albae) — VIII—XI.

Ecologie, răspindire, zonare. În flora spontană crește în locuri nisipoase, cu subsol adânc și permeabil, în jud. Constanța, Tulcea (în Delta Dunării), sudul Munteniei și Olteniei (partea dinspre Dunăre a jud. Ialomița, Dolj), sudul Moldovei (jud. Galați, Vaslui), Cîmpia de Vest (jud. Bihor). În culturi se recomandă în aceleași zone în care vegetează în flora spontană, putînd valorifica chiar nisipurile mobile din Lunca și Delta Dunării.

Tehnologia de cultură. Premergătoare — cereale de toamnă, borcaguri leguminoase și prășitoare.

Ingrășăminte — fosfor 40—50 kg/ha și potasiu 30—40 kg/ha încorporate toamna la arătură; azot 40—50 kg/ha în anul I și 20—30 kg/ha în anii II și III.

Pregătirea terenului — arătură cu plugul în agregat cu grapa stelată, imediat după recoltarea premergătoarei, la adîncimea de 25—28 cm; primăvara — lucrare cu nivelatorul și combinatorul urmat de tăvălug.

Însămînțare — primăvara foarte devreme cu semănătoarea SUP-21 sau SUP-29 cu echipament pentru semințe mici și limitatoare pentru adîncime, cite 5—6 kg/ha, la intervale de 50 cm și adîncime de 0,3—0,5 cm. **Lucrări de întreținere** — prașilă oarbă și plivit cînd plantele sînt mici, apoi 2—3 prașile mecanice și 1—2 manuale în fiecare an de cultură. **Recoltare**

— cu plugul de desfîndat fără cormană, după care se scutură de pămînt, se spală, se despică longitudinal în 2—3 și se usucă.

Principii active. Saponozide triterpenice.

Ațiune farmacologică. Expectorant; diuretic; depurativ; vermifug.

Recomandări majore. Bronșită, tuse de diverse etiologii (în faza de coacțiune).



Alte recomandări. INT. — Afecțiuni urinare; dermatoze. EXT. — Plăgi, eczeme, furuncule; tratamentul oxiiurilor. **Mod de administrare.** INT. — Decoct (1 linguriță la cană), 3—5 linguri pe zi; macerat la rece (în aceleași proporții). EXT. — Spălături locale cu decoct; băi de șezut contra oxiiurilor.

SĂPUNARIȚA

SAPONARIA OFFICINALIS L. — FAM.
CARYOPHYLLACEAE

Fr.: Saponaire officinale; G.: Gemeines Seifenkraut;
M.: Szappanfű; R.: Milnianka lekarstvennaia.

Plantă erbacee anuală sau bienală din flora spontană, săpunarița sau ciuinul roșu este cultivată pentru proprietățile sale farmaceutice. Are tulpini puțin ramificate, frunze opuse, alungite, flori albe de tip 5, ușor lipicioase, în vârful tulpinii.

Partea utilizată. Rădăcinile (Radix Saponariae rubrae) — III—IV și IX—XI.

Ecologie, răspindire, zonare. În flora spontană crește în locuri înșorite, pe nisipuri, de-a lungul râurilor, pe lângă garduri, drumuri, în zona de șes și deal, îndeosebi în întreaga Cîmpie de Vest (mai ales pe nisipurile din zona Valea lui Mihai), Delta Dunării, Muntenia (jud. Giurgiu, Dimbovița, Prahova), Oltenia (jud. Olt, Dolj). În cultură poate valorifica bine terenurile nisipoase, aluviunile adânci, recomandându-se mai ales în jud. Dolj, Teleorman, Ialomița (foarte favorabile), precum și Arad, Bihor, Constanța, Tulcea, Prahova.

Tehnologia de cultură. Premergătoare — cereale de toamnă, prășitoare îngrășate. **Îngrășăminte** — fosfor 60 kg/ha încorporate la arătura de bază; azot 60 kg/ha primăvara, pe zăpadă. **Pregătirea terenului** — arătură adâncă la 28—30 cm; cu 2—3 săptămîni înaintea semănăturii se nivelează și se lucrează cu combinatorul sau cu discul în agregat cu grapa cu colți reglabili.

Însămînțare — cu semănătoarea SUP-21 cu limitatoare de adîncime, cu 8 kg/ha, la interval de 50 cm și 1—1,5 cm adîncime. **Lucrări de întreținere** — plivit, 1—2

prășile manuale și mecanice, rărit cînd plantele au 4—5 cm înălțime; în anul II, 1—2 prășile manuale și mecanice. **Recoltare** — în anul II, cu plug fără cormană care să mobilizeze solul sub 35 cm.

Rădăcinile se scutură de pămînt cu furca, se spală, se decoletează și se trec la deshidratare.

Principii active. Saponozide triterpenice.

Acțiune farmacologică. Expectorant; diuretic; depurativ; vermifug.

FLORĂ SPONTANĂ CULTURĂ



Recomandări majore. Bronșite, tuse de diverse etiologii — în faza de coctiune.

Alte recomandări. INT. — Afecțiuni urinare; dermatoze.

EXT. — Plăgi, eczeme, furuncule; combaterea oxiurilor; faringite granuloase.

Mod de administrare. INT. — Decoct (1 linguriță la cană), 3—5 linguri pe zi; macerat la rece (cu aceeași posologie). EXT. — Spălături locale cu decoct; gargarisme; bai de șezut contra oxiurilor.

CAPSELLA BURSA PASTORIS (L.) MEDIK. — FAM. CRUCIFERAE.

Fr.: Bourse-à-pasteur; G.: Hirtentäschel; M.: Pásztortáska; R.: Pastușia sumka abiknavennaia.

Plantă firavă, cu rozetă de frunze bazale, tulpină neramificată, cu floricelele albe într-o inflorescență alungită și fructe silicve în forma unor trăistuțe.

Partea utilizată. Partea aeriană (Herba Bursae pastoris) — IV—VI.

Ecologie, răspindire. Are o amplitudine ecologică extrem de largă, din câmpie pînă în pășunile din etajul subalpin, adesea în masă, crește prin livezi, culturi, pe marginea drumurilor, pe lângă ziduri.

Recoltare. Prin smulgerea plantelor cărora li se îndepărtează apoi rădăcinile sau prin cosirea plantelor, dacă sînt în masă, dar produsul fără rozetă bazală este mai puțin valoros.

Principii active. Amine (colina, acetilcolina, tiramina), derivați flavonici (hisopină, acid protocatehic), glicozide, săruri de potasiu, urme de alcaloizi, tanin.

Acțiune farmacologică. Uterotonic; reglează fluxul menstrual; reglează tensiunea arterială; astringent (antihemoragic și antidiareic).

Recomandări majore. Afecțiuni uterine, metroragii, dismenoree.

Alte recomandări. Hemoragii (sîngerări nazale, hematurie); hipertensiune; ateroscleroză; diaree benignă.

Mod de administrare. Infuzie (1 lingură la cană), 1—2 cani pe zi; în metroragii și dismenoree se începe cu 7—10 zile înainte de începerea ciclului; tinctură (20 g plantă macerată 7 zile în 100 ml alcool), 3 lingurițe pe zi.



CRATAEGUS MONOGYNA JACQ., C. OXYACANTHA
L. — FAM. ROSACEAE

Fr.: Aubépine; G.: Weissdorn; M.: Galagonya;
R.: Boiarişnik adnopesticinii.

Arbust ghimpos (mai rar arbore), cu flori albe pe tipul 5 în buchete comune cu frunzele mici şi lobate.

Părţile utilizate. Florile (Flores Crataegi) — IV—V; buchetele de frunze cu flori (Folia Crataegi cum floribus) — IV—V; fructele (Fructus Crataegi) — IX—XI.

Ecologie, răspindire. Specie puţin pretenţioasă faţă de climă şi sol, creşte la marginea pădurilor de şes şi deal, mai ales în păşuni şi poiene, în întreaga ţară.

Recoltare. Florile prin ciupire; buchetele de flori cu frunze prin strujire (deoarece arbustul este ghimpos, se pot confecţiona palmare cu care să se evite zgîrieturile); fructele, fie direct de pe arbust, fără codiţe, fie prin scuturare sau batere pe o prelată, după care se curăţă de codiţe prin sitare.

Principii active. Flavone, colină, acetilcolină, trimetilamină, acizii cafeic, crategolic, ursolic, tanin, ulei volatil, iar în fructe şi vitaminele C şi din complexul B.

Acţiune farmacologică. Sedativ cardiac şi nervos; antispasmodic; vazodilatator, îndeosebi la nivel coronarian; hipotensor; tonic cardiac şi bradicardizant (rărire a contracţiilor inimii); uşor astringent.

Recomandări majore. Tulburări cardiace cu substrat nervos; dereglări de ritm cardiac, palpitaţii; ischemii.

Alte recomandări. INT. — Hipertensiune, angină pectorală, ateroscleroză; insomniile cardiilor; tulburări de menopauză. EXT. — Inflamaţii bucofaringiene.

Mod de administrare. INT. — Infuzie (1 lingură la cană) care se bea în cursul unei zile, din care cel puţin 1/3 seara înainte de culcare; tinctură (20 g macerate 10 zile în 100 ml alcool), de 3 ori pe zi câte 10—15 picături, ultima priză înainte de culcare. EXT. — Gargară cu infuzie.

Intră în formula ceaiurilor calmant contra tulburărilor cardiace, antiastmatic, calmant.



RUBUS IDAEUS L. — FAM. ROSACEAE

Fr.: Framboisier; G.: Himbeere; M.: Málna; R.: Malina.

Arbust tufos, ghimpos, cu lăstari tîrîtori, tulpina arcuită spre vîrf, frunze cu 3 sau 7 foliole (pe ramurile sterile), foliole ovate cu dinți neregulați pe margine, alb-păroase pe spate, flori albe în inflorescențe.

Partea utilizată. Frunzele (Folium Rubi idaei) — VII—VIII.

Ecologie, răspîndire. Plantă de deal și munte care crește prin luminișuri, pe coaste stîncoase, dar în special în tăieturi și doborîturi. Uneori zmeurul este cultivat.

Recoltare. Prin strujire, înainte și în timpul înfloririi.

Principii active. Tanin, flavonoide, vitamina C, acizi organici.

Acțiune farmacologică. Astringent energic (antidiareic și antihemoragic); diminuează aciditatea crescută; ușor diuretic.

Recomandări majore. Enterite, enterocolite, diaree rebele.

Alte recomandări. INT. — Hemoragii (inclusiv în dismenoree, metroragii); gastrite hiperacide; afecțiuni ale aparatului urinar. EXT. — Stomatite, laringite.

Mod de administrare. INT. — Infuzie (1 linguriță la cană), 2 căni pe zi. EXT. — Gargară (cu infuzie în concentrație de 2—3 ori mai mare).

Intră în formula ceaiului aromat.



RUBUS FRUTICOSUS L. — FAM. ROSACEAE

Fr.: Bonce, Mûre; G.: Brombeere; M.: Hamvas szeder;
R.: Ejevika.

Arbust viguros, cu numeroase tulpini, cu ghimpi puternici în formă de gheară, lăstari muchiați cu ghimpi mai mici dispuși uniform pe muchii, frunze cu 5 foliole (cea terminală mai mare), cu dinți neregulați pe margine și peri pe nervuri, flori albe în raceme.

Partea utilizată. Frunzele (Folium Rubi fruticosi) — VI—VII.

Ecologie, răspândire. Murul crește în regiunile deluroase, la marginea pădurilor, în tufișuri, pe coastele dealurilor. Solicită luminozitate directă, umiditate moderată, soluri revente.

Recoltare. Prin strujire, înainte și în timpul înfloririi (mîna va fi apărută cu o mînușă sau cu un ciorap).

Principii active. Tanin, flavonoide, acizi organici, vitamina C.

Acțiune farmacologică. Antidiareic; antihemoragic; ușor dezinfectant; ușoară diminuare a glicozuriei.

Recomandări majore. Diaree (tonic și astringent).

Alte recomandări. INT. — Colite; hemoragii; diabet (numai în adaos la alte plante, ca de ex. frunze de afin, salvie ș.a.). EXT. — Angine, afte, stomatite; hemoroizi și fisuri anale; leucoree.

Mod de administrare. INT. — Infuzie (1 1/2 linguriță la cană), 2—3 căni pe zi. EXT. — Decoct concentrat (2 linguri la cană) pentru gargarisme, spălături locale.



FRAGARIA VESCA L. — FAM. ROSACEAE

Fr.: Fraisiert; G.: Wald-Erdbeere; M.: Erdei szamóca;
R.: Zemlianka lesnaia.

Specie erbacee perenă, înaltă de 5—20 (30) cm, cu rozetă de frunze la bază și stoloni, flori albe pe tip 5.

Partea utilizată. Frunzele* (Folium Fragariae) — VI—IX.

Ecologie-răspindire. Plantă foarte comună care se întâlnește prin poieni, pajiști, fânețe, păduri, pe soluri ușoare, în toate zonele de deal și munte din întreaga țară (cu excepția Dobrogei).

Recoltare. Se rup cele 3 foliole, fără pețiolul principal; se îndepărtează resturile de pețoli și stoloni.

Principii active. Tanin, flavone, fragarină (fenol specific), vitamina C, ulei volatil.

A acțiune farmacologică. Astringent-antidiareic; diuretic cu eliminare de acid uric și urați; antisudorific.

Recomandări majore. Enterite, colite cu tendințe diareice.

Alte recomandări. INT. — Afecțiuni renale și vezicale; litiază urică; gută (prin eliminare masivă de acid uric); transpirație excesivă. EXT. — Angină.

Mod de întrebuințare. INT. — Infuzie (1—2 lingurițe la cană), 2 cani pe zi. Pentru mărirea efectului antidiareic se poate face o scurtă decoctie. EXT. — Gargară cu infuzie concentrată.

Intră în formula ceaiului aromat.



* Se admit și frunze de la specia înrudită din flora spontană *Fragaria viridis*, ca și de la Căpșun (*Fragaria moschata*).

PRUNUS SPINOSA L. — FAM. ROSACEAE

Fr.: Prunellier; G.: Schlehdorn; M.: Kőkény;
R.: Sliwa kaliuciaia.

Arbust spinos care înflorește abundant foarte timpuriu, înainte de înfrunzire. Toamna, fructele globuloase devin negre-albăstrui.

Partea utilizată. Florile (Flores Pruni spinosi) — IV; fructele (Fructus Pruni spinosi) — X—XI.

Ecologie, răspândire. Porumbarul este puțin pretentios la condițiile de mediu, rezistă la secetă și ger, dar nu suportă umbrirea. Are cerințe foarte reduse față de sol. Este larg răspândit în zona de cîmpie și colinară, în luminișuri, margini de păduri, terenuri necultivate, coaste pietroase și înșorite, răzoare, margini de drumuri și căi ferate, pășuni și finețe neglijate.

Recoltare. Florile se recoltează prin ciupire sau prin baterea ușoară a ramurilor pe o prelată sau prin tăierea ramurilor înflorite, care mai întâi se usucă, apoi se scutură. Fructele, după căderea brumei, se culeg cu mina sau prin scuturarea arbustului pe prelate.

Principii active. Glicozide cianogenetice, flavonozide (în flori); tanin, fosfați (în fructe).

Acțiune farmaceutică. Florile — ușor laxative; slab hipotensive; diuretice; depurative; ușor analgezice. Fructele — astringente (antidiareice și antihemoragice); diuretice și antiseptice renale; coleretic-colagoge.

Recomandări majore. Florile — afecțiuni renale; constipație. Fructele — diaree.

Alte recomandări. Florile — INT. — Hipertensiune; stări de agitație; dureri de diverse etiologii. EXT. — Dermatoze. Fructele — INT. Hemoragii; afecțiuni renale (inclusiv litiază renală); uremie, gută; diskinezie biliară.

Mod de administrare. Florile — infuzie (1 linguriță la cană), 2—3 cani pe zi. Fructele — decoct (1 linguriță la cană), 2 cani pe zi.



CERASUS AVIUM (L.) MNCH., C. VULGARIS MILL. —
FAM. ROSACEAE

Fr.: Cerisier; Griottier; G.: Vogelkirsche; Sauerkirsche;
M.: Cseresnyefa; Meggyfa; R.: Vișnia pticia; Vișnia
abiknavennaia.

Binecunoscuți arbori fructiferi, secundar și cu importanță
medicinală.

Partea utilizată. Pedunculii — codițele (Stipites
Cerasorum) — VI—VII.

Ecologie, răspândire. Atît cireșul cît și vișinul se cultivă
în toate regiunile țării. În flora spontană, cireșul este
întîlnit în păduri din zona de cîmpie și pînă în etajul
montan (1000 m).

Recoltare. Cantități reduse din consumul casnic, în
cantități mai mari de la fabricile de conserve, numai
de la cireșe și vișine nepulpate, îndepărtîndu-se
sîmburii, frunzele și alte impurități. Uscarea la soare,
în strat subțire.

Principii active. Săruri de potasiu, taninuri catehice,
flavonoide.

Acțiune farmacologică. Diuretic (cu ușoară acțiune
antiinflamatoare); ușor astringent — antidiareic.

Recomandări majore. Afecțiuni catarale ale tractului
urinar (cistite, pielite, pielonefrite).

Alte recomandări. Antidiareic.

Mod de întrebuițare. Decoct (1 lingură cu vîrf, cca
10 g la 1 l apă) care se bea în cursul unei zile; se
poate ajunge chiar la 2 l pe zi.

Intră în formula ceaiului diuretic 3.



ROBINIA PSEUDACACIA L. — FAM. LEGUMINOSAE

Fr.: Robinier; G.: Gemeine Robinie; M.: Fehér akác;
R.: Robina lojnoakația.

Cunoscut arbore la noi în țară, salcîmul are lujeri spinoși, coroană mare, luminoasă, rară, frunze imparipenat compuse, flori papilionate în inflorescențe de tip racem, pendente.

Partea utilizată. Florile (Flores Acaciae) — V—VI.

Ecologie, răspindire. Specie cu vitalitate deosebită, salcîmul vegetează în condiții foarte variate, îndeosebi în zona de cîmpie, pe soluri ușoare, nisipoase, pe care le fixează. Este plantat în liziere, la marginea drumurilor și crește îndeosebi în sudul Olteniei, întreaga Muntenie, sudul Moldovei (Galați, Vrancea, Vaslui), vestul Transilvaniei, adesea formînd singur păduri întinse.

Recoltare. Inflorescențele se strujesc și se usucă la soare.

Principii active. Flavonoide (robinină, acaciină); ulei volatil.

Acțiune farmacologică. Calmează senzațiile de pirozis (arsuri), diminuează hiperaciditatea gastrică; antispasmodic al tractului respirator; ușor sedativ.

Recomandări majore. Gastrite hiperacide (cu senzații de pirozis), ulcer gastric.

Alte recomandări. Tuse obișnuită, convulsivă și astmatică; insomnii, migrene.

Mod de administrare. Infuzie (o lingură la cană), 2—3 cîni pe zi.

Intră în formula ceaiului gastric calmant.



PHASEOLUS VULGARIS L. — FAM. LEGUMINOSAE

Fr.: Haricot; G.: Bohne; M.: Paszuly, Bab; R.: Fasoli abiknavennaia.

Plantă cultivată în scopuri alimentare, secundar cu proprietăți medicinale.

Partea utilizată. Tecile păstăilor albe, nepătate (Fructus Phaseoli sine semine) — IX—X.

Recoltare. Tecile de la soiurile cu păstaia albă, nepătate, se preiau de la batozatul fasolii. Se curăță de vrejuri, resturi de frunze, păstăi pătate.

Principii active. Aminoacizi esențiali (arginină, asparagină, tirozină, triptofan), acid salicic, acid fosforic, săruri minerale.

Acțiune farmacologică. Diuretic; calmant al spasmelor; depurativ; antireumatic, antigutos; ușor hipoglicemiant; remineralizant.

Recomandări majore. Afecțiuni cronice ale rinichilor și căilor urinare (inclusiv litiază), hidropizie, edeme cardiorenale.

Alte recomandări. Acnee, eczeme, erupții; reumatism, gută; diabet; reconstituant pentru convalescenți, TBC pulmonar.

Mod de administrare. Decoct (o lingură la cană), 2—3 căni pe zi; macerat la rece (4 linguri la litru), apoi decoctie pînă scade la jumătate; se bea în cursul unei zile.

Intră în compoziția ceaiurilor antireumatic și dietetic.



ALTHAEA OFFICINALIS L. — FAM. MALVACEAE

Fr.: Guimauve; G.: Eibisch; M.: Orvosi ziliz; R.: Altei lekarstvennii.

Specie ierboasă perenă, erectă, înaltă de 1—1,50 m sau chiar mai mult, cu peri pisloși pe întreg aparatul vegetativ, puțin ramificată, frunze lung pețiolate, ușor lobate, flori pe tipul 5, dispuse în raceme terminale, cu corola alb-roză.

Părțile utilizate. Frunzele (Folium Althaeae) — VI—IX; rădăcinile (Radix Althaeae) — III—IV și X—XI.

Ecologie, răspindire, zonare. Plantă pretențioasă față de umiditatea solului, suportând chiar apa freatică la mică adâncime, rezistind în schimb bine la umiditatea atmosferică mai redusă. Este o plantă de lumină puternică, suportând temperaturile ridicate. Necesită soluri permeabile, ușoare, chiar nisipoase. Se adaptează foarte ușor la reacția solului. În flora spontană vegetează numai în zona de cimpie, pe lângă ape curgătoare sau bălți, în zăvoaie, pe lângă trestiișuri, mai ales în județele limitrofe Dunării (Mehedinți, Dolj, Teleorman, Giurgiu, Ialomița, Brăila), în întreaga Dobroge (îndeosebi în Delta Dunării), în Cîmpia de Vest.

Tehnologia de cultură. Premergătoare — leguminoase pentru boabe, cereale de toamnă, borceag. **Îngrășămintă** — fosfor și potasiu câte 40—50 kg/ha la arătura de bază; azot 80—100 kg/ha aplicat primăvara, foarte timpuriu.

Pregătirea terenului — arătură de bază la adâncimea de 28—30 cm, lucrare cu combinatorul sau cu discul în agregat cu grapa cu colți reglabili. **Însămînțare** — în pragul iernii cu semănătoarea SUP-21, la 75 cm interval și 1—2 cm adâncime, cu 8—10 kg/ha. **Lucrări de întreținere** — plivit, 1—2 prașile manuale și tot atâtea mecanice, rădirea plantelor la 5—8 cm. În toamna primului an tulpinile se cosesc. În anii II și III, 1—2 prașile și tăierea tulpinilor la sfîrșitul fiecărui an.

Recoltarea — rădăcinile în toamna anului III, cu plugul fără cormană. Se scutură cu furca și se spală. Frunzele se recoltează din anul II, în timpul înfloririi.

Recoltare din flora spontană. Frunzele prin ciupire; rădăcinile cu cazmaua (coletul se taie imediat și se reintroduce în sol).

FLORĂ SPONTANĂ



Principii active. Mucilagii, tanin, flavonoizi, vitamine (A, B₁, B₂, C).

Acțiune farmacologică. Emolient; ușor laxativ; maturativ.

Recomandări majore. Tuse, bronșite, laringită (în prima fază — iritativă).

Alte recomandări. INT. — Enterite, constipații, cistite. EXT. — Dureri de gât, amigdalite, afte; furunculoză; iritații ale pleoapelor și obrazului; cuperoză. COSM. — Ten uscat.

Mod de administrare. INT. — Macerat la rece sau infuzie (1 lingură la cană), 3 cani pe zi. EXT. — Decoct concentrat (30 g la litru). Frunzele intră în formula ceaiului pectoral și pentru gargară.

RHAMNUS FRANGULA L. — FAM. RHAMNACEAE

Fr.: Bourdaine; G.: Faulbaum; M.: Kutjabenge;
R.: Kruščina olhavidnaia.

Arbust înalt de 1—3 m, cu coroană rară din ramuri subțiri, ascendente, cu lenticile alungite pe scoarță, frunze eliptice, cu 8—9 perechi de nervuri proeminente, flori albe în buchete la subsuoara frunzelor, fructe sferice negre-violet.

Partea utilizată. Coaja (Cortex Frangulae) — III—VI.

Ecologie, răspândire. Specie din subarboret care crește în păduri cu exces de umiditate, pe malul apelor, în zăvoaie, locuri mocirloase, mlaștini, îndeosebi în zona de deal. Este răspândit în Transilvania (cu deosebire în jud. Brașov, Cluj, Bistrița-Năsăud, Arad, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Satu-Mare, Sălaj, Timiș), mai puțin în nordul Moldovei (jud. Suceava), în rest se întâlnește cu totul sporadic.

Recoltare. În două etape: — tăierea tulpinilor și a ramurilor de 2—4 ani (max. 1/3—1/2 din coroană); — decojirea ramurilor prin înelări făcute la 25—30 cm unite printr-o tăietură longitudinală. Este contraindicată decojirea ramurilor direct pe arbust, deoarece aceasta duce la uscarea arbustului.

Principii active. Derivați antracenici.

Acțiune farmacologică. Laxativ-purgativ până la purgativ drastic (în funcție de doză) prin creșterea peristaltismului intestinului gros; coleretic-colagog.

Recomandări majore. Constipații, inclusiv cele cronice, sau care nu cedează la alte tratamente.

Alte recomandări. Insuficiență hepatică; diskinezie biliară; obezitate; administrare împreună cu vermifuge pentru eliminarea viermilor intestinali.

Mod de administrare. Decoct (1—2 lingurițe la cană) care se bea seara la culcare, doza stabilindu-se gradat. Intră în formula ceaiurilor laxativ, laxativ-antihemoroidal, hepatic și a pulberii laxative.



CARUM CARVI L. — FAM. UMBELLIFERAE

Fr.: Cumin des prés; **G.:** Kümmel; **M.:** Köménymag;
R.: Tmin.

Specie erbacee bianuală, spontană și cultivată. În anul I cu o rozetă de frunze, în anul II cu tulpină înaltă pînă la 1 m, frunze bi sau tripenate cu lacinii înguste, inflorescențe de tip umbelă cu flori albe.

Partea utilizată. Fructele (Fructus Carvi) — VII—VIII.

Ecologie, răspîndire, zonare. Chimionul este una din cele mai răspîndite plante medicinale cultivate în nordul Moldovei, pe dealurile din vestul țării, Podișul Transilvaniei și Țara Birsei, regiuni cu temperaturi nu prea înalte și cu umiditate ridicată. În flora spontană se întâlnește frecvent în fînețele montane.

Tehnologia de cultură. Premergătoare — cereale de toamnă, ierburi perene, prășitoare. **Îngrășămintă** — fosfor 40—50 kg/ha și potasiu 50—60 kg/ha încorporate la arătura de bază (se repetă doza de fosfor la încheierea primului ciclu vegetativ); azot 45—50 kg/ha administrat înaintea însămînțării și respectiv 35—40 kg/ha în anul II de vegetație, primăvara, pe zăpadă. **Pregătirea terenului** — discuri repetate la 10—12 cm, urmate de arătură adîncă de toamnă la 28—30 cm; primăvara se trece cu grapa cu discuri și cu colți reglabili, după care se face o lucrare cu combinatorul. **Însămînțare** — primăvara devreme cu semănătoarea SUP-21 sau SUP-29 cu limitatoare de adîncime, cu 8 kg/ha, la intervale de 50 cm și adîncime de 1—2 cm. **Lucrări de întreținere** — în primul an 4—5 prașile, 2—3 pliviri și răririi la 8—10 cm între plante; în anul II, primăvara, grăpare puternică pe rînd și perpendicular pe rînduri, 2—3 prașile mecanice. **Recoltare** — la maturarea a 65—75% din fructe, cu combina C 12; în primele 2—3 zile semințele se lopătează pentru îndepărtarea excesului de umiditate.

Principii active. Ulei volatil cu 50—60% carvonă, 30% limonen.

Acțiune farmacologică. Carminativ; calmarea colicilor intestinale; stimulent al funcțiilor gastrice; diuretic; fluidifiant al secrețiilor bronhice; emenagog; galactogog; vermifug.



Recomandări majore. Aerofagie, balonări, colici (îndeosebi la copii).

Alte recomandări. Tulburări dispeptice; anorexie; afecțiuni renale; bronșite; reglarea ciclurilor întîrziate sau amenoree; stimularea lactației la femeile care alăptează; viermi intestinali.

Mod de administrare. Infuzie (1 1/2 lingurițe la cană) înainte meselor principale.

PIMPINELLA ANISUM L. — FAM. UMBELLIFERAE
Fr., G., R.: Anis; M.: Keleti anizs.

Specie anuală, exclusiv de cultură, înaltă de 40—70 cm, cu frunze rare, cele inferioare întregi, dințate, cele superioare penat sectate, inflorescențe umbele.

Partea utilizată. Fructele (Fructus Anisi) — VIII.

Ecologie, zonare. Anasonul are nevoie de multă căldură, de lumină directă, umiditate moderată; soluri bogate, afinate, cu pinza freatică mai superficială. Se recomandă a fi cultivat în jud. Ialomița, Călărași, Giurgiu, Teleorman, Olt, Timiș, Constanța.

Tehnologia de cultură. Premergătoare — cereale bine îngrășate, prășitoare; nu poate reveni pe aceeași solă decât după 4—5 ani, cât și după coriandru. **Îngrășăminte** — fosfor 40—60 kg/ha la arătura de bază; azot 50 kg/ha primăvara, înainte de însămînțare. **Pregătirea terenului** — după cereale se ară imediat la adîncimea de 10—12 cm, terenul se menține curat de buruieni pînă toamna, cînd se ară la 22—25 cm; primăvara, grăpat, nivelat, lucrare cu combinatorul la 4—6 cm adîncime. **Însămînțare** — cu semănătoarea SUP-21 sau SUP-29 cu distribuitor pentru semințe mici și limitator de adîncime, la 50 cm interval, 2—3 cm adîncime, cu 12 kg/ha. **Lucrări de întreținere** — prașilă oarbă, 1—2 pliviri, 2—3 prașile mecanice și manuale; erbicidare cu Afalon imediat după semănat, cu MEF-1200, cu 5 kg/ha. **Recoltare** — cînd 70—85% din fructe au culoare cenușie, cu combina C 12 amenajată ca pentru coriandru. Pentru buna păstrare a fructelor, acestea se îropătează obligatoriu în primele 2—3 zile.

Principii active. Ulei volatil bogat în anetol, aldehidă anisică, colină, cetone.

Ațiune farmacologică. Carminativ; antispastic; stomachic; expectorant; galactogog; tonic nervin; stimulent pancreatic.

Recomandări majore. Colici (îndeosebi la copii), balonări.

Alte recomandări. Tulburări dispeptice, atonii gastrice; bronșită, traheită, laringită; stimularea lactației la femeile care alăptează; insuficiență pancreatică; astenie nervoasă.



Mod de administrare. Infuzie (adulți 1/2 linguriță la cană, sugari 5—6 fructe la 100 ml apă).

Contraindicații. Gastrită hiperacidă, ulcer, enterocolită acută sau cronică.

CORIANDRUL

CORIANDRUM SATIVUM L. — FAM. UMBELLIFERAE

Fr.: Coriandre; G.: Koriander; M.: Koriänder;
R.: Koriandr pasevnoi.

Plantă anuală exclusiv de cultură, înaltă de 0,30—1 m, cu frunze bazale divizate în segmente ovale, cele superioare profund dințate, flori în umbel compuse, albe sau roz, cu miros specific, neplăcut.

Partea utilizată. Fructele (Fructus Coriandri) — VII—VIII.

Ecologie, zonare. Avînd origine mediteraneeană, coriandrul dă cele mai bune rezultate în zonele cu temperaturi mai ridicate, unde și conținutul de ulei volatil este mai ridicat. Față de umiditate are exigențe mai mari în timpul răsării și înfloririi. Cere soluri bogate, adînci, revene, cu structură. Se cultivă în toată Cîmpia Română, Cîmpia de Vest, Cîmpia Dobrogei (zonele cele mai favorabile), zona de cîmpie a Moldovei, (în special în sud-est), mai puțin în Transilvania.

Tehnologia de cultură. Premergătoare — cereale de toamnă, prășitoare, ierburi perene. **Îngrășămintă** — fosfor 40—50 kg/ha și potasiu 30—35 kg/ha încorporate în arătura de bază; azot 60—70 kg/ha administrat primăvara timpuriu. **Pregătirea terenului** — după cereale, lucrare cu grapa cu discuri, arătură de toamnă la adîncimea de 25—26 cm; primăvara, grăpare, nivelare, lucrare cu combinatorul la max. 4—5 cm; **Însămînțare** — primăvara devreme, cu semănătoarea SUP-21, SUP-29 sau SUP-48, cu 20 kg/ha (material tratat termic), la intervale de 12,5 cm pe terenuri curate, iar pe cele îmburuienate la intervale de 25 sau 50 cm și adîncime de 2,5—4 cm. **Lucrări de întreținere** — plivit și prășit de cîte ori este cazul; erbicidare cu 5 kg/ha Gesagarde-50 diluat în 400—600 l apă la 1—2 zile după însămînțare cu ME-120. **Recoltare** — la maturarea a 65—75% din fructe cu combina C 12; în primele 2—3 zile se lopătează pentru îndepărtarea excesului de umiditate, cu lopata de lemn, pentru a se evita spărturile care au valoare mai redusă.

Principii active. Ulei volatil (cu linalol, geraniol, pinene).

CULTURI



Acțiune farmacologică. Carminativ; tonic-stomachic; nervin; vermifug, bactericid și fungicid; sedativ pentru dureri reumatismale.

Recomandări majore. Aerofagie, balonări, colici (indeosebi la copii).

Alte recomandări. INT. — Tulburări dispeptice; anorexie; astenie nervoasă; helmintiaze. EXT. — Dureri reumatismale.

Mod de administrare. INT. — Infuzie (1/2 linguriță la cană) care se consumă în cursul zilei; infuzie concentrată ca vermifug (20 g la 100 ml apă) luată în priză unică dimineața pe stomacul gol. EXT. — Loționări cu infuzie concentrată.

Întră în formula ceaiurilor gastric 2, tonic aperitiv și contra colicilor pentru copii.

CONVOLVULUS ARVENSIS L. — FAM.
CONVOLVULACEAE

Fr.: *Liseron des champs*; G.: *Ackerwinde*; M.: *Mezei szulák*; R.: *Viunok*.

Specie ierboasă perenă, volubilă în jurul unor suporturi, iar în lipsa acestora se întinde pe sol, cu frunze sagitate și flori albe, solitare, cu corola în formă de pîlnie.

Partea utilizată. Planta întreagă (Herba Convolvuli)* V—IX.

Ecologie, răspîndire. Volbura este o plantă de lumină, comună în întreaga țară, în zona de cîmpie și deal, ca buruiiană de culturi; mai crește și pe locuri necultivate.

Recoltare. Prin smulgerea plantei cu rădăcină cu tot sau alegerea ei din buruienile tăiate la prășit. Se îndepărtează frunzele îngălbenite, fructificațiile, ca și fragmentele din alte plante.

Principii active. Rezine (din heterozidele convolvulina și jalapina), tanin, vitamina C.

Acțiune farmacologică. Laxativ energic; coleretic-colagog; maturativ.

Recomandări majore. Constipații.

Alte recomandări. INT. — Afecțiuni hepatice (îndeosebi diskinezii biliare, colecistite). EXT. — Furuncule și abcese.

Mod de administrare. INT. — Infuzie (1 linguriță la cană), băută dimineața; tinctură (20 g macerate 10 zile în 100 ml alcool), 20—30 picături de 2 ori pe zi; pulbere amestecată cu miere, dimineața înainte de micul dejun. EXT. — Cataplasme cu infuzie concentrată (2 linguri la cană).

Intră în formula ceaiurilor laxativ și hepatic.

* Sub aceeași denumire se poate folosi și specia înrudită *Calystegia sepium* (Cupa-vacii), mai robustă, cu flori mai mari.



MARRUBIUM VULGARE L. — FAM. LABIATAE

Fr.: Marrube blanc; G.: Weisser Andorn; M.: Orvosî pemetefû; R.: Șandra abiknavennaia.

Plantă erectă, înaltă de 30—80 cm, alb-cenușie (din cauza perilor deși și moi), cu tulpina în 4 muchii, frunze opuse, ovale, flori mici, alb-murdare, în verticile strânse, la subsuoara frunzelor.

Partea utilizată. Partea aeriană (Herba Marrubii) — VI—VIII.

Ecologie, răspîndire. Specie adaptată la condiții de ariditate, rezistentă la secetă, nepretențioasă față de sol. Este răspîndită pe marginea drumurilor, pe terenuri necultivate, pășuni degradate și aride, mai ales în zona de stepă a Olteniei (jud. Mehedinți, Dolj, Olt), Munteniei (jud. Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila), în întreaga Dobroge, estul Moldovei (jud. Galați, Vaslui, Iași, Botoșani).

Recoltare. Se taie vîrfurile tulpinale (20—30 cm) și ramificațiile, astfel încît să nu se recolteze cu părțile lignificate. Se usucă la umbră.

Principii active. Un principiu amar (marubiina), acid marubic, tanin, ulei volatil, saponine, mucilagii, saponozide, colină.

Acțiune farmacologică. Coleretic-colagog; tonic-amar; expectorant și emolient; reglează ritmul cardiac; febrifug; astringent și cicatrizant.

Recomandări majore. Colecistite, diskinezii biliare.

Alte recomandări. INT. — Anorexie; bronșită cronică, astm, tuse de diferite etiologii; tulburări de ritm cardiac (aritmii, palpitații); stări febrile la persoane cu intoleranță la chinină. EXT. — Unele boli de piele, ulceratii învechite, răni.

Mod de întrebuințare. INT. — Infuzie (1 linguriță la cană), 1—2 căni pe zi, înainte de masă ca tonic-amar și în mai multe reprize pentru celelalte utilizări; pulbere (2—4 g/zi). EXT. — Băi locale sau comprese cu infuzie (20—30 g/l).

Intră în formula ceaiului antiastmatic.



LAMIUM ALBUM L. — FAM. LABIATAE

Fr.: **Lamier blanc**; G.: **Weisse Taubnessel**; M.: **Fehér árvacsálan**; R.: **Iasnotka belaia**.

Plantă erbacee perenă, înaltă de 20—50 (70) cm, cu tulpină în 4 muchii pe care sînt dispuse frunze opuse, dințate, triunghiular-ovate și flori albe labiate (cu 2 buze), dispuse ca un guler la subsuoara frunzelor.

Partea utilizată. Florile (Flores Lamii albi) — IV—IX; partea aeriană (Herba Lamii albi) — IV—IX.

Ecologie, răspindire. Vegetează în șanțuri umede, margini de păduri, în întreaga țară, mai rară în zona de cîmpie, mai abundentă în zona colinară pînă în cea subalpină, îndeosebi în Transilvania, Muntenia (jud. Argeș, Prahova), Moldova (jud. Neamț, Suceava).

Recoltare. Florile prin ciupire, partea aeriană prin tăierea tulpinilor de sub ultimele frunze, iar dacă planta vegetează în masă, prin cosire.

Principii active. Mucilagii, flavonozide, saponozide, taninuri, glicozide, ulei volatil, săruri de potasiu.

Acțiune farmacologică. Decongestiv; emolient și expectorant; astringent; vasoconstrictor.

Recomandări majore. Hipertrofii de prostată.

Alte recomandări. INT. — Leucoree, dismenoree; tulburări nervoase în timpul menopauzei; afecțiuni respiratorii; catar intestinal; hemoragii, sîngerări nazale; diaree. EXT. — Abcese, varice, arsuri, ulceratii ale pielii, umflături gutoase; leucoree (împreună cu tratamentul intern).

Mod de administrare. INT. — Infuzie (1/2 linguriță flori sau 1 linguriță din partea aeriană la cană), 2 căni pe zi, prima dimineața, a doua între masa de prînz și de seară. EXT. — Băi locale cu infuzie de 2—3 ori mai concentrată; spălături vaginale antileucoreice cu infuzie (50 g plantă la litru), seara înainte de culcare.

Confuzii. Sînt numeroase alte specii de urzică moartă, dar cu floare colorată, fie roșie (*Lamium purpureum*, *L. amplexicaule*, *L. maculatum*), fie galbenă (*Galeobdolon luteum*).

Față de alte Labiatae cu flori albe se deosebește prin corola mult mai mare.



MELISSA OFFICINALIS L. — FAM. LABIATAE

Fr.: Mélisse; G.: Citronen-Melisse; M.: Méhfű, Citromfű; R.: Melissa lekarstvennaia.

Specie erbacee din culturi și flora spontană, perenă, tufos ramificată, înaltă de 30—80 (120) cm, cu miros aromatic de lămie, tulpina în 4 muchii, florile grupate în verticile la toate nodurile.

Partea utilizată. Frunzele (Folium Melissaе) — VII—IX.

Ecologie, răspindire, zonare. În flora spontană crește dispersată în sudul și vestul țării, prin locuri uscate, pietroase, luminișuri și locuri poienite din păduri de stejar, pajiști. Dacă este cultivată, are pretenții ridicate față de temperatură și lumină, dar puțin exigentă față de umiditate. Cere soluri profunde, fertile, ușoare. Se recomandă a fi cultivată în Cîmpia de Vest (jud. Timiș), Oltenia (jud. Dolj, Olt), Muntenia (jud. Teleorman, Giurgiu, Ialomița, Călărași, Prahova, Buzău), Dobrogea. **Tehnologia de cultură. Premergătoare** — cereale păioase, prășitoare. **Îngrășămintă** — fosfor și potasiu câte 40—50 kg/ha la arătura de bază; azot 50—60 kg/ha iarna, pe zăpadă. **Pregătirea terenului** — arătură la adîncimea de 28—30 cm; înaintea însămînțării se aplică lucrarea cu combinatorul, nivelatorul și tăvălugul. **Însămînțare** — cu semănătoarea SUP-21 sau SUP-29 cu distribuitor pentru semințe mici și limitator de adîncime, la 50 cm interval și 0,5 cm adîncime, cu 8 kg/ha sămînță.

Lucrări de întreținere — plivit de cîte ori este nevoie, rărit la 20 cm între plante (cînd au 3—4 perechi de frunze). **Recoltare** — din anul II, la începutul înfloririi, de 2—3 ori pe an.

Principii active. Ulei volatil (cu citral, geraniol, linalol), tanin, acid cafeic, principiu amar.

Acțiune farmacologică. Carminativ; antispastic; antivomitiv; antidiareic; stomachic; coleretic-colagog; sedativ nervos; cicatrizant și antiseptic.

Recomandări majore. Colici gastrice și intestinale, colite de fermentație.

Alte recomandări. INT. — Stări de vomă (îndeosebi la gravide); diaree, dispepsii, atonie gastrică; diskinezie biliară, colecistopatii, anxietate. EXT. — Răni.



Mod de administrare. INT. — Infuzie (1 linguriță la cană), 2—3 căni pe zi. EXT. — Comprese cu infuzie în concentrație dublă.

Întră în formula ceaiurilor anticolitic, aromat, contra colicilor, laxativ.

MAJORANA HORTENSIS MNCH. — FAM. LABIATAE

Fr.: Marjolaine; G.: Wurstkraut; M.: Majorána;
R.: Maioran sadovii.

Specie mediteraneeană, la noi exclusiv de cultură, cu port de tufă mică (20—60 cm), cenușiu-păroasă, cu frunze mici (1—2 cm), ovate și opuse, flori minuscule grupate în inflorescențe globuloase de 0,5 cm la subsuoara frunzelor superioare.

Partea utilizată. Partea aeriană (Herba Majoranae) — VI—IX (2 recoltări).

Ecologie, zonare. Are cerințe ridicate pentru temperatură și umiditate (foarte bune rezultate dă pe terenuri irigate), necesită soluri bogate în humus, adânci, ușoare. Zone favorabile: jud. Giurgiu, Brăila, Buzău, Teleorman, sudul Doljului, Bihor, Neamț.

Tehnologia de cultură. Premergătoare — prășitoare îngrășate cu gunoi de grajd, leguminoase sau cereale de toamnă. **Îngrășăminte** — fosfor 50—60 kg/ha și potasiu 40—50 kg/ha încorporate la arătura de bază; azot 60—80 kg/ha în două etape: la plantare și la prima recoltă. **Pregătirea terenului** — arătura la adâncimea de 22—25 cm, lucrare cu combinatorul și nivelatorul, primăvara înaintea plantatului. **Însămînțare** — în răsadnițe calde, 100 m²/ha, în ianuarie—februarie, cu 0,3 kg/ha; plantarea se face în cîmp după trecerea înghețului sau brumelor târzii, la interval de 50 cm și distanță de 20 cm, cu 2—4 fire la cuib. **Lucrări de întreținere** — prașilă manuală imediat după plantat și cite una după recoltat. **Recoltarea** — cu secera, la 6—7 cm de la colet, în momentul butonizării.

Principii active. Ulei volatil cu terpinen, terpineol, carvacrol; acid ursolic, sitosterină.

Acțiune farmacologică. Tonic-stomachic și tonic-aperitiv; carminativ; sedativ; antiseptic, mărirea diurezei.

Recomandări majore. Dispepsii stomacale; stări nervoase (insomnii, migrene, ticuri, anxietate).

Alte recomandări. INT. — Anorexie; colite de fermentație, balonări; afecțiuni renale. EXT. — Dureri reumatismale, sciatică; rinită.



Mod de întrebuințare INT. — Infuzie (2 lingurițe la cană), 2 căni pe zi, între mese; în caz de insomnie, una înainte de culcare. EXT. — Fricțiuni antireumatismale (cu ulei din 100 g plantă fiartă 1 oră pe baie de apă în 500 ml ulei); inhalatii cu infuzie caldă.

OCIMUM BASILICUM L. — FAM. LABIATAE

Fr.: G.: Basilic; M.: Bazsalikom; R.: Bazilik kamfornii.

Specie erbacee anuală de cultură, ramificată de la bază, înaltă de 20—60 cm, cu tulpini păroase în 4 muchii, frunze ovate, opuse, inflorescențe spiciforme.

Partea utilizată. Partea aeriană (Herba Basilici) — VII—IX.

Ecologie, zonare. Busuiocul solicită multă căldură, lumină, dar suportă și semiumbră. Are cerințe moderate față de umiditate, dar ridicate față de sol (soluri bogate, fertile, permeabile). Recolte bune se pot obține în Cimpia Bărăganului, Burnazului, Olteniei și Timișului.

Tehnologia de cultură. Premergătoare — leguminoase pentru boabe, borceag pentru fin, cereale de toamnă.

Ingrășăminte — fosfor 40—50 kg/ha și potasiu 30—40 kg/ha încorporate la arătura de toamnă; azot 50—60 kg/ha în două etape — primăvara la înființarea culturii și după prima recoltă. **Pregătirea terenului** — arătură de toamnă la adâncimea de 22—25 cm cu plugul în agregat cu grapa stelată; primăvara, lucrare cu combinatorul în agregat cu nivelatorul și grapa cu colți reglabili. **Însămânțare** — cu semănătoarea SUP-21 sau SUP-29, când temperatura solului atinge 15°, la interval de 50 cm și 1—1,5 cm adâncime, cu 4—6 kg/ha. **Lucrări de întreținere** — plivit și prășit de câte ori este nevoie, rărit la 8—12 cm când plantele au 3—4 perechi de frunze. **Recoltare** — în plină înflorire, cu secera, la 6—7 cm de la colet.

Principii active. Ulei volatil, saponozide triterpenice, taninuri.

Acțiune farmacologică. Carminativ; spasmolitic; stomachic; sedativ și antimigrenos; antitusiv; diuretic; galactogog; antiseptic.

Recomandări majore. Meteorism, colici, colită de fermentație.

Alte recomandări. INT. — Dispepsii de natură nervoasă; vomă; diaree; anorexie; astenii, migrene repetate, insomnii pe fond nervos; gripă, bronșită; afecțiuni renale (indeosebi infecțioase); stimularea lactației la femeile care alăptează. EXT. — Afte.



Mod de administrare. INT. — Infuzie (1 lingură la cană), 2 căni pe zi. EXT. — Gargară cu decoct concentrat (2 linguri la 100 ml apă).

SAMBUCUS NIGRA L. — FAM. CAPRIFOLIACEAE.

Fr.: Sureau; G.: Holunder; M.: Fekete bodza; R.: Buzina ciornaia.

Arbust sau arboras, înalt de 4—5 (10) m, cu coroană tufosă, rotunjită, cu măduva mai dezvoltată decât la toate celelalte specii.

Partea utilizată. Florile (Flores Sambuci), fie cu pedunculul inflorescenței („toto“), fie sitate („gerebelt“) V—VI. Fructele (Fructus Sambuci) fără pedunculi — IX—X.

Ecologie, răspindire. Socul este o specie destul de exigentă față de căldură; preferă soluri fertile, bogate în humus, afinate, revene. Se dezvoltă în semiumbra, în subarboretele pădurilor de deal și câmpie, îndeosebi în luminișuri sau margini de păduri, pe lângă garduri. Este răspândit în toată țara.

Recoltare. Florile — la începutul înfloririi (cu max. 75% din flori deschise), pe timp frumos, după ce se ridică roua, prin tăierea inflorescenței; uscarea, de preferat, la soare. După 5—6 ore de uscare, când florile sînt uscate dar pedunculii sînt încă moi, se scutură pentru a se obține produsul superior (sitat sau „gerebelt“). Fructele — prin tăierea inflorescenței care se usucă în strat subțire, pe sfori sau sirme; după uscare se sitează.

Principii active. Ulei volatil, colină, rutină, sambunigrină, glicozide, mucilagii.

Acțiune farmacologică. Sudorific și febrifug; diuretic; ușor laxativ; galactogog; emolient și maturativ; antiseptic.

Recomandări majore. INT. — Răceli, stări gripale, bronșite.

Alte recomandări. INT. — Boli renale și vezicale; reumatism; constipații; obezitate; stimularea lactației în perioada de alăptare. EXT. — Furuncule și abcese; degerături; crize gutoase; conjunctivite și ulcioare.

Mod de întrebuințare. INT. — Infuzie (2 lingurițe la cană), 3 cani pe zi. EXT. — Băi locale calde sau cataplasme cu infuzie concentrată (50—60 g/litru); băi de ochi. Intră în formula ceaiurilor sudorific, antireumatic, depurativ.



ACHILLEA MILLEFOLIUM L. — FAM. COMPOSITAE

Fr.: Millefeuille; **G.:** Schafgarbe; **M.:** Cickafarkóró;
R.: Tisiacielistnic.

Specie ierboasă perenă, înaltă de 20—80 cm, cu frunze fin divizate și inflorescență terminală bogată, albă.

Partea utilizată. Inflorescențele (Flores Millefolii) — VI—IX.

Ecologie, răspindire, zonare. Această plantă larg răspîndită în flora spontană crește în locuri însorite sau umbrite, de la șes pînă la munte, prin finețe, poieni, la margini de păduri, pe lîngă drumuri și căi ferate. Zonare în cultură în sudul și vestul țării unde acumulează mai mult ulei volatil.

Tehnologia de cultură. Premergătoare — prășitoare îngrășate. **Îngrășăminte — fosfor** 50—60 kg/ha la arătura de bază; **azot** 70—80 kg/ha după primul ger. **Pregătirea terenului —** arătura la adîncime de 25—30 cm, discuit, nivelat și tăvălugit. **Însămînțare —** cu SUP-21 cu distribuitor pentru semințe mici, la interval de 50 cm, 0,5 cm adîncime, cu 3 kg/ha. **Lucrări de întreținere —** tăvălugit imediat după însămînțare, plivit și prășit de cîte ori este nevoie; rărit la 12—15 cm între plante cînd acestea au 5—8 cm înălțime. **Recoltare —** cînd florile sînt complet deschise, tăindu-se inflorescențele.

Recoltare din flora spontană. Cu secera sau cosorul.

Principii active. Ulei volatil cu azulene, substanțe amare, tanin, colină, vitamina C, ulei gras, rezine.

Acțiune farmacologică. Antiseptic similar mușetelului; tonic-aperitiv; coleretic-colagog și stimulent al funcției hepatice; antispastic; asringent, antiinflamator; cicatrizant.

Recomandări majore. Enterocolite, gastrite, colici gastrice.

Alte recomandări. INT. — Diskinezie biliară, insuficiență hepatică; colici hepatice; bronșite; cistite; anorexie, dispepsii. EXT. — Hemoroizi; ulcere varicoase; abcese dentare; arsuri, plăgi purulente; eczeme zemuinde.

COSM. — Calmarea tenurilor înroșite, iritate.

Mod de administrare. INT. — Infuzie (2 lingurițe la cană), 2—3 căni pe zi. EXT. — Băi sau comprese cu infuzie în concentrație dublă.



Intră în formula ceaiurilor gastric, hepatic, contra colicilor, anticolitic, diuretic 3, laxativ antihemoroidal, antiastmatic.

MUȘETELUL

MATRICARIA CHAMOMILLA L. — FAM. COMPOSITAE

Fr.: Camomille commune, Matricaire; G.: Echte Kamille;
M.: Orvosi székfű; R.: Romaška aptecinaia, Romaška
lekarstvennaia.

Specie ierboasă, înaltă de 5—60 cm (chiar mai înaltă în culturi), cu miros aromat. Plantele sînt mici și neramificate în sărături, locuri bătorite, dar înalte și bogat ramificate ca buruiană în lan sau ca plantă cultivată. Capitulele, caracteristice, au flori ligulate sterile pe margine și flori tubuloase fertile pe receptaculul bombat și gol la interior.

Partea utilizată. Florile — în fapt inflorescențe (Flores Chamomillae) — V—VI.

Ecologie, răspîndire, zonare. Plantă comună în zona de șes, mușetelul crește pe pajiști, în semănături (în special în grâu, în petece de sărăturare). Bazinele cele mai importante și totodată zone favorabile de cultură sînt în Cîmpia de Vest (jud. Timiș, Arad, Bihor, Satu-Mare), Oltenia (Mehedinți, Dolj, Olt), Muntenia (Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Buzău, Brăila), Dobrogea. Cerințe mai ridicate are pentru umiditate și lumină. Rezistă bine la temperaturi scăzute.

Tehnologia de cultură. Premergătoare — borceaguri pentru masă verde, leguminoase foarte timpurii, cereale de toamnă. Îngrășăminte — fosfor și potasiu cîte 40—50 kg/ha la înființarea culturii; azot 40—50 kg/ha iarna, pe zăpadă. Pregătirea terenului — arătură la adîncimea de 18—20 cm, discuit, tăvălugit, înainte și după semănat.

Insămînțare — cu semănătoarea SUP-21 cu distribuitoare pentru semințe mici și limitator de adîncime, la interval de 12,5 cm și 0,3—0,5 cm adîncime, cu 2—2,5 kg/ha.

Lucrări de întreținere — plivit de cîte ori este nevoie, erbicidare cu Afalon 5 kg/ha, cu MET-1200, diluat în 400—600 l apă, cînd plantele au 6—8 frunze. Recoltare — cînd florile ligulate albe sînt orizontale, manual cu piepteni speciali, mecanic cu Windroverul (se recoltează cu peduncul de 10—12 cm).

Principii active. Ulei volatil cu chamazulene, glicozid flavonic (apigenina), acizi organici, colină.

Acțiune farmacologică. Antiseptic; antispastic; carminativ; stomachic; sudorific; antidismenoreic;

FLORĂ SPONTANĂ CULTURI



antiinflamator (prin desensibilizarea organismului față de histamină).

Recomandări majore. Gastrite, enterite, colite însoțite de colici.

Alte recomandări. INT. — Diaree, dizenterie amoebiană; colici, balonări; tulburări dispeptice; afecțiuni hepatice; cataruri bronhice; astmul bronșic al copiilor; stări gripale, răceală; dismenoree. EXT. — Răni cu puroi, eczeme zemuinde, ulceratii; hemoroizi, fisuri anale; leucoree; conjunctivită; arsuri și reacții produse de iradiere; abcese dentare, stomatite, afte, laringite, amigdalite. COSM. — Tenuri înroșite, ridate; tonic capilar, dînd totodată părului reflexe blonde.

Mod de administrare. INT. — Infuzie (1—2 lingurițe la cană), 2—3 căni pe zi. EXT. — Cataplasme, spălături, gargară, băi de ochi cu infuzie concentrată (3 lingurițe la cană); ulei (pentru arsuri) din 10 g macerate 2—3 ore în 10—20 ml alcool, apoi fierte 2—3 ore în 100 ml alcool. Intră în formula ceaiului anticolitic, gastric, contra colicilor pentru copii și adulți, sudorific, pentru gargară. Confuzii. Față de alte specii de mușetel, se recunoaște prin capitulul gol la interior.

3. PLANTE
CU FLORI GALBENE

A. COROLA CU PETALE LIBERE



B. COROLA CU PETALE UNITE



CHELIDONIUM MAJUS L. — FAM. PAPAVERACEAE

Fr.: Chélidoine; G.: Schöllkraut; M.: Vérehulló fecskefű; R.: Cistatel balșoi.

Rostopasca sau Negelarița este o plantă ierbacee perenă bogat ramificată de la bază, cu tulpini cu peri lungi și rari și frunze verzi-albăstrui, mari, alterne, imparipenate, flori galbene pe tip 4, câte 3—8 în umbel, fructe capsule alungite. Planta lasă la locul de rupere un latex galben-portocaliu.

Partea utilizată. Partea aeriană (Herba Chelidonii) — V—VIII.

Ecologie, răspîndire. Evită lumina directă, are cerințe mai ridicate pentru umiditate; se dezvoltă bine pe soluri ușoare, chiar nisipuri, din zona de cîmpie pînă în cea montană (800—1000 m), în tufișuri, grădini, la marginea gardurilor, în păduri, îndeosebi de salcîm. În cantități mai mari crește în Oltenia (jud. Gorj, Dolj, dar mai ales în Mehedinți — la Devesel, Pădurea Chilia, Vinju Mare), Muntenia (jud. Giurgiu, împrejurimile Bucureștiului), Dobrogea (jud. Constanța), Moldova (jud. Galați — pădurea Hanu Conachi, Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava), Transilvania (Cluj, Alba, Harghita, Sălaj, Satu-Mare), Banat (Caraș-Severin).

Recoltare. Se recoltează numai ramurile nelignificate fie prin rupere, fie cu coasa sau secera cînd planta este în masă, de preferat înainte de fructificare, apoi din nou la otăvire.

Principii active. Alcaloizi (chelidonina, sanguinarina, protopina, sparteina), ulei volatil, flavonoide, saponozide.

Acțiune farmacologică. Stimulent al funcției hepatice; calmant al colicilor hepato-biliare; coleretic-colagog; sedativ și narcotic al centrilor nervoși superiori; antitumoral (prin acțiune mitoclastică); dezinfectant și cicatrizant.

Recomandări majore. Hepatite cronice, colici hepato-biliare, colecistite, diskinezie biliară.

Alte recomandări. INT. — Tuse spastică. EXT. — Negi; răni; tuberculoza pielii. În studiu utilizarea în unele forme de tumori.

Mod de administrare. INT. — Infuzie (1/2 linguriță la o cană) care se bea în cursul unei zile. EXT. — Aplicații de latex pe negi; cataplasme cu infuzie; unguent pentru



tuberculoza pielii (30 g pulbere de plantă, 15 g lanolină, 5 g vaselină, 10 picături acid fenic), pansamentul chimbindu-se la 2—3 zile.

ntre în formula ceaiului hepatic.

Contraindicații. Prin supradozare planta devine toxică.

SINAPIS ALBA L. — FAM. CRUCIFERAE

Fr.: Moutarde blanche; G.: Weisser Senf; M.: Fehér mustár; R.: Gorcița belaia.

Specie anuală de cultură, erectă, bogat ramificată, înaltă de 0,3—1 m, cu frunze penat sectate, cu 3—5 lobi neregulați, dintre care cel terminal mult mai mare, flori galbene, pe tipul 4, în raceme bogate, fructe silicve galbene, dispuse aproape perpendicular, cu rostru alungit. **Partea utilizată.** Semințele (Semen Sinapis albae) — VI—VII.

Ecologie, zonare. Plantă relativ puțin pretențioasă la temperatură (dacă se seamănă târziu, poate fi afectată de temperaturile ridicate), favorizată de lumina din zilele scurte. Față de umiditate are două perioade critice: imediat după semănat și la formarea semințelor. Are cerințe reduse față de sol (podzolurile vor trebui însă amendate). Sint contraindicate solurile prea grele sau cele nisipoase. Zone foarte favorabile pentru cultura acestei plante se găsesc în Cîmpia de vest; zone favorabile: Bărăgan, Cîmpia Burnazului, a Dobrogei și a Olteniei (jud. Dolj și Olt).

Tehnologia de cultură. Premergătoare — leguminoase, prășitoare îngrășate care lasă terenul bogat în substanțe nutritive și curat de buruieni (ex. cartofii). **Îngrășămintă** — fosfor 40—45 kg/ha la arătura de toamnă; azot 40—60 kg/ha dat primăvara, pe zăpadă; rezultate foarte bune se obțin dîndu-se 20 t/ha gunoi de grajd încorporat la arătura de bază. **Pregătirea terenului** — arătură cu plugul în agregat cu grapa stelată la adîncimea de 22—25 cm după planta premergătoare; întreținerea curată de buruieni a terenului pînă la însămînțare. **Însămînțare** — primăvara devreme, cu semănătoarea SUP-21 sau SUP-29, cu 12 kg/ha, la intervale de 12,5 cm și adîncimea de 2—3 cm. **Lucrări de întreținere** — grăpare ușoară pentru distrugerea scoarței și a buruienilor, 2—3 pliviri, tratamente cu Lindatox 3 PP, 20—25 kg/ha, Nagos 100 CE-0,1%, Diazion 60 CE-0,1% sau Ultracid 40 CE-0,1% (în caz de atac a viespei, gîndacului lucios, albastru sau roșu). **Recoltare** — cu combina C-12 cînd silicvele s-au îngălbenit 65%, iar boabele 70—75%.

Principii active. Mucilagii în tegument, glicozidul sinalbină, fermentul mirozină.



Acțiune farmacologică. Laxativ prin acțiune mecanică asupra tractului digestiv și iritarea locală produsă în stomac; creșterea secrețiilor gastrice; antiseptic.

Recomandări majore. Constipații cronice.

Alte recomandări. Anorexie; dispepsii; insuficiență pancreatică.

Mod de administrare. Semințe întregi (1 linguriță pînă la o lingură, cu puțină apă sau lapte), în cure de max. 7—8 zile, cu pauză de 7—10 zile.

MUȘTARUL NEGRU

BRASSICA NIGRA (L.) KOCH. (SINAPIS NIGRA L.) —
FAM. CRUCIFERAE

Fr.: Moutarde noir; G.: Schwarzer Senf; M.: Fekete
mustár; R.: Gorcița ciornaia.

Specie anuală de cultură, erectă, bogat ramificată, înaltă
de 1—1,50 m, cu tulpina cilindrică, abundent păroasă la
partea inferioară și glabră la cea superioară, frunze
inferioare penat-lobate, cu lobul terminal mare, flori
galbene, pe tip 4, în raceme bogate, fructe silicve alipite
de ax, îngustate la ambele capete, fără rostru.

Partea utilizată. Semințele — sub formă de făină (Farina
Sinapis nigrae) — VI—VII.

Ecologie, zonare. Planta are pretenții moderate față de
temperatură (este totuși mai sensibilă decât muștarul alb).
Față de umiditate are două perioade critice — imediat
după semănat și la formarea semințelor. Solicită soluri
mai ușoare și mai revene. La zi scurtă se dezvoltă mai
greu, dar crește viguroasă. Zonele cele mai favorabile:
Cîmpia de Vest; zone favorabile: Bărăgan, Cîmpia
Dobrogei, Cîmpia Burnazului, Cîmpia Olteniei (jud.
Dolj și Olt).

Tehnologia de cultură. Premergătoare — toate, exceptînd
cruciferele. **Îngrășăminte** — fosfor 40—50 kg/ha
încorporat la arătura de bază; azot 40—60 kg/ha
primăvara, înainte de semănat. **Pregătirea terenului** —
arătură adîncă de toamnă la 22—25 cm; primăvara,
nivelat și lucrare cu combinatorul. **Însămînțare** —
primăvara cu semănătoarea SUP-21 sau SUP-29 la 12,5
cm între rînduri și 2—3 cm adîncime, cu 10—12 kg/ha.

Lucrări de întreținere — 1—2 pliviri, prăfuiri cu
Lindatox 3 PP sau Melipax 10 PP în doze de 20—25
kg/ha (în cazul atacului de purici, viespei rapiței,
gîndacului albastru sau roșu). **Recoltare** — cu combina
C 12 special pregătită cînd plantele au cca 1/3 din silicve
de culoare galbenă-brună, iar 75—80% din semințe sînt
cafenii.

Principii active. Mucilagii în tegument, ulei gras,
sîngrozid, mirozinază.

Acțiune farmacologică. Revulsiv (cu folosire strictă în uz
extern) activînd circulația sîngelui în zonă și
decongestionînd organele interne subiacente.

CULTURI



Recomandări majore. EXT. — Inflamații articulare, algii
reumatice.

Alte recomandări. EXT. — Răceală, gripă; bronșită,
pneumonie; angină pectorală.

Mod de administrare. EXT. — Băi generale (250 g în
săculeț de tifon, agitat în apa de baie) cu o durată de
20—30 minute; băi locale cu 25—30 g produs peste care
se toarnă 2—3 l apă caldă; cataplasme (cu o pastă din
100 g produs cu puțină apă caldă) aplicate pe locul
dureros, cca 15 minute (în cazul persoanelor sensibile și
al copiilor, făina de muștar se amestecă cu făină de în în
proporție de 1 : 2).

Contraindicații. Persoane cu sensibilitate deosebită,
bolnavi de varice, diferite afecțiuni cutanate.

VIOLA TRICOLOR L.* — FAM. VIOLACEAE

Fr.: Pensée sauvage; G.: Stiefmütterchen;
M.: Vadárvácska; R.: Fialka trehřvetnaia.

Specie anuală sau hibernantă, înaltă de 10—14 cm, cu frunze ovate cu stipele penate la bază, flori cu 5 petale inegale și diferit colorate — 2 superioare violacee, 2 laterale galben-deschis, cea inferioară mai mare, galbenă. **Partea utilizată.** Partea aeriană (*Herba Violae tricoloris*) — VI—VIII.

Ecologie, răspîndire. Plantă de lumină directă sau cel mult semiumbră, cu cerințe destul de ridicate față de umiditate. Se dezvoltă pe soluri bogate, iar altitudinal din zona de deal pînă în etajul subalpin. Crește în lunci, la marginea pădurilor, în culturi ca buruiiană, prin finețe montane, pe coaste și stîncării. Bazine mai mari se întîlnesc în Transilvania (îndeosebi în jud. Cluj, Sălaj, Bihor, Arad), Banat (Caraș-Severin), Moldova (jud. Suceava, Bacău, Iași), Muntenia (Prahova).

Recoltare. În perioada de înflorire, cu secera sau cu coasa.

Principii active. Saponozide, flavonoide (rutozid), compuși salicilici, alcaloizi (violina), carotenoide, antociani, tanin, ulei volatil, vitamine (C, A).

Acțiune farmacologică. Depurativ de bază, curățînd sîngele de toxine; diuretic; fluidifică și elimină secrețiile bronhice; ușor laxativ.

Recomandări majore. Afecțiuni dermatologice (eczeme, urticarie, acnee, furunculoză, psoriazis, herpes).

Alte recomandări. Afecțiuni renale; reumatism; tuse și bronșită; constipații ușoare.

Mod de administrare. Infuzie (1 linguriță la cană), 2—3 căni pe zi, din care una dimineața pe stomacul gol. Intră în formula ceaiurilor depurativ și pectoral.



* Se mai recoltează și *Viola arvensis* L.-cu flori galbene, adesea buruiiană de cultură, *Viola declinata* L. (Unghia găii), cu flori violacee, din zone montană și alpină.



HYPERICUM PERFORATUM L. — FAM. HYPERICACEAE

Fr.: Millepertuis; **G.:** Johanneskraut; **M.:** Orbáncfű; **R.:** Zverboi abíknavennii.

Plantă ierboasă perenă, înaltă pînă la 1 m, avînd tulpină cilindrică, ramuri sterile la baza frunzelor, frunze opuse, sesile, ovale, cu punctuațiuni negre și altele transparente, flori numeroase, dispuse terminal, pe tip 5. **Partea utilizată.** Părțile aeriene terminale înflorite (Herba Hyperici) — VI—VIII.

Ecologie, răspîndire. Plantă cu o mare răspîndire, sunătoarea este adaptată atît la ariditate, cît și la umiditate excesivă; vegetează la lumină, cel mult la semiumbră. Suportă temperaturile joase și este puțin pretențioasă față de sol (reacționînd însă pozitiv la un conținut mai mare în azot). Altitudinal vegetează de la cîmpie pînă în zona montană (mai abundentă în zona deluroasă), în tăieturi de păduri, fînețe, la marginea drumurilor și a pădurilor, în locuri necultivate. Se poate recolta în toată țara, îndeosebi în Transilvania, Muntenia (jud. Argeș, Buzău, Dîmbovița, Giurgiu, Prahova), Oltenia (jud. Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea), Moldova (jud. Bacău, Botoșani, Neamț, Suceava, Vrancea), Dobrogea (jud. Tulcea).

Recoltare. Întreaga parte nelignificată, în plină înflorire, prin tăiere cu foarfecele sau cuțitul.

Principii active. Ulei volatil, flavonozidul hiperozid, substanță colorantă-hipericina, colină, rezine, fitoncide, beta caroten.

Acțiune farmacologică. Cicatrizant; antiseptic; coleretic-cologog; antidiareic.

Recomandări majore. Diskinezii biliare, colecistite, alte afecțiuni hepatice.

Alte recomandări. INT. — Gastrite hiperacide, ulcer gastric; colită; diaree, enterite. EXT. — Arsuri; răni deschise, purulente, ulceratii învechite.

Mod de administrare. INT. — Infuzie (1 linguriță la cană), 2—3 căni pe zi; ulei medicinal (20 g plantă macerată 12 ore în 20 ml alcool într-un vas închis, se adaugă 200 g ulei comestibil și se fierbe 3 ore, agitîndu-se din timp în timp), se iau 2 lingurițe pe zi între



mese. EXT. — Cataplasme sau băi locale cu infuzie concentrată (1 lingură la 100 ml apă); aplicații cu ulei. Intră în formula ceaiurilor gastrice, hepatic, anticolitic. **Confuzii.** La noi în țară se mai întîlnesc și alte specii de Hypericum, dar fără proprietăți medicinale: *H. elegans* (floare de friguri) cu frunze lanceolate, tulpina în 4 muchii (la *H. perforatum* numai 2); *H. maculatum* cu frunze fără puncte transparente; *H. hirsutum* cu frunze păroase.

HIPPOPHAË RHAMNOIDES L. — FAM.
ELAEAGNACEAE.

Fr.: Argousier; G.: Sanddorn; M.: Homoktövis;
R.: Ablepiha krušinovidnaia.

Arbust spinos, cu peri stelați pe tulpini și pe frunzele îngust-lanceolate, flori unisexuate dioice (apar înaintea frunzelor), mici, gălbui, în inflorescențe globuloase (cele bărbătești) și mai alungite (cele femeiești), fructe drupe false, portocalii, în ciorchini.

Partea utilizată. Fructele (Fructus Hippophaë) — VIII—IX.

Ecologie, răspindire. Specie cu mare rezistență la secetă și ger, nepretențioasă față de sol, dezvoltându-se bine pe prundișuri, nisipuri, soluri crude, pe coaste ripoase pe care le fixează datorită lăstărilor și drajonării; solicită lumină directă. Vegetează din zona de munte și pină în Deltă, îndeosebi în jud. Bacău, Vrancea, Buzău, Prahova, Dimbovița, Tulcea.

Recoltare. Fructele se desprind de pe ramuri cu foarfecele.

Principii active. Vitaminele C, B₁, B₂, carotenoide dizolvate într-un ulei gras, acid folic, acizi grași nesaturați, fitosteroli, inozitoli, acid nicotinic.

Acțiune farmacologică. Vitaminizant de excepție; depurativ; antidiareic.

Recomandări majore. Avitaminoză.

Alte recomandări. Urticarie, diverse dermatoze; diaree benignă.

Mod de administrare. Infuzie (1—2 lingurițe la cană), 2 cani pe zi.

Intră în formula ceaiului gastric stimulent. Fructele (singure sau împreună cu măceșele) pot constitui un ceai alimentar de fiecare zi, cu mare valoare vitaminizantă.



POTENTILLA ANSERINA L. — FAM. ROSACEAE

Fr.: Anserine, Argentine; G.: Gänsefingerkraut;
M.: Libapimpó; R.: Lapciatka gušinaia.

Plantă erbacee cu tulpină orizontală și ramuri ascendente, frunze penat compuse, argintii pe spate, flori galbene pe tip 5.

Partea utilizată. Partea aeriană (Herba Anserinae) — VII—IX.

Ecologie, răspindire. Planta formează covoare compacte în sate de deal, pe marginea ulițelor, șanțurilor și a râurilor, îndeosebi în Transilvania (jud. Alba, Arad, Bihor, Brașov, Covasna, Harghita, Maramureș), Muntenia (jud. Argeș, Prahova), Moldova (jud. Neamț, Suceava).

Recoltare. Prin rupere cu mâna, sau prin tăiere fie cu secera, fie cu coasa când planta crește în masă. Se îndepărtează plantele străine, precum și tulpinile tiritoare.

Principii active. Taninuri, substanțe amare, flavone.

Acțiune farmacologică. Astringent (antidiareic și antihemoragic); antilitiazic; ușor spasmolitic al musculaturii netede intestinale; cicatrizant.

Recomandări majore. Diaree (inclusiv forme rebele), colici gastrointestinale.

Alte recomandări. INT. — Hemoragii (inclusiv în metroragii cu menstrre abundente, neregulate, prelungite); litiază urică, artrite. EXT. — Ulcerații ale pielii; gingivită; leucoree. COSM. — Tenuri grase, seboreice, cu pori dilatați.

Mod de administrare. INT. — Infuzie sau decoct (1 lingură la cană), 2 cani pe zi. EXT. — Spălături sau comprese cu decoct în concentrație dublă.

Intră în formula ceaiului antidiareic.



GEUM URBANUM L. — FAM. ROSACEAE.

Fr.: Benoît; **G.:** Benediktenkraut; **M.:** Gyömbérgyökér;
R.: Graviolat tarodscoi.

Plantă ierboasă perenă, erectă, cu peri aspri pe tulpină, frunze bazale în rozetă, cele tulpinale scurt pețiolate cu 3—5 lobi, flori pe tipul 5, fructe multiple cu aspect de buzduhan.

Partea utilizată. Rizomii (Rhizoma Gei) — III—V și IX—XI.

Ecologie, răspândire. Plantă de umbră și umiditate, crește pe soluri ușoare și afinate, uneori abundant în păduri umede din cîmpie și deal, la marginea apelor și a drumurilor, în tufișuri, mai ales în Transilvania (Caraș-Severin, Covasna), Muntenia (Argeș, Dîmbovița, Giurgiu, Prahova), Oltenia (Olt, Vîlcea), Dobrogea (Tulcea), Moldova (Bacău, Neamț, Suceava, Vrancea).

Recoltare. Pe soluri afinate și umede prin smulgere, iar pe cele grele cu cuțitul sau cazmaua, după care se retează la nivelul coletului. Se spală înainte de uscare.

Principii active. Tanin (10—18%), glicozida geină, ulei volatil, eugenol, substanțe amare.

Acțiune farmacologică. Puternic astringent (antidiareic și hemostatic), calmant; antiseptic.

Recomandări majore. Dispepsii gastrice, enterite de natură infecțioasă.

Alte recomandări. INT. — Hemoragii de natură diferită dureri hemoroidale și menstruale. EXT. — Plăgi infectate; stomatite, gingivite.

Mod de întrebuințare. INT. — Decoct (1 linguriță la cană), 2—3 căni pe zi. EXT. — Gargară sau spălături cu decoct de 2—3 ori mai concentrat.

Intră în formula ceaiurilor antidiareic și pentru gargară.



AGRIMONIA EUPATORIA L. — FAM. ROSACEAE.

Fr.: Aigremoine; **G.:** Odermennig; **M.:** Patika parlófü;
R.: Repeinicek aptecinii.

Plantă ierboasă perenă, neramificată, abundant păroasă, cu frunze penat compuse avînd foliole inegale, dințate, flori gălbui pe tipul 5, în inflorescențe alungite.

Partea utilizată. Partea aeriană (Herba Agrimoniae) — VI—VIII.

Ecologie, răspîndire. Crește îndeosebi în locuri semiumbrite cu umiditate mare, în zona de cîmpie pînă în cea montană (la oca 1000 m), în luminișuri și la margini de păduri, în tufărișuri, la margini de drumuri, în livezi, pajiști. Mai răspîndită în Transilvania (jud. Brașov, Cluj, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Sălaj, Sibiu), Banat (jud. Caraș-Severin), Muntenia (jud. Argeș, Prahova, dar îndeosebi Buzău), Oltenia (jud. Mehedinți, Vâlcea), Moldova (jud. Bacău, Neamț, Suceava).

Recoltare. La începutul înfloririi, cu secera sau cuțitul, toată partea foliată și nelignificată.

Principii active. Tanin, flavone, principii amare, ulei volatil, săruri de siliciu, vitamine (C, K).

Acțiune farmacologică. Coleretic-colagog și decongestiv hepatic; astringent (antidiareic, antihemoragic); tonic-amar; hipoglicemiant (cu scăderea setei specifice diabeticilor); diuretic-depurativ cu eliminare masivă de urați; ușor antiseptic.

Recomandări majore. Diskinezie biliară, colecistită și alte afecțiuni hepatice cronice.

Alte recomandări. INT. — Stări diareice; hemoragii (îndeosebi ale nasului); diabet; diateze urice; reumatism cronic; alergii cu mâncărimi; stări dispeptice, atonie gastrică, anorexie. EXT. — Stomatite, gingivite, faringite; laringite; boli de ochi.

Mod de administrare. INT. — Infuzie (1—2 lingurițe la cană), 2—3 cani pe zi, de preferință prima dimineață pe nemîncate. EXT. — Gargară și băi de ochi cu decoct (3 linguri la cană).

Intră în formula ceaiurilor antidiareic și hepatic.



MELILOTUS OFFICINALIS (L.) MEDIK. — FAM. LEGUMINOSAE

Fr.: Mélilot; G.: Gelber Steinklee; M.: Orvosi somkóró; R.: Donnik lekarstvenni.

Plantă erbacee anuală, înaltă pînă la 1—1,5 m, foarte ramificată, cu frunze trifoliolate, flori papilionate galbene, în raceme alungite.

Partea utilizată. Partea aeriană (Herba Meliloti) — VI—VIII.

Ecologie, răspindire. Plantă de locuri însorite, puțin pretențioasă față de sol, vegetînd chiar și pe cele mai aride, pietroase, fiind calcifilă. Crește de la cîmpie pînă la 1200—1400 m, prin finețe, semănături, pe coaste pietroase, în mod deosebit la margine de drumuri și căi ferate.

Recoltare. Se taie vîrfurile înflorite de cca 30 cm, precum și ramificațiile.

Principii active. Cumarină, ulei volatil, substanțe amare, tanin, derivați flavonici.

A acțiune farmacologică. Sedativ lejer și soporific; antispasmodic; emolient și expectorant; carminativ; stimulent al regenerării celulei hepatice; ameliorarea circulației (îndeosebi cea venoasă); diuretic și antiseptic renal; antihipertensiv (prin dilatarea vaselor periferice); antiseptic general.

Recomandări majore. Tulburări de circulație arterială, limfatică, dar în special venoasă (pentru membrele inferioare).

Alte recomandări. INT. — Hiperexcitabilitate, insomnii; bronșite, tuse (inclusiv în accese prelungite); catar gastric și intestinal; colite cu balonări, aerofagie; sechele de hepatită; stări de oboseală a ficatului; afecțiuni urinare (inclusiv în stări infecțioase); reumatism, gută; hipertensiune. EXT. — Conjunctivite, ulcioare; plăgi purulente; abcese dentare, gingivite, afte; laringite.

Mod de administrare. INT. — Infuzie (1 linguriță la cană), cîte o cană după fiecare masă, iar pentru efectul sedativ, una înainte de culcare. EXT. — Comprese calde pe locul dureros sau băi locale cu infuzie (2 linguri la cană); cataplasme; gargară; spălături bucale.



Întră în formula aromatizantului pentru băi și a țigărilor antiastmatice.

Confuzii. În aceleași condiții ecologice cu specia medicinală vegetează specia *Melilotus albus* Medik. (Sulfina albă), la care florile sînt însă albe.

TILIA TOMENTOSA MNCH. — TEI ARGINTIU; *TILIA CORDATA* MILL. — TEI PUCIOS; *TILIA PLATYPHYLLOS* SCOP. — TEI CU FRUNZA MARE

Fr.: Tilleul; G. Linde; M.: Hársfa; R.: Lipa.

Arbore cu frunze întregi, cordiforme, flori grupate în cime, al căror peduncul pornește din mijlocul unei bractee alungite.

Partea utilizată. Florile (Flores *Tiliae* argenteae provenite de la specia *Tilia tomentosa*, Flores *Tiliae officinalis* de la celelalte două specii) — VI—VII.

Ecologie, răspîndire. Specia *T. cordata* este mai rezistentă la geruri, celelalte specii au pretenții mai ridicate față de temperatură. Se dezvoltă bine pe soluri revene, mai fertile. Vegetează în păduri de cîmpie și deal, în toată țara, dar în mod deosebit în Moldova (jud. Botoșani, Iași, Vaslui), Dobrogea (jud. Tulcea — la poalele Munților Măcinului), Muntenia (jud. Giurgiu), Transilvania (jud. Arad, Satu-Mare), Banat (jud. Caraș-Severin), Oltenia (jud. Mehedinți). Foarte mult cultivat în scop ornamental.

Recoltare. La începutul înfloririi, pe timp frumos, la 1—2 zile după ultima ploaie, cu ajutorul scăriilor duble, pentru a se evita urcarea în arbori, care duce la ruperea ramurilor. Se poate utiliza foarfecele de omizi cu coada lungă.

Principii active. Ulei volatil, alcool'sescviterpenic (farnesol) — în flori, mucilagii în bractee; flavonozide, tanin, colină, saponine.

Acțiune farmacologică. Neurosedativ, antispastic și hipnotic; fluidificarea secrețiilor bronhice și calmarea tusei; fluidificarea sîngelui; sudorific-febrifug.

Recomandări majore. Stări de nervozitate, de agitație provocate de surmenaj intelectual, insomnii; bronșite, stări gripale, răceli.

Alte recomandări. INT. — Dispepsii cu origine nervoasă; migrene; febră musculară; dureri renale; ateroscleroză.

EXT. — Amigdalită, afecțiuni bucale; băi sedative pentru copii cu nervozitate excesivă. COSM. — Cearcăne.

Mod de administrare. INT. — Infuzie (1—2 lingurițe la cană), 2—3 căni pe zi, dintre care o cană cu 30 minute înainte de culcare. EXT. — Gargară cu infuzie



concentrată (4 linguri la cană, la care se adaugă 1/2 linguriță de bicarbonat de sodiu); pentru copii, băi cu infuzie concentrată (30—40 g la litru). COSM. — Comprese calde cu infuzie, ținute 10—15 minute pe ochi.

Întră în formula ceaiurilor calmant, sedativ, contra tulburărilor cardiace, pectoral, sudorific.

FOENICULUM VULGARE MILL. — FAM.
UMBELLIFERAE

Fr.: Fenouil; G.: Fenchel; M.: Edes kömény; R.: Fenheli
abiknavennii.

Specie erbacee bienală sau perenă, exclusiv de cultură, înaltă până la 1—2 m, foarte ramificată încă de la bază, cu frunze fin divizate (asemănătoare cu cele de mărar), flori galbene în umbel mari care înfloresc și fructifică încă din primul an.

Partea utilizată. Fructele (Fructus Foeniculi) — VIII—IX.

Ecologie, zonare. Ca specie mediteraneeană se cultivă în regiuni cu veri lungi și calde, ierni ușoare, precipitații suficiente și soluri fertile (nisipo-argiloase, bogate în humus și calciu, de preferință cernoziomuri sau soluri de luncă). Găsește condiții favorabile în toată zona de cîmpie din estul și vestul țării.

Tehnologia de cultură. Premergătoare — prășitoare îngrășate, griu de toamnă după ogor îngrășat.

Îngrășăminte — fosfor — 40—50 kg/ha încorporat la arătura de toamnă; azot 60—70 kg/ha primăvara, înainte de semănat. **Pregătirea terenului** — arătura la adîncimea de 22—25 cm după planta premergătoare; terenul se întreține fără buruieni până la însămînțare.

Însămînțare — primăvara timpuriu cu semănătoarea SUP—21 sau SUP—29 cu distribuitorul cu pîteni, cu fețe laterale plane, reglat la C—12, cu 8 kg/ha, la adîncime de 2—3 cm și interval de 62,5 cm. **Lucrări de întreținere** — grăpat după însămînțare, 1—2 pliviri, 2—3 prașile; **erbicidare** primăvara după însămînțare cu Igran 5—7 kg/ha diluat în 400—600 l apă.

Recoltare — cu combina C 12 la maturarea a 75% din fructe.

Principii active. Ulei volatil (cu 50—60% anetol, limonen, pinen, fenconă, camfen), flavonoide.

Acțiune farmacologică. Carminativ și antispastic gastrointestinal; stomachic și tonic aperitiv; sedativ al tusei și expectorant; galactogog; tonic nervin; diuretic; dezinfectant.

Recomandări majore. Balonări, aerofagie, calmant al colicilor (indeosebi la copii).



Alte recomandări. INT. — Dispepsii și inapetență; bronșită; astm; tuse de diverse etiologii (inclusiv cea convulsivă); stimularea lactației la femeile care alăptează. afecțiuni renale; astenii. EXT. — Inflamații ale gîtului; iritații oculare.

Mod de administrare. INT. — Infuzie (5—6 fructe la 100 ml — sugari și 1/2 linguriță la cană — adulți), 2—3 ceaiuri pe zi. EXT. — Gargară cu infuzie în concentrație dublă; băi de ochi cu infuzie.

Intră în formula ceaiurilor pectoral, contra colicilor (adulți și copii), anticolitic, gastric 2, pulberii laxativ-purgative.

PRIMULA OFFICINALIS (L.) HILL., *P. ELATIOR* (L.) GRUFB. — FAM. PRIMULACEAE

Fr.: Primevère; G.: Schlüsselblume; M.: Orvosi kankalin; R.: Pervojet vesenii.

Plantă ierboasă, înaltă de 15—30 cm, cu frunze în rozetă bazală, flori galbene pe tip 5 într-o umbelă multiformă la capătul unei tulpini cilindrice nefoliată.

Partea utilizată. Florile (Flores Primulae) — IV—V; rădăcinile (Radix Primulae) — IV—V.

Ecologie, răspândire. Crește în zonele de deal și de munte, are cerințe ridicate față de umiditatea din atmosferă și din sol. Specie de lumină, din poieni și pășuni, cel mult de semiumbră la margini de păduri. Puțin pretențioasă față de sol, se dezvoltă și pe terenurile pietroase. Este răspândită în întreaga Transilvanie, Muntenia (jud. Argeș, Buzău, Dîmbovița, Prahova), Oltenia (Gorj, Mehedinți, Vâlcea), Moldova (jud. Bacău, Iași, Suceava, Vrancea, dar mai ales Neamț).

Recoltare. Florile manual sau cu recoltatorii de mușetel; rădăcinile cu sapa sau cazmaua, după care se spală imediat.

Principii active. Saponozide triterpenice (primulozida), flavonozide, tanoizi, vitamina C, enzima primveraza.

Acțiune farmacologică. Expectorant și antitusiv; calmant și antispasmodic; sudorific; diuretic; ușor laxativ; cicatrizant; hemostatic.

Recomandări majore. Bronșite, laringite, pneumonie (în faza de coacțiune).

Alte recomandări. INT. — Tuse seacă (inclusiv tuse convulsivă); migrene, insomnii; contracții de natură nervoasă ale stomacului; afecțiuni renale și vezicale. EXT. — Contuzii, echimoze.

Mod de administrare. INT. — Infuzie din flori (1 linguriță la cană); decoct din rădăcini (1 linguriță la cană), din ambele 2—3 cani pe zi. EXT. — Comprese cu decoct concentrat de rădăcină (2 linguri la cană).

Florile intră în compoziția ceaiului pectoral, rădăcina în ceaiul anti-bronșitic.



VERBASCUM PHLOMOIDES L.: V. THAPSUS L.; V. THAPSIFORME SCHRAD; V. SPECIOSUM SCHRAD — FAM. SCROPHULARIACEAE

Fr.: Bouillon blanc; G.: Königskerze; M.: Ökörfarkkóró; R.: Koroviac.

Plantă erbacee, înaltă pînă la 2 m, cu frunze eliptice mari și păroase, flori galbene puțin asimetrice în inflorescențe terminale lungi.

Partea utilizată. Florile — fără caliciu (Flores Verbasci) — VII—IX.

Ecologie, răspîndire. Specie care vegetează în locuri necultivate, la margini de drumuri, solicită multă lumină și uscăciune excesivă. Vegetează pe soluri ușoare, aluvionare, nisipoase sau chiar pietroase, în special în zona de șes și de deal din întreaga țară.

Recoltare. Prin ciupirea corolei cu stamine, fără caliciu, pe măsura deschiderii florilor, dimineata, după ce se ridică roua. Deoarece perii plantei provoacă inflamații ale pielii, mucoaselor, ochilor, se vor lua măsuri de protecție. După uscare, florile se pun în cutii de tablă sau borcane acoperite, cu substanțe care să absoarbă vaporii de apă, produsul fiind foarte higroscopic.

Principii active. Mucilagii, saponozide.

Acțiune farmacologică. Emolient și expectorant; sudorific; maturativ.

Recomandări majore. Tuse de diferite etiologii, inclusiv tuse astmatică, în laringite, traheite, bronșite.

Alte recomandări. INT. — Cataruri intestinale; cataruri urinare; hemoroizi. EXT. — Hemoroizi; arsuri; înțepături; degerături; furuncule și abcese.

Mod de administrare. INT. — Infuzie (1 linguriță la cană, bine strecurată), 2 cani pe zi, prima între mese, a doua seara la culcare. EXT. — Spălături locale și cataplasme cu infuzie.

Confuzii. Se evită recoltarea florilor de la speciile care au antere violet.



PLANTAGO LANCEOLATA L., P. MEDIA L., P. MAJOR L. — FAM. PLANTAGINACEAE.

Fr.: Plantain; G.: Wegerich; M.: Utifü; R.: Podarojnik.

Specie erbacee perenă, înaltă de 10—40 cm, cu frunze ovate (P. major, P. media) sau lanceolate (P. lanceolata), tulpini florifere drepte, cu inflorescențe terminale de tip spic cu floricele mici, gălbui, pe tipul 4.

Partea utilizată. Frunzele (Folium Plantaginis) — V—IX.

Ecologie, răspindire, zonare. P. major, foarte mult răspândită, vegetează chiar și pe locuri bătătorite unde nu rezistă alte specii. Este adaptată la cele mai variate condiții, crește la margini de drumuri, în pășuni, buruienșuri, în culturi, din cîmpie și pînă în zona alpină. Se cultivă numai P. lanceolata (pătlagina îngustă), care are condiții în întreaga țară.

Tehnologia de cultură. Premergătoare — leguminoase, legume, cîneșă, cereale gunoite, ierburi perene.

Îngrășăminte — fosfor 50—60 kg/ha și potasiu 30—40 kg/ha încorporate la arătura de bază; azot 60—80 kg/ha primăvara, pe zăpadă. **Pregătirea terenului** — arătură la adîncimea de 22—25 cm, menținerea terenului curat de buruieni pînă la însămînțare. **Însămînțare** — în pragul iernii cu semănătoarea SUP—21 sau SUP—29 cu distribuitoare pentru semințe mici și limitatoare de adîncime, cîte 5 kg/ha, la intervale de 50 cm și adîncimea de 0,5—1 cm.

Lucrări de întreținere — plivit după răsărire, prășit ori de cîte ori este nevoie. **Recoltare** — de 2—4 ori pe an, cînd frunzele au 12—14 cm lungime, cu seceră.

Principii active. Mucilagii, glicozidul aucubina, vitamina K, tanin, polifenoli, alantoină.

Acțiune farmacologică. Emolient și expectorant; cicatrizant; antihemoragic; hipocolesterolemiant; ușor hipotensor; antiseptic.

Recomandări majore. Bronșite cronice, tuse de diverse etiologii, astm.

Alte recomandări. INT. — Ulcer gastric; catar digestiv și urinar; hemoragii; hipercolesterolemie și ateroscleroză; hipertensiune. EXT. — Răni (inclusiv plăgi deschise); ulcere varicoase; hemoroizi sîngerinzi; conjunctivite și blefarite; stomatite; laringite și traheite.



Mod de administrare. INT. — Infuzie (1 linguriță la cană), 2 căni pe zi; plantă mărunțită (2—3 vîrfuri de cuțit pe zi) în ulcer; suc de plantă proaspătă. EXT. — Cataplasme; spălături; băi locale; aplicații pe răni cu frunze proaspete zdrobite.

Intră în formula ceaiului antibronșitic.

Confuzii. Foarte periculoasă confuzia dintre frunzele de pătlagină cu frunzele toxice de Degețel lînos (Digitalis lanata). Caractere de deosebire:

— nervațiune paralel-arcuată (la Digitalis este penată);
— peri rari pe ambele fețe ale frunzei (la Digitalis numai pe marginea frunzei).

GHINȚURA GALBENĂ

CULTURI

GENTIANA LUTEA L. — FAM. GENTIANACEAE

Fr.: Gentiane; G.: Enzian; M.: Tárnic; R.: Goreciavka
gioltaia.

Plantă ierboasă perenă, robustă (40—100 cm), cu frunze opuse, cu nervuri arcuate, proeminente, ovat-eliptice, flori mari (2—3 cm) dispuse în cime la subsuoara frunzelor, corola galbenă divizată pînă aproape de bază.

Partea utilizată. Rădăcinile și rizomii (*Radix Gentianae*) — VIII—X.

Ecologie, zonare. În flora spontană, fiind declarată monument al naturii, ghințura galbenă a fost trecută în cultură. Plantă de lumină directă, s-a cantonat în zona montană pe pante însoțite. Are rezistență mare la ger; cerințe ridicate față de umiditate, vegetează bine pe sol calcaros, bine îngrășat. Găsește condiții optime de cultivare la altitudini de 400—800 m în județele Brașov, Prahova, Neamț, dar poate fi cultivată și în alte zone subcarpatice.

Tehnologia de cultură. Premergătoare — prășitoare, leguminoase. **Îngrășăminte** — organice, bine fermentate, 30—40 t/ha; chimice — fosfor și potasiu cîte 40—45 kg/ha la arătura de toamnă; în lipsa calciului, amendare cu 3—4 t calcar la ha, tot la arătura de bază. **Pregătirea terenului** — a) pentru plantat — arătură de toamnă la adîncimea de 25—28 cm, lăsată în brazdă crudă; primăvara timpuriu — lucrare cu grapa cu discuri și cu cultivatorul; b) pentru însămînțări direct în cîmp — după arătura de toamnă, terenul se menține curat de buruieni, iar în pragul iernii, ultima lucrare se execută cu cultivatorul și nivelatorul. **Însămînțare** — în pragul iernii cu semănătoarea SUP—21 cu distribuitor pentru semințe mici și limitatoare de adîncime, cu 4—6 kg/ha, la 50 cm între rînduri. **Înmulțirea prin răsad** — necesar 200 mp straturi reci la ha, în luna august, cu 0,5 kg semințe însămînțate în rînduri la 5 cm interval; plantarea în aprilie, la 50 cm interval și 15—20 cm distanță.

Lucrări de întreținere — prașile mecanice și manuale de cîte ori este nevoie. **Recoltare** — cu plugul fără cormană, în toamna anului III. Rădăcinile se decoletează cu secera.



Principii active. Principii amare (gentiopicrină, gentioamarină, amarogentină), ulei volatil, alcaloidul gentianina, tanin.

Acțiune farmacologică. Stimulează intens secrețiile salivare și gastrice; antihelmintic; coleretic-colagog; antipiretic și antimalaric.

Recomandări majore. Gastrită hipoacidă, tulburări dispeptice.

Alte recomandări. Anorexie; stări de debilitate la copii; diskinezie biliară, colecistite; helmintiaze; maladii febrile (inclusiv malarie).

Mod de administrare. Infuzie sau decoct (1/2 linguriță la cană), cîte 1/4 cană înainte de mese; tinctură (20 g macerate 7—8 zile în 100 ml alcool), 5—10 picături înainte de mese pentru copii, 15—20 picături pentru adulți; pulbere (0,2—2 g/zi); sirop tonic pentru copii (macerat la cald din 1 lingură de plantă cu 150 ml apă în clocot timp de 6 ore, se strecoară, se adaugă 250 g zahăr și se fierbe pînă capătă consistență siropoasă); se iau 3—4 lingurițe pe zi, înainte de mese.

INULA HELENIUM L. — FAM. COMPOSITAE

Fr.: Aunée officinale; G.: Alant; M.: Örvénygyökér;
R.: Deviasil visokii.

Plantă ierboasă, viguroasă, înaltă pînă la 2 m, cu frunze mari, eliptice, inflorescențe — antodii mari, galbene, ca o floare a soarelui în miniatură.

Partea utilizată. Rădăcinile (Radix Inulae) — IX—XI.

Ecologie, răspindire. Specie de lumină și semiumbră, cu cerințe ridicate față de umiditate. Altitudinal se cantonează în zona de deal și cea montană inferioară, la margini de păduri, prin finețe umede, de-a lungul piraielelor. Bazine mai importante se întîlnesc în toată Transilvania, în județele de deal ale Moldovei, Munteniei și Olteniei.

Recoltare. Rădăcinile se scot cu cazmaua, se spală imediat într-un curent de apă, se îndepărtează cele care sînt seci și părțile aeriene se fasonază în fragmente de 10—15 cm, iar cele groase se despică în lung.

Principii active. Inulină, ulei volatil, alantolactone (helenină), fitoncide, substanțe amare.

Acțiune farmacologică. Expectorant, antitusiv și antiseptic general al căilor respiratorii, inhibînd dezvoltarea bacilului Koch; diuretic și dezinfectant urinar; depurativ; stomachic; coleretic-colagog; antihelmintic (îndeosebi ascaricid); sedativ nervos, hipnotic; cicatrizant; tonic-capilar.

Recomandări majore. Bronșite cronice, tuse de diferite etiologii, adjuvant în tratamentul TBC; helmintiază (îndeosebi limbrici).

Alte recomandări. INT. — Afecțiuni renale (inclusiv de natură infecțioasă); reumatism și gută; tulburări dispeptice, hipoaciditate; diskinezie; boli de piele (eczeme); hiperexcitabilitate, insomnii. EXT. — Igienă capilară (întărirea părului); răni cu ulceratii.

Mod de administrare. INT. — Decoct (1 lingură la cană) care se bea în cursul unei zile; pulbere (2—10 g în 24 de ore). EXT. — Comprese pe răni și spălături capilare cu decoct concentrat (2 linguri la cană).

Observații. Intră în formula ceaiului antibronșitic.

Confuzii. Față de *Telekia speciosa* (Schreb.) Baumg. (Lăptucul oii), cu port asemănător și din aceleași zone ecologice, prezintă următoarele caractere de deosebire:



— baza frunzelor inferioare este atenuată în pețiol (la *Telekia* — cordată);

— flori și fructe cu papus de două ori mai lung decît achena (la *Telekia* fără papus, fructele avînd la bază doar o coronulă).

PELINUL

ARTEMISIA ABSINTHIUM L. — FAM. COMPOSITAE

Fr.: Absinthe; G.: Wermut; M.: Fehér üröm;
R.: Polini gorkaia.

Plantă erbacee perenă, robustă, înaltă de 0,5—1,2 m, alb-cenușie datorită perilor deși și mătăsoși, cu frunze bi- sau tripenat sectate, lanceolate, flori galbene în numeroase antodii globuloase, așezate în racem la vârful tulpinilor.

Partea utilizată. Partea aeriană, respectiv vîrfurile tulpinale de 30—40 cm și ramificațiile (Herba Absinthii) — VII—IX.

Ecologie, răspîndire, zonare. Extrem de puțin pretențios la condițiile de mediu, pelinul crește pe terenuri aride, pietroase, rezistă la secetă, vegetează în locuri puternic însorite în zona de cîmpie și deal, în locuri necultivate, pe lângă canalele de irigații, la marginea drumurilor, a gardurilor, în toată Dobrogea, partea de cîmpie și colinară a Olteniei, Munteniei și sudul Moldovei (spre nord, conținutul plantelor în ulei este mult diminuat). Pentru cultură, cele mai favorabile zone sînt în jud. Buzău, Prahova, Brăila, Ialomița, Giurgiu, Teleorman, Olt, Dolj.

Tehnologia de cultură. Premergătoare — prășitoare timpurii și leguminoase. **Îngrășăminte** — fosfor 90—100 kg/ha și potasiu 40—60 kg/ha încorporate toamna sub arătură; azot 90—100 kg/ha iarna, pe zăpadă.

Pregătirea terenului — arătură adîncă de toamnă la 25—28 cm cu plugul urmat de disc în agregat cu grapa cu colți reglabili, apoi tăvălugit. **Însămînțare** — în pragul iernii, imediat după grîu, cu semănătoarea SUP—29 amenajată pentru semințe mici, cu 2—3 kg/ha, la 50 cm interval și 0,3—0,5 cm adîncime. **Lucrări de întreținere** — tăvălugire imediat după însămînțare, 2—3 prașile mecanice sau manuale în fiecare an (din care una imediat după recoltare); în anii II—IV, primăvara, îndepărtarea tulpinilor uscate cu un tăvălug greu sau cu o grapă puternică, apoi prașilă mecanică între rînduri. **Recoltare** — cu secera sau cositoarea mecanică, cînd planta este înflorită cca 25%.

Recoltarea din flora spontană. Pentru ulei volatil la începutul înfloririi, iar pentru utilizări medicinale la înflorire deplină, în ambele cazuri cu secera sau cosorul.

FLORĂ SPONTANĂ CULTURI



Principii active. Ulei volatil bogat în azulene, substanțe amare (absintina, anabsintina), tanin, acizi organici.

Acțiunea farmacologică. Tonic amar, dezinfecțant și antiinflamator digestiv; antivomitiv; antihelmintic; diuretic cu eliminare de urați; emenagog; ușor laxativ.

Recomandări majore. Gastrite hipoacide, anorexie (inclusiv în anemie, convalescență), atonie digestivă.

Alte recomandări. INT. — Dispepsii cu constipație; colici digestive, aerofagie; stări de vomă; edeme renale, gută, hidropizie; dismenoree; oxiiurază (inclusiv în uz extern). EXT. — Plăgi purulente.

Mod de administrare. INT. — Infuzie (1/2 linguriță la cană), 1/4 de cană înainte de masă; tinctură (20 g de plantă macerată 7 zile în 100 ml alcool) cîte 15—20 picături înainte de mese; plantă pulverizată (2—3 g în amestec cu miere), luată dimineața pe stomacul gol, ca vermifug. EXT. — Băi de șezut, clisme, spălături. Intră în formula ceaiului tonic aperitiv.

Contraindicații. Cure mai lungi de 7—8 zile produc tulburări nervoase și digestive; afecțiuni nervoase, infecții intestinale acute, gravide, lehuze.

ARTEMISIA DRACUNCULUS L. — FAM. COMPOSITAE

Fr., G.: Estragon; M.: Tárkony; R.: Polini estragon.

Plantă perenă, exclusiv de cultură, înaltă de 60—120 cm, tufoasă, puternic aromată, cu frunze liniar-lanceolate, flori în antodii globuloase dispuse în raceme spre vârful ramurilor.

Partea utilizată. Partea aeriană (Herba Dracunculi) — VII—IX (X).

Ecologie, zonare. Tarhonul este o specie pretențioasă care cere un sol bogat, cu structură, bine drenat, cu umiditate permanentă, lumină directă și temperatură ridicată în timpul verii. Se recomandă a fi cultivat în zonele legumicole din sudul țării, îndeosebi în jud. Dolj, Giurgiu, Ialomița.

Tehnologia de cultură. Premergătoare — cereale de toamnă, prășitoare, leguminoase. **Îngrășămint** — fosfor 50—60 kg/ha, potasiu 20—30 kg/ha și gunoi de grajd 20—30 t/ha încorporate o dată cu arătura adâncă de bază; azot 50—60 kg/ha administrat primăvara.

Pregătirea terenului — arătură de bază la 28—30 cm adâncime, cu plugul în agregat cu grapa stelată, primăvara cu 1—2 zile înainte de plantare, nivelare, lucrare cu combinatorul. **Plantare** — cu butași sau răsad, primăvara devreme, pe timp noros, la 50 cm interval între rânduri și 30 cm între plante pe rând. **Lucrări de întreținere** — udare imediat după plantare; în anul I, 2—3 prașile manuale (inclusiv după recoltare) și tot atâtea mecanice; la fel și în anii următori. **Recoltare** — pentru ulei, când plantele sînt înflorite, 25%; în scop condimentar și medicinal, la apariția primilor butoni florali. Se recoltează manual cu secera sau mecanic cu cositoarea (se recoltează numai cît se poate prelucra în 24 de ore).

Principii active. Ulei volatil cu 60—70% metilcavicol, tanin, substanțe amare, vitamine (B₁ și C), săruri minerale, urme de iod.

Acțiune farmacologică. Stimulează digestia și apetitul; carminativ; diuretic cu eliminare masivă de acid uric; expectorant și calmant al spasmelor bronhice.

Recomandări majore. Tulburări dispeptice; condiment în regimul desodat.



Alte recomandări. Litiază renală urică, edeme, hidropizie; reumatism; anorexie; bronșită.

Mod de administrare. Infuzie (1 linguriță la cană), 2—3 căni pe zi înainte de mese pentru anorexie, după mese ca stomachic.

TUSSILAGO FARFARA L. — FAM. COMPOSITAE

Fr.: Tussilage; G.: Huflattich; M.: Lökormú martilapu;
R.: Mati-i-macieha.

Specie erbacee cu aspect diferit după sezon: primăvara, timpuriu, are tulpini florifere, frunze mici solziforme, iar mai târziu, frunze mari, pornind direct din rizom, moi, aproape rotunde, cu peri linoși pe fața inferioară. **Partea utilizată.** Florile — în fapt inflorescențele (Flores Farfarae) — III—IV; frunzele (Folium Farfarae) — V—VII.

Ecologie, răspândire. Podbalul este o specie de lumină și semiumbră, crește pe coaste ripoase, malurile abrupte ale râurilor, pe locuri cu eroziuni recente, săpături, mai ales în zone de deal și munte, are cerințe ridicate față de umiditate. Este răspândit în întreaga Transilvanie, precum și în Moldova, Muntenia și Oltenia, în județele care mărginesc arcul carpatic.

Recoltare. Florile, la începutul deschiderii antodiilor, fie prin ciupire, fie cu mina făcută „pieptene”, sau cu recoltatori de mușețel. Frunzele se rup fără pețiol.

Principii active. Mucilagii, taninuri, un principiu amar (tusilagina), inulină, săruri de potasiu.

Acțiune farmacologică. Emolient și fluidifiant al secrețiilor bronhice; diuretic; ușor coleretic-colagog.

Recomandări majore. Bronșită, tuse, astm, răgușeală, emfizem, silicoză și, în general, în toate afecțiunile respiratorii.

Alte recomandări. Afecțiuni urinare; diskinezie biliară; dispepsii ușoare; anorexie.

Mod de administrare. Infuzie (1 lingură la cană), 2—3 cani pe zi; infuzie concentrată (2—3 linguri la cană) care se bea în cursul zilei.

Intră în formula ceaiurilor antiastmatic, antibronșitic și în cea a țigărilor antiastmatice.



ARNICA MONTANA L. — FAM. COMPOSITAE

Fr.: Arnica; G.: Bergwohlverleih; M.: Hegyi arnika; R.: Arnica gornaia.

Plantă ierboasă perenă, cu rozetă bazală și frunze tulpinale puține, opuse, inflorescență antodiu mare, de culoare galbenă (rar 2—5).

Partea utilizată. Florile — în fapt inflorescențele (Flores Arnicae) — VI—VII.

Ecologie, răspândire. Arnica crește în finețe și pășuni umede din zona montană și subalpină, mai rar prin poieni și tufărișuri, în tot lanțul carpatic, îndeosebi în Munții Apuseni (jud. Alba, Hunedoara și mai ales Cluj), nordul Moldovei (jud. Suceava) unde este specie ocrotită.

Recoltare. La începutul înfloririi pentru a nu se obține un produs cu papus, tăindu-se fără codiță.

Principii active. Ulei volatil; carotenoizi; alcooli triterpenici; flavonoide; colină.

Acțiune farmacologică. Antiinflamator, antiseptic, cicatrizant.

Recomandări majore. EXT. — Echimoze și contuzii (nu se utilizează pentru răni deschise).

Alte recomandări. EXT. — Laringită, răgușeală.

Mod de administrare. EXT. — Comprese cu tinctură (20 g macerate 10 zile în 100 ml alcool) diluată 1/5—1/10 cu apă potabilă sau apă de plumb; gargară cu infuzie (1 linguriță la cană).

Observații. Se recomandă și în uz intern ca sedativ nervos în moderarea activității centrilor nervoși superiori, spasme arteriale, ateroscleroză, dar numai la recomandarea și sub controlul medicului, sub formă de tinctură farmaceutică, deoarece planta este toxică.



CALENDULA OFFICINALIS L. — FAM. COMPOSITAE.

Fr.: Souci; G.: Ringelblume; M.: Körömvirág; R.: Nogotki.

Gălbenelele sînt plante ornamentale anuale, bogat ramificate, pubescente, cu frunze alterne, sesile, invers lanceolate, avînd inflorescențe terminale cu flori ligulate galben-portocalii, în centru cu flori tubuloase.

Partea utilizată. Inflorescențele (Flores Calendulae cum receptaculis) — Florile ligulate (Flores Calendulae sine receptaculis) — VI—IX.

Ecologie, zonare. Specie cu cerințe ecologice moderate, crește în lumină directă, nu este pretențioasă față de temperatură, sol, umiditate. Se poate cultiva în orice zonă a țării, îmbinîndu-se scopul ornamental cu cel medicinal.

Tehnologia de cultură. Premergătoare — prășitoare.

Îngrășăminte — fosfor 60—80 kg/ha și potasiu 35—45 kg/ha încorporate toamna la arătura de bază; azot

40—45 kg/ha primăvara înainte de semănat. **Pregătirea terenului** — arătura de toamnă la 22—25 cm adîncime,

săpat și discuit; primăvara, lucrare cu combinatorul și nivelare. **Însămînțare** — cu semănătoarea SUP—29,

primăvara devreme, la 50 cm între rînduri și 2—3 cm adîncime, cu 6 kg sămînță la ha. **Lucrări de întreținere**

— tăvălugit după însămînțare, prașilă mecanică cînd sînt vizibile rîndurile, 4—6 prașile manuale (de cîte ori se face recoltarea) și 1—2 prașile mecanice. **Recoltare** — manual, imediat după deschidere. Recoltarea stimulează formarea de noi inflorescențe.

Principii active. Carotenoide, flavonoide, saponine triterpenice, principii amare, mucilagii.

Acțiune farmacologică. Cicatrizant; coleretic-colagog; emenagog; antitrichomonazic.

Recomandări majore. Gastrită hiperacidă, ulcer gastroduodenal.

Alte recomandări. INT. — Diskinezii biliare,

colecistopatii; dismenoree. EXT. — Trichomonoză

vaginală; plăgi, ulcerații, degerături, eczeme. COSM. — Tenuri uscate.

Mod de administrare. INT. — Infuzie (1 1/2 linguriță la cană), 2—3 cani pe zi, între mese, pentru ulcer și gastrite; tinctură (20 g macerate 8 zile în 100 ml alcool),



de 3 ori pe zi, cîte 30 picături. EXT. — Băi, cataplasme cu infuzie sau tinctură diluată cu apă 1/10 ; spălături vaginale cu infuzie.

Întră în formula ceaiurilor gastric 1 și 2 și gastric cicatrizant.

CNICUS BENEDICTUS L. — FAM. COMPOSITAE.

Fr.: Chardon benit; G.: Benedikterkraut; M. Benedekfü; R.: Volcieț kudriavii.

Plantă de cultură anuală, erectă, înaltă de 30—80 cm, ghimpoasă, avînd tulpina cu 5 muchii, verzuie sau roșie-brună, frunze alungite, sinuate, cu nervuri proeminente și dinți țepoși pe margine, flori galbene în antodii terminale mari (cca 3 cm diametru), cu bractee mari, spinoase pe margine.

Partea utilizată. Partea aeriană (Herba Cnici sau Herba Cardui benedicti) — VII—IX.

Ecologie, zonare. Originar din zonele calde, schinelul crește în locuri însorite, îndeosebi pe soluri umede, profunde, mai grele. Este relativ rezistentă la secetă. Se recomandă a fi cultivat în jud. Prahova, Buzău (în sud), Giurgiu.

Tehnologia de cultură. Premergătoare — culturi premergătoare îngrășate, cereale. **Ingrășăminte** — fosfor 50—60 kg/ha și potasiu 30—40 kg/ha încorporate la arătura de bază; azot 60—70 kg/ha primăvara devreme.

Pregătirea terenului — arătură adîncă la 22—25 cm, primăvara nivelare și lucrare cu combinatorul.

Însămînțare — cu semănătoarea SPC—6 sau SPC—8 primăvara, foarte devreme, cu 15 kg/ha, la 50 cm interval și 2,5—3 cm adîncime. **Lucrări de întreținere** — erbicidare cu Balan diluat în 600 l apă/ha cu MET—1200, primăvara, înainte de semănat; în cursul vegetației, 1—2 prașile mecanice și manuale. **Recoltare** — la începutul înfloririi, cu cositoarea, la 10—12 cm de la colet.

Principii active. Principii amare (cnicina, benedictina), ulei volatil, mucilagii, fitosterine, un principiu antibiotic, săruri de potasiu, vitamina B₂.

Acțiune farmacologică. Tonic-amar-eupeptic; mărește lent, dar pe durată mare, secreția gastrică; stimulent al secrețiilor hepatice și pancreatice; depurativ; febrifug; cicatrizant și antiseptic.

Recomandări majore. Dispepsii, gastrite hipoacide, aciditate.

Alte recomandări. INT. — Anorexie; insuficiență hepatică și pancreatică; diskinezie biliare. EXT. — Ulcerații ale pielii; degerături, arsuri.



Mod de administrare. INT. — Infuzie sau macerat la rece (1—1 1/2 linguriță la cană), 1/4 de cană înainte de mese; tinctură (20 g de plantă macerată 7—8 zile în 100 ml alcool), 40—50 picături cu jumătate de oră înainte de masă. EXT. — Cataplasme cu infuzie concentrată (3 lingurițe la cană); băi cu infuzie. Întră în formula ceaiului tonic aperitiv.

TARAXACUM OFFICINALE WEB. — FAM. COMPOSITAE

Fr.: Pisenlit; G.: Löwenzahn; M.: Pongyola pitypang; R.: Aduvancik lekarstvennii.

Specie erbacee extrem de comună, cu rozetă bazală de frunze lanceolate și inegal scobite pe margine, tulpina floriferă goală la mijloc, inflorescență antodiu terminal de culoare galbenă.

Partea utilizată. Frunzele (Folium Taraxaci); planta întreagă (Herba Taraxaci cum radice); rădăcinile (Radix Taraxaci) — IV—IX.

Ecologie, răspindire. Păpădia are cerințe ecologice foarte largi, fiind răspândită din cîmpie pînă în zona subalpină, în locuri necultivate, pășuni și fînețe, la margini de drumuri, abundentă în lucerniere sau trifoiști.

Recoltare. Frunzele se recoltează cu mîna, iar planta întreagă sau rădăcinile cu cazmaua. În cazul recoltării plantei întregi, se îndepărtează tulpinile florifere.

Principii active. Inulină, rezine, tanin, mucilagii, substanță amară (taraxacina), fitoncide, fitosteroli, colină, acid cafeic, alcooli triterpenici specifici.

Acțiune farmacologică. Coleretic-colagog; normalizează circulația sanguină; stimulează secrețiile salivare, gastrointestinale, hepatice; diuretic; depurativ cu eliminare masivă de colesterol; adjuvant al reechilibrării glandulare.

Recomandări majore. Diskinezie, colecistită, insuficiență hepatică, crize hepatice, dureroase, icter catara, constipații datorate unor afecțiuni hepatice.

Alte recomandări. INT. — Afecțiuni circulatorii; anorexie; dispepsii; afecțiuni renale; ateroscleroză; gută, reumatism; eczeme, alte afecțiuni cutanate; obezitate (în asociere cu specii laxative, diuretice, sudorifice); diabet. COSM. — Curăță tenul, îndepărtează petele și pistrii.

Mod de administrare. INT. — Infuzie din frunze sau decoct din rădăcini (1—2 lingurițe la cană), 2—3 căni pe zi; salate în cura depurativă de primăvară; suc din planta proaspătă (1—3 linguri pe zi, 3—6 săptămîni). COSM. — aplicații cu suc de plantă.

Intră în formula ceaiurilor depurativ, dietetic, gastric, hepatic.



4. PLANTE CU FLORI ROSII

A. COROLA CU PETALE LIBERE



B. COROLA CU PETALE UNITE



PAPAVER RHOEAS L. — FAM. PAPAVERACEAE

Fr.: Coquelicot, Pavot rouge; G.: Feuer Mohn; M.: Vetési pipacs; R.: Mak samaseika.

Plantă erbacee anuală, cu tulpina erectă, acoperită cu peri aspri, frunze penat-sectate, flori solitare cu 2 sepale mari, caduce și 4 petale de culoare roșu aprins.

Partea utilizată. Petalele (Flores Rhoeados) — VI—VII.

Ecologie, răspîndire. Deși specifică ca buruiună de semănături (în special de cereale), macul se întâlnește și în miriști, pe marginea drumurilor, a căilor ferate, pe soluri mai fertile și bogate în calciu. Crește în toate județele de câmpie și deal.

Recoltare. Prin desprinderea ușoară a petalelor, la începutul desfacerii florii.

Principii active. Mucilagii, alcaloizi (readina, reagenina, antocianozid).

Acțiune farmacologică. Emolient și antitusiv; sedativ și ușor hipnotic; decongestionant.

Recomandări majore. Bronșite, răceală, gripă, răgușeală.

Alte recomandări. INT. — Stări de agitație și insomnii (îndeosebi pentru copii). EXT. — Decongestionarea pleoapelor inflamate; dureri de gît.

Mod de administrare. INT. — Infuzie (1 linguriță la cană) care se bea caldă, în cursul unei zile; pentru efectul hipnotic, jumătate se bea seara. EXT. — Cataplasme cu infuzie caldă pe pleoape; gargară cu infuzie.



RIBES NIGRUM L. — FAM. SAXIFRAGACEAE

Fr.: Cassis; G.: Schwarze Johannisbère; M.: Fekete ribizke; R.: Smaradina ciornaia.

Arbust cultivat, mai rar întâlnit în flora spontană, înalt până la 1—2 m, puternic ramificat, cu frunze trilobate, pe spate cu puncte galbene strălucitoare, flori pe tip 5, campanulate, galben-verzui la exterior, roșu carnal la interior.

Partea utilizată. Frunzele (Folium Ribi nigri) — VI—VII
Ecologie, răspîndire. În flora spontană, considerat relict glaciatic, coacăzul negru crește sporadic în Transilvania (jud. Bistrița-Năsăud, Cluj, Harghita, Covasna, Alba), Moldova (jud. Bacău), prin păduri și tufișuri din zona montană. Suportă umbra, rezistă foarte bine la geruri și înghețuri, are nevoie de multă umiditate. Se localizează mai ales pe soluri mai grele și umede. Sursa principală de recoltare a frunzelor o constituie însă culturile, în zone de deal, din jud. Satu-Mare, Bihor, Cluj, Dîmbovița și cu deosebire Suceava.

Recoltare. Prin ciupirea a cel mult 20—25% din frunze.

Principii active. Rutozid, vitamina C, tanin, săruri de potasiu, ulei volatil.

Acțiune farmacologică. Hipotensor cu marcată acțiune antiaterosclerotică; diuretic cu masivă eliminare de acid uric și purină.

Recomandări majore. Ateroscleroză.

Alte recomandări. Hipertensiune; afecțiuni renale (inclusiv litiază urică); edeme cardiorenale; gută; reumatism.

Mod de administrare. Infuzie (2 lingurițe la cană), 3 căni pe zi, între mese, în cure de lungă durată, respectiv 5—6 luni.

Intră drept component de bază în formula ceaiului antiaterosclerotic.



ROSA CANINA L. — FAM. ROSACEAE

Fr.: Eglantier; G.: Hunds Rose; M.: Gyepű rózsza;
R.: Roza sabacia

Arbust ghimpos, înalt de 2—3 m, cu ramuri arcuite în afară, frunze penat-compuse cu 5—7 foliole dispuse altern, flori pe tip 5 solitare sau grupate câte 2—3 la vârful ramurilor.

Partea utilizată. Peretele cărnos (pericarpul) al măceșelor (Fructus Cynosbati sine semine) — VIII—X.

Ecologie, răspîndire. Măceșul, specie de lumină, crește în rărituri de păduri sau pe marginea acestora, în locuri poienite, pe coaste cu expoziție însoară, în pășuni și finete, la marginea drumurilor și a căilor ferate. Fiind puțin pretențios față de sol, vegetează și pe terenurile sărace, pietroase, erodate sau supuse eroziunii. Rezistă foarte bine la temperaturi scăzute și la umiditate redusă. Altitudinal, se întîlnește de la cîmpie pînă la munte (cca 1200 m), îndeosebi în zonele de deal.

Recoltare. Fructele se culeg cînd devin cărămizii și au pete verzui doar la vîrf.

Principii active. Complex vitaminic (C, A, B₁, B₂, P, K, PP, E); acizi organici, pectine, tanin, flavonoizi, carotenoide.

Acțiune farmacologică. Tonic-vitaminizant; scăderea permeabilității și fragilității capilare, normalizarea circulației periferice; anticataral; hepatoprotector, coleretic-colagog; diuretic; vermifug (îndeosebi tenifug).

Recomandări majore. Avitaminoze; sursă de vitamină C, îndeosebi pentru copii și convalescenți.

Alte recomandări. Tulburări de circulație periferică, purpuri; afecțiuni renale, inclusiv litiază (pentru aceasta se recomandă achenele, popular numite „semințe”); sechele de hepatită, diskinezie biliară; enterocolită, catar intestinal; helmintiaze (îndeosebi teniaze).

Mod de administrare. Decoct scurt (2 linguri de măceșe fierte 5—10 minute în 0,5 l. apă; fructele se introduc în apă cînd aceasta clocotește); macerat la rece (100 g măceșe macerate 12 ore în 1 l. apă) care se poate consuma și ca băutură răcoritoare; pulpă de măceșe în miere — pentru eliminarea viermilor (2 părți fructe și o parte miere), 2—3 lingurițe dimineața pe stomacul gol.



Se mai pot face siropuri, gemuri, dulceață, cidru. Pulpă fructelor de măceș intră în formula ceaiurilor aromat, hepatic, tonic-aperitiv, iar achenele în ceaiul diuretic 2.

ONONIS SPINOSA L. — FAM. LEGUMINOSAE

Fr.: Bugrane; G.: Hauhechel; M. Tövises iglic;
R.: Stalnik kaliucii.

Plantă erbacee perenă, cu tulpina mult ramificată, ramuri terminate cu spini, frunze trifoliate, flori papilionate, roz, cu dungi mai închise, dispuse spre vârful tulpinii.

Partea utilizată. Rădăcinile (Radix Ononidis) — III—IV și IX—XI.

Ecologie, răspândire. Specie de pășuni și finețe mai aride din zona de deal, răspândită îndeosebi în întreaga Transilvanie (mai ales în jud. Cluj și Sălaj), zona colinară a Olteniei (mai ales Mehedinți și Gorj) și a Moldovei (Vrancea, Bacău, Neamț, Suceava).

Recoltare. Se taie cu ajutorul cazmalei coletul care se pune din nou în pământ pentru a se asigura refacerea plantei.

Principii active. Glicozide flavonice (ononina, onospina), saponozide triterpenice, ulei volatil, tanin.

Acțiune farmacologică. Diuretic puternic; depurativ; sedativ și ușor hipnotic; ușor laxativ; expectorant.

Recomandări majore. Afecțiuni ale aparatului urinar, calmînd și durerile în litiaze și cistite.

Alte recomandări. INT. — Edeme cardiorenale, hidropizie; reumatism; dermatoze; stări de nervozitate, insomnii; constipații ușoare; bronșită, laringită (în faza de coctiune). EXT. — Angină.

Mod de administrare. INT. — Decoct (1 1/2 linguriță la cană), 2—3 căni pe zi. EXT. — Gargară cu decoct mai concentrat.

Intră în formula ceaiului diuretic 2.



LYTHRUM SALICARIA L. — FAM. LYTHRACEAE

Fr.: Salicaire; G.: Blut-Weiderich; M.: Füzény;

R.: Derienik iyolistnii.

Plantă erbacee robustă, înaltă pînă la 2 m, neramificată, cu frunze lanceolate, inflorescență terminală, lungă de 20—40 cm, flori roșii-violacee pe tipul 6.

Partea utilizată. Partea aeriană (Herba Salicariae) — VI—IX.

Ecologie, răspîndire. Plantă specifică pentru locuri mlăștinoase din zona de cîmpie pînă în cea montană. Este răspîdită în întreaga țară în zone mlăștinoase sau în buruienișurile din zonele inundabile, abundentă în Lunca și Delta Dunării.

Recoltare. La începerea perioadei de înflorire, se taie vîrfurile ramurilor cu inflorescențe (la distanță de 30—40 cm de la vîrf).

Principii active. Taninuri, flavonozide, antocianozide, colină, fitoncide, urme de ulei volatil.

Acțiune farmacologică. Antidiareic puternic, complet neiritant, antiseptic al tractului digestiv, antihemoragic; cicatrizant și antiseptic general.

Recomandări majore. Diaree bacilare, dizenterie.

Alte recomandări. INT. — Hemoragii. EXT. — Ulcere varicoase, hemoroizi; leucoree.

Mod de administrare. INT. — Infuzie sau decoctie scurtă (1 linguriță la cană), 2—3 căni pe zi. EXT. — Băi cicatrizante și spălături vaginale cu infuzie sau decoct.

Intră în compoziția ceaiului antidiareic și a produsului cosmetic Floriten 2.



CHAMAENERION ANGUSTIFOLIUM (L.) SCOP. SIN.
EPILOBIUM ANGUSTIFOLIUM L. — FAM.
ONAGRACEAE

Fr.: Osieur fleuri; G.: Gemeines Unholdenkraut;
M.: Erdei deréce; R.: Kiprei uskolistnii, Ivan ceai.

Răskoagea sau Sburătoarea cum se mai numește este o plantă erbacee înaltă de 0,80—1,30 m, neramificată, cu frunze dese, lanceolate, inflorescență racem terminal alungit, flori roșii-violacee asimetrice care trec în fructificații de tip capsulă alungită, la deschidere cu un papus abundent.

Partea utilizată. Frunzele (Folium Epilobii angustifolii) — VI—VII.

Ecologie, răspindire. Specie caracteristică pentru tăieturi, doborâturi de pădure, se întâlnește de la altitudinea de 500—600 m și până la limita superioară a pădurilor de molid, mai rar pe marginea apelor de munte, pe stîncării. Este răspîdită în tot arcu carpatic.

Recoltare. Frunzele se strujesc cînd planta nu este încă înflorită; înaintea uscării se pun la fermentare 5—7 zile, pînă se brunifică.

Principii active. Tanin, vitamina C, flavone (rutină, cvercitină), antocianidine, triterpene.

Acțiune farmacologică. Antidiareic; efect bacteriostatic asupra bacteriilor care provoacă supurații.

Recomandări majore. Ceai alimentar înlocuitor pentru ceaiul veritabil.

Alte recomandări. INT. — Diaree. EXT. — Afte; răni cu supurații.

Mod de administrare. INT. — Infuzie (1—1 1/2 linguriți la cană) care se bea îndulcită după gust. EXT. — Infuzie concentrată (2 linguri la cană) pentru spălarea rănilor și clătirea gurii.



NALBA DE GRĂDINĂ

CULTURI

ALTHAEA ROSEA (L.) VAR. NIGRA HORT. — FAM. MALVACEAE

Fr.: Rose trémière, Mauve arborée; G.: Pappelrose, Stockrose; M.: Mályvarózsa; R.: Šcitokroza rozovaia.

Plantă perenă de cultură, erectă și foarte înaltă (până la 3 m), cu peri aspri pe întreg aparatul vegetativ, tulpină cilindrică, robustă, puțin ramificată, frunze mari palmat-lobate, flori în spice terminale mult alungite foarte mari (6—10 cm), caliciu dublu, 5 petale negre-purpurii.

Partea utilizată. Florile (Flores Malvae arboreae) — VII—IX.

Ecologie, zonare. Specie de lumină directă și semiumbră, cu cerințe moderate față de umiditate, dar solicitând soluri adânci, afinate, bogate în humus. Suportă bine temperaturile ridicate sau scăzute. Sînt indicate terenurile adăpostite, deoarece datorită portului este ușor doborâtă de vînt. Poate fi cultivată în jud. Brăila, Buzău, Botoșani, dar și în restul țării.

Tehnologia de cultură. Premergătoare — nu are preferințe speciale. **Ingrășăminte** — fosfor 60—70 kg/ha la arătura de bază și azot 40—60 kg/ha încorporate primăvara, timpuriu; în anii II și III se dau printre rînduri fosfor și azot cu norma la jumătate. **Pregătirea terenului** — arătură la adîncimea de 28—30 cm; cu 2—3 săptămîni înainte de semănat, se efectuează lucrarea cu combinatorul și nivelatorul.

Insămînțare — primăvara devreme cu semănătoarea SUP—21 cu limitatoare de adîncime, la 70—75 cm interval și 1—1,5 cm adîncime, cu 6 kg/ha.


Lucrări de întreținere — plivit și prăsit de cîte ori este nevoie în fiecare an de vegetație; în primul an cînd plantele au 4—6 cm înălțime se răresc la 15—25 cm.

Recoltare — din anul II cînd florile sînt complet deschise.

Principii active. Mucilagii, fitosterine, pigmenți antocianici.

Acțiune farmacologică. Emolient.

Recomandări majore. Tuse, bronșită, laringită (în prima fază iritativă).



Alte recomandări. EXT. — Inflamații buco-faringiene. **Mod de administrare. INT.** — Macerat la rece sau infuzie (o lingură la cană), 3 căni pe zi. **EXT.** — Gargară cu macerat sau infuzie în concentrație dublă.

MALVA GLABRA DESV. SIN. MALVA SILVESTRIS
L. SSP. MAURITANICA (L.) THELLUNG — FAM.
MALVACEAE

Fr.: Mauve; G.: Kultur Käsepappel; M.: Papsajt;
R.: Prasvirnik lesnoi.

Subspecie de cultură, ierboasă, bienală sau perenă (în condițiile țării noastre se cultivă ca anuală, deoarece în anul II este atacată masiv de rugină), erectă, înaltă până la 1 m, cu frunze palmat-lobate, cu lobi dințați pe margine, nervuri proeminente pe fața inferioară, flori solitare la axila frunzelor, roșii-violacee.

Partea utilizată. Florile (Flores Malvae silvestris) — VII—IX; frunzele (Folium Malvae silvestris) — VI—IX.

Ecologie, zonare. Plantă bine adaptată la condițiile țării noastre, cu cerințe moderate față de temperatură și umiditate, excesul acestora favorizând atacuri masive de rugină. Specie de lumină directă, mai pretențioasă față de sol, cu dezvoltare bună pe cele profunde, ușoare sau mijlocii, mai ales pe cernoziomuri. Se poate cultiva în întreaga țară, recomandându-se și ca plantă medicinal-ornamentală în parcuri și spații verzi.

Tehnologia de cultură. Premergătoare — cereale păioase sau prășitoare bine îngrășate. **Îngrășăminte** — fosfor 40—50 kg/ha și potasiu 30—40 kg/ha la arătura de bază; azot 60—80 kg/ha aplicat iarna pe zăpadă.

Pregătirea terenului — arătură la adâncimea de 22—25 cm, primăvara lucrare cu combinatorul.

Însămînțare — cu semănătoarea SUP—21 primăvara timpuriu, la 50 cm interval și 1—1,5 cm adâncime, cu 4—5 kg/ha. **Lucrări de întreținere** — prășit pe rând imediat după răsărire, apoi 1—2 prașile manuale și tot atâtea mecanice. **Recoltare** — florile se ciupesc manual la completa deschidere; frunzele în mai multe reprize, atât timp cât nu sînt atacate de rugină sau înțepate.

Principii active. Mucilagii, vitamine (A, B₁, B₂, C), antocianozizi (în flori), un principiu cu acțiune ocitocică.

Acțiune farmacologică. Emolient; maturativ; ușor laxativ.



Recomandări majore. Tuse, bronșite, laringite (în faza iritativă).

Alte recomandări. INT. — Enterite; constipații; ciștite. EXT. — dureri de gît, amigdalite, afte; furunculoză. COSM. — Iritații ale pleoapelor și obrazului; cuperoză; ten uscat.

Mod de administrare. INT. — Macerat la rece sau infuzie (1 lingură la cană), 3 căni pe zi. EXT. — Gargară, spălături locale, cataplasme cu decoct concentrat (50 g la litru).

Florile intră în formula ceaiului pectoral.

MALVA NEGLECTA WALLR. — FAM. MALVACEAE

Fr.: Petite Mauve; G.: Gemeine Käschnappel; M.: Kerek levelii mályva; R.: Prasvirnik prenebrejennii.

Nalba mică sau Cașul popii cum i se mai spune este o plantă comună, ierboasă, anuală sau perenă, înaltă de 10—40 cm, tîritoare (rar erectă), bogat foliată și acoperită cu peri moi, frunze alterne, lung pețiolate (pînă la 15—25 cm), limb reniform sau rotund cu 5—7 lobi palmați, rotunjiți și cu margine dințată, flori mici, alb-roze, cîte 1—6 la subsuoara frunzelor.

Partea utilizată. Frunzele (*Folium Malvae neglectae*) — VI—IX.

Ecologie, răspîndire. Specie puțin pretențioasă care crește în locuri ruderaie și necultivate, în special în localități, în curți și pe marginea drumurilor, la lumină directă. Pe vreme excesiv de ploioasă este atacată masiv de rugină, produsul fiind inapt pentru recoltare.

Recoltare. Numai limbul prin ciupire sau cu recoltatorul de mușețel (acolo unde planta este în masă).

Principii active. Mucilagii, tanoizi, lipide, fitosteroli, vitaminele C și A.

Acțiune farmacologică. Emolient; maturativ; ușor laxativ.

Recomandări majore. Tuse, bronșită, laringită (în faza iritativă).

Alte recomandări. INT. — Enterite, constipații; cistite.

EXT. — Dureri de gît, amigdalite, afte; furunculoză.

COSM. — Iritații ale pleoapelor și obrazului; cuperoză; ten uscat.

Mod de administrare. INT. — Macerat la rece sau infuzie (1 lingură la cană), 3 căni pe zi. EXT. — Gargară, spălături locale, cataplasme cu decoct concentrat (50 g la litru).



VACCINIUM MYRTILLUS L. — FAM. ERICACEAE.

Fr.: Airelle myrtille; G.: Heidelbeere; M.: Fekete áfonya; R.: Ciernica abiknavennaia.

Arbust înalt de 10—50 cm, foarte ramificat, cu tulpină verde având muchii evidente, frunze alterne, ovale, cu vîrf ascuțit și marginea mărunț dințată, flori solitare pe tip 5 la subsuoara frunzelor, corola roză, globuloasă.

Partea utilizată. Frunzele (Folium Myrtilli) — VII—IX.

Ecologie, răspîndire. Specie montană, de la limita inferioară a molidișului pînă în zona alpină (2250 m), crește atît la umbră, semiumbră, cit și la soare, în tăieturi sau doborîturi de pădure, pajiști sărace, îndeosebi pe versanți mai umbriți și umezi, fiind indicator pentru soluri puternic acide, sărace în elemente nutritive, dar cu umiditate ridicată. Se întîlnește în întregul lanț carpatic, în toate județele de munte.

Recoltare. Se taie ramurile după recoltarea fructelor, iar după uscarea se scutură frunzele prin batere.

Principii active. Taninuri, derivați flavonici, arbutozid, mirtilină.

Acțiune farmacologică. Hipoglicemiant activ; diuretic și dezinfectant al tubului urinar; antidiareic; antihemoragic; anticataral.

Recomandări majore. Diabet.

Alte recomandări. Enterocolite; stări diareice; infecții urinare; gută; reumatism; catar bronșic.

Mod de administrare. Infuzie (1 linguriță la cană), 2—3 căni pe zi, neîndulcită în cazul diabetului.

Întră în formula ceaiului dietetic.



VACCINIUM VITIS IDAEA L. — FAM. ERICACEAE

Fr.: Airelle rouge; **G.:** Preisselbeere; **M.:** Vörös áfonya; **R.:** Brusnika.

Arbust tufos, înalt de 10—30 cm, cu tulpina cilindrică, ramificată, frunze alterne, pieleose, eliptice, având marginile răsfrînte și puncte caracteristice negre pe spate, flori campanulate pe tip 5, alb-roz, dispuse în raceme terminale cu 2—6 flori.

Partea utilizată. Frunzele (Folium Vitis idaea) — VIII—IX.

Ecologie, răspîndire. Merișorul crește la mare altitudine, în pajiști alpine sau lămușuri, mai rar în locuri umbrite (molidușuri). Are cerințe reduse față de sol, vegetează pe soluri schelete, puternic acide. Față de umiditate are amplitudine ridicată, rezistă și la uscăciune. Este răspîndit în zonele mai înalte ale lanțului carpatic, în special în Transilvania (jud. Bistrița-Năsăud, Harghita, Covasna, Brașov, Hunedoara, Sibiu), Oltenia (Gorj, Vâlcea), Muntenia (Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău), Moldova (Suceava, Neamț).

Recoltare. Se taie ramurile, se pun la uscat, după care se scutură frunzele prin batere.

Principii active. Arbutină, hidrochinonă, flavonoizi, tanin.

Acțiune farmacologică. Diuretic energic, litontriptic și puternic antiseptic al căilor urinare; antidiareic.

Recomandări majore. Afecțiuni renale (îndeosebi litiaze), infecții urinare, cistite.

Alte recomandări. Reumatism, gută; diaree.

Mod de administrare. Decocție scurtă (5—10 minute cu 1 1/2 linguriță la cană), 2 căni pe zi, adăugîndu-se un vîrf de cuțit de bicarbonat de sodiu.

Intră în formula ceaiului diuretic 2.



PULMONARIA OFFICINALIS L. — FAM.
BORAGINACEAE

Fr.: Pulmonaire; G.: Lungenkraut; M.: Tdudöfö;
R.: Medunița lekarstvennaia.

Plantă ierboasă, perenă, aspru păroasă, cu tulpina cilindrică, neramificată, înaltă de 15—30 cm, frunze alungit-ovate, cu mici pete rotunde albe, flori grupate câte 6—15 într-o inflorescență de tip cimă scorpioidă, cu corola tubuloasă, la început de culoare roșie, apoi devenind violet și albastră.

Partea utilizată. Frunzele (Folium Pulmonariae) — IV—IX.

Ecologie, răspândire. Plămînărica crește în locuri umbroase și umede, în păduri de foioase, din cîmpie și pînă în zona montană inferioară, în toată țara, cu deosebire în Transilvania, Muntenia (jud. Dîmbovița, Giurgiu), Moldova (jud. Bacău, Neamț, Suceava).
Recoltare. Primăvara frunzele de pe tulpina floriferă, vara și la începutul toamnei cele care apar după înflorire, pe lăstarii sterili.

Principii active. Mucilagii, tanin, saponine, alantoină, săruri de potasiu, acid silicic, vitamine (C, A).

Acțiune farmacologică. Emolient și expectorant; cicatrizant; diuretic și ușor sudorific; remineralizant.
Recomandări majore. Afecțiuni respiratorii (bronșită, gripă, tuse, răgușeală).

Alte recomandări. INT. — Gastrite hiperacide, ulcer; afecțiuni renale; convalescență, stări de demineralizare.
EXT. — Degerături; arsuri.

Mod de administrare. INT. — Infuzie (1 lingură la cană) 2—3 căni pe zi. EXT. — Cataplasme cu infuzie în concentrație dublă.



LEONURUS CARDIACA L. — FAM. LABIATAE

Fr.: Agripaume; G.: Herzgespann; M.: Gyöngyajak;
R.: Pustîrnik piatilopastnîi.

Plantă ierboasă viguroasă, înaltă de peste 1 m, cu tulpina în 4 muchii, frunze opuse, palmat-lobate, avînd aspectul unei labe de gîscă, cu peri aspri, flori roz, grupate cîte 10—20 la subsuara frunzelor în inflorescențe compacte, avînd aspectul unui guler.

Partea utilizată. Partea aeriană (Herba Leonuri) — VI—VIII.

Ecologie, răspîndire. Plantă de lumină, cu cerințe reduse față de umiditate și sol, crește în buruienișurile de la marginea drumurilor și a căilor ferate, la marginea pădurilor, în locuri poienite, pe lângă garduri, pe terenuri necultivate, în zona de cîmpie și deal, pînă la altitudinea de 500—600 m. Este răspîndită în Transilvania, Banat, dar mai ales Muntenia (jud. Argeș, Ialomița, Giurgiu, Teleorman, Buzău, Brăila), Moldova (jud. Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui).

Recoltare. Virful înflorit (cca. 25 cm) și ramurile se taie cu foarfeca sau cosorul.

Principii active. Heterozide cardiotonice, alcaloizi (leunucardina, alți doi neidentificați), ulei volatil, un principiu amar, tanin, saponine, vitamine (A, C, E).

Acțiune farmacologică. Antispasmodic și tonic cardiac; sedativ nervos, hipnotic; antispastic general; stomachic; antiinflamator.

Recomandări majore. Afecțiuni cardiace de origine nervoasă.

Alte recomandări. INT. — Stări depresive nervoase, anxietate, insomnii, îndeosebi ale cardiacilor, astm bronsic; colite și gastrite cu componentă nervoasă; stări spastice ale vezicii biliare; atonie gastrică, digestie lentă. EXT. — Echimoze, răni.

Mod de administrare. INT. — Infuzie (2 lingurițe la cană), 2 căni pe zi, dintre care pentru efectul sedativ una seara înainte de culcare; infuzie concentrată (3 linguri la cană), 3—5 linguri pe zi; tinctură (20 g de plantă macerate 7—8 zile în 100 ml alcool), 20—40 picături de 2—3 ori pe zi. În toate cazurile se fac cure de lungă durată, acțiunea pleneră instalîndu-se după 1—



ăptămîni. EXT. — Cataplasme cu decoct concentrat (50 g la litru).

Intră în formula ceaiurilor sedativ, calmant, antiastmatic, contra tulburărilor cardiace, anticolitic.

SALVIA OFFICINALIS L. — FAM. LABIATAE

Fr.: Sauge; **G.:** Salbei; **M.:** Orvosi zsálya; **R.:** Salfei lekarstvennii.

Salvia sau jaleșul, cum se mai numește, este un subarbust de cultură, bogat ramificat, înalt de 30—80 cm cu tulpina și frunzele acoperite dens de peri de culoare cenușiu-argintie, frunze opuse, ovate, flori albastre-violacee, evident bilabiate, cu 2 stamine ieșite în afară, cu conectiv în formă de pîrghie, în inflorescențe spiciforme.

Partea utilizată. Frunzele (Folium Salviae) — VI—X (2—3 recoltări).

Ecologie, zonare. Specie mediteraneeană, cu cerințe ridicate față de temperatură și lumină (vegetează cel mult la semiumbră), dar puțin pretențioasă față de sol, puțin crește chiar și pe coaste pietroase, nisipuri. Se pretează a fi cultivată în parcuri și în spații verzi pentru valoarea sa ornamentală (se vor evita locurile cu praf, deoarece acesta se fixează pe frunze). Zone prielnice pentru cultură: părțile dinspre Dunăre ale jud. Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, precum și în sudul jud. Constanța.

Tehnologia de cultură. Premergătoare — leguminoase pentru boabe, borceaguri și cereale de toamnă.

Îngrășămintă — fosfor 60—80 kg/ha și potasiu 30—40 kg/ha la arătura de bază; azot 60—70 kg/ha primăvara, pe zăpadă, jumătate din doză și cealaltă jumătate după prima recoltare, încorporate la prașilă.

Pregătirea terenului — arătură la 28—30 cm și lucrare a combinătorul sau grapa cu discuri în agregat cu grapa cu colți reglabili, cu 10—12 zile înainte de semănat.

Însămînțare — cu semănătoarea SUP—21 sau SUP—29 cu distribuitori speciali, la 62,5 cm interval și 3—3,5 cm adîncime, cu 8 kg/ha. **Lucrări de întreținere** — un plivit în anul I și 2—3 prașile manuale și mecanice în timpul vegetației; cînd plantele au 4—5 frunze adevărate, se execută răritul pe rînd la 10 cm plantă de plantă

Recoltarea — manual, înaintea înfloritului.

Principii active. Ulei volatil (cu tuionă, pinene, borneol, cineol), tanin, principii amare, substanțe estrogenice, acizi organici.



Acțiune farmacologică. Stomachic, carminativ și antispastic; coleretic-cologog; tonic nervin; sedativ al durerilor; uterotonic; stimulent al circulației sanguine; antidiabetic energic; cicatrizant și antiseptic; antisudorific.

Recomandări majore. INT. — Diabet; diskinezie biliară; EXT. — Afte, stomatite, gingivite, abcese dentare.

Alte recomandări. INT. — Dispepsii, gastrite hipoacide, stomacuri atone; colici; astenii, mai ales cele care succed unor afecțiuni de durată, epuizante; sudorație nocturnă exagerată (îndeosebi în TBC); afecțiuni circulatorii; tonifierea uterului după naștere. EXT. — Răni cu puroi; transpirație fetidă a picioarelor.

Mod de administrare. INT. — Infuzie (1 linguriță la cană) care se bea cîte o cană după fiecare masă; contra sudorației nocturne o cană înainte de culcare. EXT. — Gargarisme, comprese, loțiuni, băi locale cu infuzie. Intră în formula ceaiurilor antiastmatic și pentru gargară.

Contraindicații. Femeilor care alăptează le micșorează secreția lăctată.

CIMBRUL DE GRĂDINĂ

SATUREJA HORTENSIS L. — FAM. LABIATAE

Fr.: Sariette; G.: Bohnenkraut; M.: Csombord;

R.: Ciaber sadovii.

Plantă anuală de cultură, înaltă de 20—40 cm, ramificată tufos, cu frunze mici lanceolate, rare, flori bilabiata, roz-violacee, în verticile distanțate, dispuse la subsuoara frunzelor superioare.

Partea utilizată. Partea aeriană (Herba Saturejae) — VI—IX (2—3 recoltări).

Ecologie, zonare. Ca specie mediteraneeană, cimbrul are nevoie de temperaturi ridicate și de lumină directă, iar față de umiditate, cerințele sînt mai ridicate doar în prima perioadă de vegetație. Dă rezultate bune pe soluri afinate, ușoare sau mijlocii, permeabile. Cele mai bune condiții le are în Cîmpia de Vest, Muntenia (jud. Teleorman, Giurgiu, Prahova, Buzău, Brăila), sudul și centrul Moldovei (jud. Galați, Bacău, Neamț).

Tehnologia de cultură. **Premergătoare** — prășitoare, cereale de toamnă, leguminoase. **Ingrășăminte** — fosfor 50—60 kg/ha și potasiu 45—50 kg/ha la arătura de bază; azot 135—150 kg/ha primăvara înainte de pregătirea patului germinativ. **Pregătirea terenului** — dezmiriștire la 10—12 cm, dacă este cazul, arătură adîncă la 22—25 cm lăsată în brazdă crudă; primăvara nivelare, grăpare și lucrare cu combinatorul la 4—6 cm adîncime, apoi tăvălugire. **Însămînțare** — cu semănătoarea SUP—21 sau SUP—29 cu distribuitor de semințe mici și patinele montate la limitatoarele de adîncime, cu 4—5 kg/ha, la intervale de 50 cm între rînduri și adîncime de 1—2 cm. **Lucrări de întreținere** — erbicidare cu Afalon 7 kg/ha diluate în 600 l apă, administrat cu MET—1200, imediat după însămînțare; 1—2 prașile mecanice și 1—2 prașile manuale.

Recoltare — manual cu secera sau mecanic cu Windroverul cînd 40—50% din plante sînt îmbobocite.

Principii active. Ulei volatil, sescviterpene, tanin, mucilagii, substanțe amare.

Acțiune farmacologică. Expectoran și antiseptic; tonic-amar și stomachic; antispastic; carminativ; ușor antidiareic.

Recomandări majore. Colite de fermentație, balonări.

CULTURI



Alte recomandări. Anorexie, tulburări dispeptice; bronșite cronice; astm bronșic; contracturi nervoase ale stomacului; diaree benigne.

Mod de administrare. Infuzie (1 1/2 linguriță la cană), 1—2 cani pe zi.

ORIGANUM VULGARE L. — FAM. LABIATAE

Fr.: Origan; G.: Wohlgemut, Dost; M.: Szurokfű;
R.: Dușița abiknavennaia.

Plantă erbacee, perenă, erectă, ramificată la partea superioară, înaltă de 50—80 cm, cu tulpina roșiatică, în 4 muchii, frunze opuse, ovate, flori roz-violacee, bilabiate, dispuse terminal, în inflorescențe corimbiforme bogate.

Partea utilizată. Partea aeriană (Herba Origani) — VII—VIII.

Ecologie, răspândire. Specie cu cerințe mari față de lumină, puțin pretențioasă față de sol și umiditate, vegetează mai ales prin tăieturi și margini de păduri, tufișuri, în întreaga țară, din câmpie pînă în zona subalpină, mai ales în Transilvania și Banat (jud. Arad, Bistrița-Năsăud, Caraș-Severin, Harghita, Hunedoara, Maramureș), Oltenia (Gorj, Vilcea), Muntenia (Buzău, Giurgiu), Moldova (Bacău, Neamț, Suceava, Vaslui).

Recoltare. Se taie cu seceră, cosorul sau cuțitul partea aeriană, fără baza lignificată a tulpinii.

Principii active. Ulei volatil (cu timol, carvacrol), tanin, flavonoide, principii amare.

Acțiune farmacologică. Expectorant și sedativ al tusei; dezinfectant al căilor respiratorii superioare și digestive; antispastic; tonic-aperitiv; stomachic; stimulent general; vulnerar; tonic capilar.

Recomandări majore. Stări gripale, laringite, traheite, astm bronșic, tuse convulsivă.

Alte recomandări. INT. — Gastrite hipoacide; colite de fermentație; astenie. EXT. — Răni; eczeme; crize reumatice dureroase. COSM. — Igienă capilară.

Mod de administrare. INT. — Infuzie (1 linguriță la cană), 2—3 cani pe zi, înainte de mese ca tonic-aperitiv, după mese ca stomachic, între mese ca expectorant. EXT. — Băi locale sau cataplasme calde cu infuzie (20—30 g la litru).

Intră în formula ceaiurilor antibronșitic, sedativ și a aromatizantului pentru băi.



THYMUS SERPYLLUM L.* — FAM. LABIATAE

Fr.: Serpolet; G.: Feldthymian. Quendel;

M.: Vadkakukkfű; R.: Timian palzucii.

Subarbust de talie mică (10—30 cm), parțial tîrîtor, cu ramuri îndreptate în sus, frunze mici, alungit-ovate, opuse, inflorescențe glomerulare, cu flori mici, roșii-purpurii sau roz, bilabiate.

Partea utilizată. Partea aeriană, respectiv rămurelele înflorite (Herba Serpylli) — VI—IX.

Ecologie, răspîndire. Plantă de locuri foarte însorite, iubitoare de căldură, cu pretenții foarte reduse față de umiditate și sol, vegetează pe locuri aride, pietroase sau nisipoase, însă cu expoziție sudică și bogate în calciu. Crește în zona de deal și munte, în finețe, pe coaste aride, pietroase. Poate fi recoltată în cantități mai mari în întreaga Transilvanie, județele de deal ale Munteniei și Olteniei, Moldova (jud. Botoșani, Suceava, Neamț, Bacău, Vrancea), Dobrogea (jud. Tulcea).

Recoltare. Rămurelele înflorite se taie cu foarfeca sau cuțitul.

Principii active. Ulei volatil (cu borneol, cineol, principiu amar — serpilina).

Acțiune farmacologică. Antiseptic intestinal; carminativ; coleretic; diuretic; expectorant și calmant al centrului tusei; tonic-aperitiv și stomachic; stimulent nervos; vermifug; sedativ al durerilor; tonic capilar.

Recomandări majore. Bronșită, astm, tuse spastică, tuse convulsivă.

Alte recomandări. INT. — Dispepsii, enterocolite, balonări; anorexie; helmintiaze; astenii, anemii de primăvară. — EXT. — Dureri sciatică, reumatismale, gutoase; plăgi purulente; igiena capilară; igiena bucală.

Mod de administrare. INT. — Infuzie (1 linguriță la cană), 2—3 căni pe zi. EXT. — Băi locale cu infuzie concentrată (30—50 g la litru) care poate fi utilizată și ca apă de gură.

* În fapt este vorba de un nume generic care cuprinde numeroase specii de cimbrisor din flora spontană, printre care *Th. marschallianus* Willd., *Th. pannonicus* All., *Th. glabrescens* Willd., *Th. austriacus* Bernh., *Th. pulegioides* L., *Th. dacicus* Borb., *Th. jankae* Celak., *Th. balcanus* Borb.



Intră în compoziția ceaiurilor antiastmatic, antidiareic, pentru gargară.

Contraindicații. În dispepsii și hipopepsii grave, inhibînd activitatea enzimatică; insuficiență pancreatică.

THYMUS VULGARIS L. — FAM. LABIATAE

Fr.: Thym; G.: Garten Thymian; M.: Kerti kakukkfű;
R.: Timian abiknavennii.

Subarbust de cultură cu tufe globuloase, cu baza lignificată, înalt de 10—50 cm, tulpini numeroase, cilindrice, lemnoase și cenușii la bază, părțile tinere cu peri îndreptați în jos, frunze scurt pețiolate, opuse și mici, cu margini răsucite, păroase pe spate, flori mici rozee grupate în mici inflorescențe spiciforme la subsuoara frunzelor superioare.

Partea utilizată. Partea aeriană, respectiv partea erbacee a rămurelor (Herba Thymi vulgaris) — VI—X (2—3 recoltări).

Ecologie, zonare. Plantă de lumină puternică, necesitând locuri însorite și temperaturi ridicate, nu rezistă la înghețurile tirzii de primăvară și la curenții reci. Este puțin pretențioasă față de umiditate și sol, preferă însă pe cele ușoare. Zonele cele mai favorabile pentru cultura acestei plante sînt în Cîmpiile Olteniei (jud. Olt, Dolj), Bărăganului (jud. Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, sudul Buzăului), Burnazului, Cîmpia de Vest, precum și în zonele de cîmpie ale jud. Bacău și Neamț.

Tehnologia de cultură. Premergătoare — leguminoase, cereale de toamnă, borceag și prășitoare bine îngrășate cu gunoi de grajd. **Îngrășăminte** — fosfor 60—70 kg/ha și potasiu 40—50 kg/ha toamna la arătura de bază; azot 80—100 kg/ha în două reprize egale, primăvara după plantare și după prima recoltare; în anii II—V. toamna la ultima prășilă, fosfor și potasiu 3/4 din doza inițială, iar azot în doze egale cu primul an, la prima prășilă și după prima recoltă. **Însămînțare** — în răsadniță, în straturi calde (60 m² pentru un hectar) în februarie sau reci (150 m² pentru un hectar) în august, cu 0,350 kg/ha. **Plantare** — toamna pînă la 20 septembrie sau primăvara devreme, la 50 cm între rînduri și 20 cm între plante pe rînd. **Lucrări de întreținere** — erbicidare (în primul an, înainte de plantare, în anii II—V primăvara timpuriu) cu Gesagard 50, cu MET—1200, în doză de 5—7 kg/ha diluate în 400—600 l apă; 4—5 prășile anual; bilonare înainte de primul îngheț. **Recoltare** — în faza cînd



apar primele butoane florale, cu secera, la 10—12 cm de la pămînt.

Principii active. Ulei volatil (cu borneol, cineol, timol, carvacrol, limonen), tanin, acid cafeic, flavone, un principiu amar.

Acțiune farmacologică. Antiseptic intestinal; carminativ; coleretic; diuretic; expectorant și calmant al centrului tusei; tonic-aperitiv și stomachic; stimulent nervos; vermifug; analgezic; tonic capilar.

Recomandări majore. Bronșită, astm, tuse spastică, tuse convulsivă.

Alte recomandări. INT. — Dispepsii, enterocolite, balonări; anorexie; helmintiaze; astenii, anemii de primăvară. EXT. — Dureri sciatică, reumatismale, gutoase; plăgi purulente; igienă capilară; igienă bucală.

Mod de administrare. INT. — Infuzie (1 linguriță la cană), 2—3 căni pe zi. EXT. — Băi locale cu infuzie concentrată (30—50 g la litru) care poate fi utilizată și ca apă de gură.

Întră în compoziția ceaiurilor pectoral și contra colicilor.

Contraindicații. În dispepsii și hipopepsii grave, deoarece inhibă activitatea enzimatică; insuficiență pancreatică

CENTAURIUM UMBELLATUM GILIB. — FAM. GENTIANACEAE

Fr.: Petit centaurée; G.: Tausendguldenkraut; M.: Kiszzerjofü; R.: Zalatotisiacinik malii.

Specie erbacee anuală sau bianuală, erectă, cu tulpini în 4 muchii, ramificate la partea superioară, frunze ovale, opuse și sesile, flori roz pe tip 5 în inflorescențe terminale.

Partea utilizată. Partea aeriană. (Herba Centaurii) — VII—IX.

Ecologie, răspîndire. Specie de lumină sau semiumbră, cu cerințe mari față de umiditate, răspîndită de la cîmpie pînă în zona subalpină, în finețe și poieni umede, tufărișuri, la marginea pădurilor, mai abundentă spre zona de deal, îndeosebi în Transilvania și Banat (jud. Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș), Oltenia (Gorj, Mehedinți, Vîlcea), Muntenia (Argeș, Dîmbovița, Prahova), Moldova (jud. Suceava, Vrancea). Datorită restrîngerii bazinelor, sînt necesare lucrări de refacere a acestora.

Recoltare. În timpul înfloririi se taie cu foarfeca sau cuțitul.

Principii active. Un principiu amar (eritaurina), glicozid (eritrocentaurina), alcaloid (eritricina), rezine, gume.

Acțiune farmacologică. Stimulează secrețiile gastrointestinale; coleretic-colagog; febrifug; vermifug; vulnerar.

Recomandări majore. Gastrită hipoacidă, anorexie, digestie lentă, dispepsii.

Alte recomandări. INT. — Diskinezie biliară; colecistită; tonic pentru convalescenți și copii; stări febrile; helmintiaze. EXT. — Răni, contuzii, ulceratii.

Mod de administrare. INT. — Infuzie (1 linguriță la cană), cîte un sfert de cană înainte de mesele principale; tinctură (20 g de plantă macerate 8 zile în 100 ml alcool), cîte 30 picături înainte de mese. EXT. — Cataplasme cu infuzie concentrată (2 linguri la cană). Intră în formula ceaiurilor tonic-aperitiv și gastric 2.



VALERIANA OFFICINALIS L. — FAM.
VALERIANACEAE

Fr.: Valériane; G.: Baldrian; M.: Mezei macskagyökér;
R.: Valeriana lekarstvennaia.

Valeriana sau odoleanul este o specie ierbacee perenă, din flora spontană, dar care este mai ales cultivată, inițial cu o rozetă de frunze, apoi cu tulpină erectă, neramificată, cu frunze tulpinale opuse, imparipenat sectate cu 5—11 perechi de lacinii lanceolate, păroase mai ales pe spate și la bază, cu pețiole din ce în ce mai scurți de la bază spre vîrf, flori în inflorescențe terminale dense, asemănătoare cu o umbelă, flori mici de 4—5 mm, asimetrice, roșii-liliachii pînă la alb.

Partea utilizată. Rizomii cu rădăcinile (Radix Valerianae) — III—IV și X—XI.

Ecologie, răspîndire, zonare. În flora spontană, unde cantitățile recoltabile sînt reduse, crește în tufărișuri, păduri, locuri umede și umbroase, la marginea apelor, în lunci și zăvoaie, în zona de deal și munte.

În cultură este mai bine adaptată la temperaturi mai scăzute, are pretenții ridicate față de umiditate și lumină (suportă cel mult semiumbra). Preferă solurile profunde, ușoare, bogate în humus, permeabile. Zonele foarte favorabile se găsesc în Cîmpia Timișului și, în special, a Crișurilor (jud. Bihor), Podișul Transilvaniei, depresiunile din jud. Bistrița-Năsăud, Mureș, Harghita, Covasna, Țara Birsei, iar zone favorabile nordul Moldovei (jud. Suceava, Botoșani, Neamț).

Tehnologia de cultură. Premergătoare — cereale de toamnă, prășitoare și culturi furajere pentru masă verde. **Ingrășăminte** — fosfor 60—70 kg/ha și potasiu 50—60 kg/ha la arătura de bază; azot 30—40 kg/ha la pregătirea patului germinativ. **Pregătirea terenului** — arătură la adîncimea de 25—28 cm, menținerea terenului curat de buruieni, lucrare apoi cu discul în agregat cu grapa cu colți reglabili și nivelatorul. **Însămînțare** — în luna august cu semănătoarea SUP—21 cu distribuitor pentru semințe mici și limitator de adîncime, la interval de 50 cm și adîncime de 0,3—0,5 cm, cu norma de 3—4 kg/ha.



Lucrări de întreținere — prașilă oarbă între rînduri, rîrit primăvara cînd plantele au 2—4 frunze și 4—6 cm înălțime, 2—3 prașile manuale și tot atîtea mecanice.

Recoltare — cu plugul fără cormană sau cu dislocatorul de sfeclă; rizomii se scutură de pămînt cu furca, se despică în 6—8 părți, se trec într-un curent de apă, apoi se trec la uscat.

Principii active. Ulei volatil, alcaloizi, acizii cafeic și clorogenic, sescviterpene.

Acțiune farmacologică. Sedativ de bază al sistemului nervos central, ca și al celui autonom al inimii; antispastic; antivomitiv.

Recomandări majore. Afecțiuni cardiace cu substrat nervos (aritmii, palpitații).

Alte recomandări. Stări de nervozitate, anxietate; insomnii; colici stomacale de natură nervoasă; stări de astm; vomă.

Mod de administrare. Infuzie (1 linguriță la cană) care se bea treptat în cursul zilei sau seara la culcare; pulbere, de 3 ori pe zi cîte un vîrf de cuțit; tinctură (20 g macerate 8 zile în 100 ml alcool), de 2—3 ori pe zi cîte 15—20 picături.

Intră în formula ceaiurilor calmant, sedativ, gastric, calmant al tulburărilor cardiace.

ARCTIUM LAPPA L. — FAM. COMPOSITAE

Fr.: Bardane; G.: Klette; M.: Bojtorján; R.: Lopuh balşoi.

Specie erbacee bianuală, în primul an are numai frunze foarte mari în rozetă pornind direct din rădăcini, iar în anul II tulpini florifere puternice, la bază cu frunze mai mari în rozetă, pe tulpină mai mici; florile sînt de culoare purpurie, grupate în antodii globuloase în diametru de 3—4 cm, cu involucru avînd ţepi cu vîrful întors.

Partea utilizată. Rădăcinile (Radix Bardanae) — III—IV (de la plante de 2 ani) şi X—XI (de la plante de 1 an).

Ecologie, răspîndire. Plantă caracteristică pentru terenuri necultivate, brusturele creşte pe lîngă drumuri, căi ferate, garduri, de la cîmpie pînă în zona montană, rezistă la secetă şi temperaturi extreme.

Recoltare. Rădăcinile se scot cu cazmaua, se spală imediat, se curăţă de părţile aeriene, se despică în 2 sau 4 pentru a se usca mai uşor.

Principii active. Inulină, ulei volatil, săruri de potasiu, acid cafeic, vitamine din grupa B.

Acţiune farmacologică. Depurativ (prin cumulară proprietăţilor diuretice şi sudorifice); hipoglicemiant; coleretic-colagog; tonic capilar; dezinfectant.

Recomandări majore. Dermatoze (acnee, furunculoză, eczeme); diabet.

Alte recomandări. INT. — Calculoză biliară, diskinezie; afecţiuni renale. EXT. — Dermatoze; igienă capilară, seboree; plăgi infectate.

Mod de administrare. INT. — Infuzie (1—2 linguriţe la cană, 2—3 cani pe zi). EXT. — Decoct (2—3 linguri la 1/2 l apă) pentru spălat rănilor şi fortifierea părului; tinctură (20 g macerate 8 zile în 100 ml alcool) ca tonic capilar (se poate adăuga 1 lingură de oţet).



CYNARA SCOLYMUS L. — FAM. COMPOSITAE

Fr.: Artichaut; G.: Artischocke; M.: Articsóka;
R.: Ținara.

Plantă de cultură biennială sau perenă, viguroasă (înaltă pînă la 2 m) și puternic ramificată, cu frunze mari, adînc divizate, spinoase, albicioase, flori în capitule mari, roșii-violacee, involucrul avînd 4—5 rînduri de foliole ghimpoase.

Partea utilizată. Frunzele (Folium Cynarae) — VI—IX (2—4 recoltări).

Ecologie, zonare. Anghinarea este sensibilă la temperaturi scăzute (nu rezistă sub 0° cu solul descoperit), preferă soluri adînci, bogate, cu reacție neutră, permeabile, cu umiditate suficientă, are pretenții ridicate față de umiditatea atmosferică. Cu bune rezultate poate fi cultivată în sudul țării (jud. Ialomița, Giurgiu, Teleorman, Olt, Dolj, Buzău, Brăila), Cîmpia de Vest (Timiș). Se poate cultiva în scopuri medicinal-ornamentale în parcuri și grădini.

Tehnologia de cultură. Premergătoare — prășitoare, leguminoase, cereale de toamnă. **Ingrășăminte** — fosfor și potasiu cîte 50—60 kg/ha la arătura de bază; azot 70—75 kg/ha primăvara, înainte de semănat. **Pregătirea terenului** — după premergătoare timpurii se trece cu grapa cu discuri în agregat cu grapa cu colți reglabili, apoi se efectuează arătura de bază la adîncimea de 28—30 cm (după premergătoare tîrzii numai arătura de bază); primăvara, grăpat, nivelat, afinare cu discul, grapa și combinatorul. **Însămînțare** — primăvara, după trecerea brumelor tîrzii, cu semănătoarea SPC-6 la 70 cm interval și 3—4 cm adîncime, cu 4—5 kg/ha. **Lucrări de întreținere** — prăsit imediat după răsărire, rărit cînd plantele au 2—3 frunze adevărate la distanța de 25 cm plantă de plantă, apoi prașile de cîte ori este nevoie (obligatoriu după fiecare recoltare); erbicidare, folosind MET-1200 cu Treflan 6 l/ha diluat în 400—600 l apă administrat înainte de semănat și bine distribuit pe întreg terenul. **Recoltare** — cu secera, cu atenție pentru a nu vătăma inima plantei.

Principii active. Cinarină, acid clorogenic, polifenoli, flavonozide, principiu amar (cinaropicrina), mucilagii, taninuri, acizi organici, săruri de potasiu și magneziu.



Acțiune farmacologică. Coleretic-colagog; hepatoprotector; stimulează metabolizarea colesterolului în ficat; diuretic; tonic-aperitiv; stomachic; depurativ; hipoglicemiant. **Recomandări majore.** Diskinezie, colecistită, insuficiență biliară, hepatite, ciroze.

Alte recomandări. Hipercolesterolemie, ateroscleroză; nefrite; edeme cardiorenale; constipație, în special datorată insuficienței biliare; anorexie; dispepsie; enterite, colite; urticarii, prurit; diabet.

Mod de administrare. Infuzie (1 lingură la 500 ml apă) care se bea într-o zi: o cană dimineața, înainte de masă, stîndu-se culcat 20—30 minute pe partea dreaptă, restul cu 30 minute înaintea meselor principale. Se fac cure de 20—30 zile, cu 30 de zile pauză. Intră în formula ceaiurilor hepatic și gastric stimulent.

SILYBUM MARIANUM (L.) GÄRTN. — FAM. COMPOSITAE

Fr.: Chardon Marie; G.: Mariendistel; M.: Máriatövis; R.: Silibum.

Plantă erbacee de cultură, anuală sau bianuală, înaltă de 1—1,5 m, cu frunze și inflorescență ghimpoase, cu frunze alterne, sesile, alungit-ovate și marmorate cu alb, nervura principală și cele secundare terminându-se cu un ghimpe, flori tubuloase, roșii, grupate în antodii mari, ghimpoase.

Partea utilizată. Fructele (Fructus Cardui mariani) — VIII.

Ecologie, zonare. Datorită originii mediteraneene, armurariul are pretenții ridicate față de temperatură, însă moderate față de umiditate și sol (contraindicate cele grele sau pe care stagnează apa). Este indicată cultivarea în sudul Munteniei (jud. Ialomița, Giurgiu, Teleorman), al Olteniei (jud. Olt, Dolj), Dobrogei (jud. Constanța), Cîmpiei de Vest (jud. Timiș).

Tehnologia de cultură. Premergătoare — leguminoase pentru boabe, prășitoare, cereale de toamnă. **Îngrășămint** — fosfor 50—60 kg/ha și potasiu 40—50 kg/ha toamna la arătura de bază; azot 80—100 kg/ha primăvara, pe zăpadă. **Pregătirea terenului** — arătură la 22—25 cm adâncime, menținerea curată a terenului de buruieni; primăvara, lucrări cu combinatorul și nivelatorul.

Însămînțare — primăvara, în mustul zăpezii, cu SPC-6, norma fiind de 10 kg/ha, la 62,5 cm interval și 3—4 cm adâncime. **Lucrări de întreținere** — plivit imediat ce plantele se disting bine, rărit la 8—12 cm când ajung la 3—4 cm înălțime, prașilă de 1—2 ori manual și mecanic, erbicidare cu Lasso înainte de semănat cu MET-1200, incorporat la adâncimea de 4—5 cm, câte 8 l/ha cantitate diluată în 600 l apă. **Recoltare** — cu combina C 12 când 80% din inflorescențe sînt uscate.

Principii active. Silimarină (derivat fenolic), saponozide, fitomelane, acid fumaric.

Acțiune farmacologică. Hepatoprotector și hepatoregenerator; stimulează creșterea tensiunii arteriale prin acțiune asupra suprarenalei; tonic-amar.

Recomandări majore. Hepatite, ciroze, stări inflamatorii și de suprasolicitare a ficatului.



Alte recomandări. Hipotensiune; digestie dificilă.

Mod de administrare. Infuzie (1—1 1/2 linguriță de fructe măcinate la cană), 2 cani pe zi: prima înainte de micul dejun, după care se stă culcat 20—30 minute pe partea dreaptă, a doua în două reprize, cu 30 minute înaintea meselor principale; cure de 15—20 zile cu pauză 15 zile.

Contraindicații. Hipertensiune.

5. PLANTE CU FLORI ALBASTRE SAU VIOLETE

A. COROLA CU PETALE LIBERE



B. COROLA CU PETALE UNITE



GLYCYRRHIZA GLABRA L. — FAM. LEGUMINOSAE

Fr.: Réglisse, Bois doux; **G.:** Süssholz; **M.:** Édesgyökér; **R.:** Salodka golaia.

Subarbust din flora spontană, dar care este și cultivat pentru proprietățile sale farmaceutice, înalt pînă la 1,5 m, avînd aspect de tufă, cu frunze imparipenat compuse din 5—9 perechi de foliole ovate sau lat-eliptice, flori papilionate, albastre-violet, în raceme alungite care pornesc de la subsuoara frunzelor.

Partea utilizată. Rădăcinile (Radix Liquiritiae) — III—V și IX—XI.

Ecologie, răspîndire, zonare. Principala cerință a acestui arbust este căldura, solicitînd o temperatură ridicată și locuri ferite de vînturi puternice; cele mai potrivite soluri sînt cele ușoare, nisipoase (putînd fi folosit ca antierozional sau pentru fixarea nisipurilor). Specie de lumină sau semiumbră, din regiuni joase, crește în albiile părăsite ale unor riuri, în buruienișuri, locuri necultivate, doar în cîteva părți ale jud. Vrancea, Brăila. Se recomandă a fi cultivat în nisipurile din Delta Dunării, din sudul Olteniei, ca și în zonele de răspîndire naturală.

Tehnologia de cultură. Premergătoare — cereale de toamnă sau prășitoare care eliberează devreme terenul.

Îngrășămintă — fosfor 40—60 kg/ha, potasiu 30—40 kg/ha și gunoi de grajd 25—30 t/ha încorporate toamna; azot 40—50 kg/ha primăvara pe zăpadă. **Pregătirea terenului** — păstrarea terenului curat de buruieni, arătură adîncă de toamnă (desfundare) la adîncimea de 35—40 cm, urmată de lucrare cu cultivatorul.

Însămînțare — cu 3—4 kg/ha sămînță la 100 cm interval și 2,5—3 cm adîncime; prin plantare de stoloni (fragmente de rizomi) primăvara, devreme, la 100 cm interval între rînduri, 30—40 cm distanță pe rînd și 10—12 cm adîncime. **Lucrări de întreținere** — 2—3 prașile manuale și tot atîtea mecanice, în fiecare an de cultură. **Recoltare** — în anul III de cultură, toamna după încetarea vegetației sau primăvara devreme, numai rădăcinile secundare și rizomii laterali care se scutură de pămînt, se spală și se despică longitudinal în 2—4 bucăți, după care se trec la uscare.



Principii active. Glicirizină, flavonoide, hormon estrogen steroic, vitamine din grupa B.

Acțiune farmacologică. Fluidificarea secrețiilor traheobronhice și faringiene; diuretic; antispasmodic; antiinflamator și antiulceros; acțiune estrogenă; laxativ prin influențarea motilității gastrointestinale.

Recomandări majore. Gastrită hiperacidă, ulcer gastric.

Alte recomandări. Bronșite, traheite, faringite, tuse de diferite etiologii; afecțiuni urinare (inclusiv colici renale); reumatism; constipație; stimularea organelor și caracterelor sexuale secundare.

Mod de administrare. Macerat (1/2 linguriță la cană) care se bea în cursul zilei; pulbere 1—3 g pe zi. Intră în formula pulberii laxativ-purgative.

LINUM USITATISSIMUM L. — FAM. LINACEAE

Fr.: Lin; G.: Lein; M., R.: Len.

Specie ierboasă, cultivată în primul rând pentru fibră sau pentru ulei, cu tulpina înaltă de 60—100 cm, ramificată de la bază (la inul pentru ulei) sau numai terminal (la inul pentru fuior), frunze alterne, lanceolate, lungi de 2—3 cm și late doar de 2—3 mm, cu 3 nervuri paralele, flori albastre-azurii, pe tip 5, câte 10—15 în dicazii terminale.

Partea utilizată. Semințele (Semen Lini) — VIII—IX, folosite ca atare sau sub formă de făină (Farina Lini).

Ecologie, răspîndire. Inul are cerințe ecologice comune, găsind condiții bune în cea mai mare parte a țării. Are nevoie de mai multă umiditate, uscîndu-se printre primele plante în timpul secetelor prelungite. Se dezvoltă mai bine pe soluri ușoare sau mijlocii, afinate, aerisite, profunde, permeabile, bine structurate, bogate în humus, cu reacție ușor acidă.

Tehnologia de cultură. Premergătoare — lucernă, trifoi.

Îngrășămintă — fosfor 50—60 kg/ha și 25—30 kg/ha potasiu la arătura de bază; azot 30—40 kg/ha primăvara, înaintea lucrării cu cultivatorul sau combinatorul.

Pregătirea terenului — arătură de toamnă la adîncimea de 28—30 cm, lăsată în brazdă crudă; primăvara se discurie și apoi se aplică lucrarea cu cultivatorul în agregat, cu grapa reglabilă. **Însămînțare** — primăvara timpuriu la 12,5 cm interval și 2—3 cm adîncime, cu 60 kg semințe la ha. **Lucrări de întreținere** — tăvălugit imediat după însămînțare, plivit ori de câte ori este nevoie. **Recoltare** — cu combina C 12 cînd 85% din semințe au culoarea cafenie.

Principii active. Mucilagii, lipide, protide, heterozid cianogenetic-linamarozidul, săruri de potasiu și magneziu.

Acțiune farmacologică. Semințele au acțiune laxativă; anticatarală; antilitiazică renală; făina: maturativă; emolientă; antiinflamatoare.

Recomandări majore. Semințele în constipații, iar făina în tratarea abceselor, furunculelor.

Alte recomandări. INT. — Semințe: catar gastrointestinal și respirator; litiază renală, nefrite, cistite. EXT. — Făina: cistite; atenuarea acțiunii iritante a făinii de muștar (în sinapisme); eczeme; panariți.



Mod de administrare. INT. — Semințe: ca atare în scop laxativ (1—2 linguri între mese sau seara la culcare) sau macerat la rece (1 lingură la cană, timp de 6—8 ore, 2—3 cani pe zi); în cataruri — infuzie (1 linguriță la cană, putîndu-se adăuga suc de lămîie). EXT. — Făina: cataplasme cu pastă de făină frecată cu apă caldă; băi calde locale în cistite (2—4 linguri la 1/2 l apă).

ERYNGIUM PLANUM L. — FAM. UMBELLIFERAE

Fr.: Panicaut plane; G.: Flachblättrige Männertreu;
M.: Kék iringó; R.: Sinegolovnik ploskalistnii.

Plantă erbacee perenă, avînd o nuanță albastrui-vineție, ghimpoasă, ramificată la partea superioară, cu frunze rigide, întregi la bază, cele superioare fiind mai mici și palmat-sectate, flori în capitule terminale albastrui. Partea utilizată. Partea aeriană (Herba Eryngii plani) — VII—IX.

Ecologie, răspîndire. Plantă întîlnită în pășuni și finețe, locuri necultivate (răzoare, margini de drumuri și căi ferate). Crește numai în lumină directă, pe soluri ușoare, nisipoase, cu cerințe moderate față de umiditate. Altitudinal vegetează din zona de cîmpie pînă în zona de deal (500—600 m). În cantități recoltabile se găsește mai ales în Transilvania (jud. Arad, Bistrița-Năsăud, Brașov, Cluj, Harghita, Hunedoara, Mureș, Sibiu), Banat, nordul Moldovei (jud. Botoșani).

Recoltare. Planta se taie cu cuțitul sau secera de la bază, cu tot cu frunzele bazale, apucîndu-se cu o mînușă groasă; se poate tăia și cu sapa.

Principii active. Saponozide triterpenice (saniculasaponozida).

Acțiune farmaceutică. Emolient și expectorant extrem de activ, antitusiv și antispastic; diuretic.

Recomandări majore. Tuse de diferite etiologii, inclusiv tuse convulsivă, bronșită, astm.

Alte recomandări. Afecțiuni urinare.

Mod de administrare. Infuzie sau decoctie scurtă (1 linguriță la cană) care se bea în cursul unei zile, în mai multe reprize.



IRIS GERMANICA L. — FAM. IRIDACEAE.

Fr., G.: Iris; M.: Liliom; R.: Kasatik ghermanskii.

Stînjenele este o specie erbacee, perenă, cultivată mai ales în scop ornamental, cu frunze radicale enziforme (în formă de sabie), tulpină floriferă viguroasă, flori violete, asimetrice, pe tipul 3, dispuse spre vârful tulpinii. **Partea utilizată.** Rizomii (Rhizoma Iridis) — III—IV și X—XI.

Ecologie, răspindire, zonare. Plantă cu cerințe modeste, vegetează în lumină directă, dar și la semiumbră, pe soluri variate (evitându-se cele pe care stagnează apa) rezistă bine la ierni reci, dar se dezvoltă foarte bine în condiții de climă blândă și veri călduroase. Poate fi cultivat în întreaga țară, de preferat în zonele sudice.

Tehnologia de cultură. Premergătoare — culturi ce eliberează devreme terenul și-l lasă curat de buruieni. **Îngrășămintă** — 80 kg/ha fosfor la arătura de bază, 30 kg/ha azot la desprimăvărare. **Pregătirea terenului** — arătura adâncă la 28—30 cm, lucrare cu combinatorul, înaintea plantatului. **Plantare** — toamna devreme, la 50 cm interval, 25 cm între plante pe rând, 10—12 cm adâncime, cu 800 kg rizomi fasonați la hectar. **Lucrări de întreținere** — grăpat după plantare, 2—3 prașile mecanice și manuale anual; în zonele cu temperaturi mai ridicate toamna, în anul II și III, se bilonează. **Recoltarea** — în toamna anului III de cultură cu plugul fără cormană; rizomii se scutură de pământ, se spală, se despică sau se taie în felii.

Principii active. Ulei volatil cu ironă, heterozid flavonic (iridozid), tanin, mucilagii.

Ațiune farmacologică. Expectorant (în doze mici); purgativ drastic (în doze mari); vomitiv.

Recomandări majore. Bronșită (în faza de coacțiune).

Alte recomandări. INT. — Constipații acute; provocarea vomiei în caz de intoxicații. EXT. — Mestecarea rizomilor de către copiii mici le ușurează creșterea dinților.

Mod de administrare. INT. — Decoct (1 linguriță la cană ca pectoral, 2 lingurițe la cană ca purgativ) câte 2 căni pe zi. EXT. — Mestecarea unor fragmente de rizomi.



SYMPHYTUM OFFICINALE L. — FAM.
BORAGINACEAE

Fr.: Consoude; G.: Beinwell; M.: Fekete nádálytő;
R.: Akopnik lekarstvennii.

Plantă ierboasă perenă, robustă, cu peri aspri pe întreaga suprafață, tulpină cu muchii aripate, frunze opuse, mari, alungite, decurente (care se prelungesc pe tulpină), foarte aspre, flori roșii-violacee, pe tip 5, tubuloase, grupate în cime scorpioide (inflorescențe în forma unei cozi de scorpion).

Partea utilizată. Rădăcinile (Radix Symphyti) — III—V și IX—XI.

Ecologie, răspândire. Plantă de locuri deschise, tătăneasa crește mai ales pe soluri grele, argiloase, pe care stagnează apa, de la cîmpie pînă în zona montană inferioară, pe marginea apelor, prin șanțuri, locuri bălțite, zăvoaie, lunci, adesea pe soluri crude de la excavații, sau ca buruiiană de cultură. Cele mai mari cantități pot fi recoltate în jud. Cluj și Sălaj.

Recoltare. Cu sapa sau cazmaua, iar dacă bazinul este dens, chiar cu plugul; ca buruiiană de culturi se recoltează din brazdă după arătură. Se spală bine înainte de a fi pusă la uscat.

Principii active. Alantoină, mucilagii, glicozide, tanin, colină, ulei volatil.

Acțiune farmacologică. Cicatrizant, antiinflamator; expectorant; antidiareic; antihemoragic.

Recomandări majore. Gastrite hiperacide, ulcere gastrice și duodenale.

Alte recomandări. INT. — Bronșite și alte cataruri respiratorii; diaree benigne, enterite; hemoptizii, hemoragii interne. EXT. — Ulcer varicos; fisuri anale și ale sînilor; arsuri; inflamații articulare; retragerea proceselor inflamatorii.

Mod de administrare INT. — Decoct (1—2 lingurițe la cană), 2—3 căni pe zi, între mese. EXT. — Spălături locale, cataplasme cu macerat la rece sau decoct concentrat (4—5 linguri la cană).

Intră în formula ceaiurilor gastric calmant și gastric cicatrizant.



LAVANDULA ANGUSTIFOLIA MILL. — FAM. LABIATAE


Fr.: Lavande; G.: Lavendel; M.: Szagos levendula;
R.: Lavanda kalasovaia.

Semiarbust de cultură, formînd tufe globuloase verzi-cenușii înalte de 30—100 cm, cu frunze opuse, întregi, liniare, verzi-cenușii datorită perilor, flori labiate violet-albăstrui, grupate în inflorescențe terminale cu aspect de spic lung de 3—7 cm.

Partea terminală. Florile (Flores Lavandulae) — VI—VII
Ecologie, zonare. Plantă care are nevoie de temperaturi ridicate, levănțica rezistă la ger doar în perioada de repaus și acoperită cu zăpadă; solicită lumină directă; puțin pretențioasă față de umiditate și sol, vegetează și pe cele aride, dar bogate în calciu. Nu suportă solurile cu exces de umiditate sau pe care stagnează apa. Se recomandă a fi cultivată în Cîmpia de Vest, Cîmpia Olteniei, Cîmpia Burnazului, Bărăgan, cîmpia și zona colinară a Dobrogei, Subcarpații de curbură și meridionali.

Tehnologia de cultură. Premergătoare — plante furajere și prășitoare care eliberează terenul devreme și-l lasă curat de buruieni. **Ingrășăminte** — 70—90 kg/ha fosfor și 150—200 kg/ha potasiu la arătura de bază la înființarea culturii și 85—100 kg/ha azot primăvara, înaintea pornirii în vegetație; anual între rînduri, primăvara, 25—45 kg/ha azot, iar toamna 45—70 kg/ha fosfor.

Pregătirea terenului — discuire în ambele sensuri, arătura de desfundare la 45—50 cm adîncime, nivelare, pichetare. **Înmulțire** — a) **prin butășire** — cu butași de 7—8 cm lungime, recoltați toamna după încetarea vegetației, cu baza lignificată, cu tăietură până; se țin 1—2 ore într-un vas cu apă, apoi se plantează în nisip la 10 cm interval și 5 cm distanță; în toamna anului următor, se plantează la locul definitiv sau în școală, în funcție de dezvoltarea butașului; b) **prin despicarea tufelor** — obținîndu-se 70—140 butași direct înrădăcinăți prin tăierea, toamna, a părții aeriene la 8—10 cm și acoperirea cu pămînt, în toamna următoare putîndu-se face despărțirea; butașii astfel obținuți se plantează în nisip, după care se procedează identic; c) **prin răsad** — după metodele generale, cu un necesar la hectar de 200



mp straturi calde sau 500 mp straturi reci, cu 10 kg sămință. **Plantare** — la intervale și distanțe de 100 cm, la adîncime de 12—15 cm, rămînînd afară doar 4—6 cm. **Lucrări de întreținere** — 3—4 prașile mecanice și tot atîtea manuale, bilonare toamna tîrziu, iar primăvara, după trecerea pericolului de îngheț, desfacerea bilonului. **Recoltare** — cu secera, cînd 25% din flori sînt deschise. **Principii active.** Ulei volatil (cu cca 50% acetat de linalil), tanin, un principiu amar. **Acțiune farmacologică.** Sedativ nervos; diuretic; coleretic-colagog; febrifug; antispasmodic; antiseptic și cicatrizant. **Recomandări majore.** Hiperexcitabilitate, migrene, insomnii. **Alte recomandări.** INT. — Afecțiuni cardiace cu substrat nervos; afecțiuni renale (inclusiv colică renală); reumatism; diskinezie biliară; răceală, gripă; tuse cu accese prelungite, astm. EXT. — Băi sedative; plăgi. **Mod de administrare.** INT. — Infuzie (1 linguriță la cană). 2—3 căni pe zi, dintre care ca sedativ una cu 30 minute înainte de culcare. EXT. — Băi cu infuzie (20—30 g la litru); fricțiuni cu oțet aromat (30—40 g macerate 7 zile în 1 l oțet). Intră în formula aromatizantului pentru băi și a produselor cosmetice Floriten 1 și 2.

DRACOCEPHALUM MOLDAVICA L. — FAM. LABIATAE.

Fr.: Mélisse turque, Mélisse de Moldavie; G.: Türkische Melisse; M.: Kerti sárkányfü; R.: Zmeegalovnik moldavskii.

Plantă anuală de cultură, cu miros plăcut de lămâie, ramificată, cu frunze alungite și dințate, flori bilabiate albastre-violacee la subsuoara frunzelor dinspre vârful ramurilor, avînd aspectul unor spice alungite.

Partea utilizată. Partea aeriană (Herba Dracocephali) — VII—IX.

Ecologie, zonare. Specie de lumină, cu cerințe mai moderate față de căldură în prima parte a vegetației, dar la înflorire solicitînd temperaturi ridicate. Față de umiditate, dimpotrivă, cerințele sînt mai mari în primele faze. Preferă soluri ușoare, bogate în humus și permeabile. Condițiile respective sînt îndeplinite în Cîmpia Bărăganului, Dobrogei, sudul Moldovei și Cîmpia de Vest.

Tehnologia de cultură. Premergătoare — prașitoare îngrășate care eliberează devreme terenul, leguminoase (contraindicat după plante oleaginoase sau oleo-eterice).

Îngrășămintă — 30—40 kg/ha fosfor încorporat la arătura de toamnă, 30—40 kg/ha azot înainte de semănat sub combinator. **Pregătirea terenului** — arătură adîncă la 28—30 cm, primăvara lucrare cu combinatorul și grapa cu colți reglabili. **Însămînțare** — primăvara cu semănătoarea SUP-21 prevăzută cu dispozitiv pentru semințe mici, la intervale de 50 cm și adîncime de 1—1,5 cm, cu 3 kg sămînță la hectar. **Lucrări de întreținere** — 3—4 prașile mecanice, 1—2 prașile manuale și plivit.


Recoltare — la începutul înfloririi cu Windroverul sau manual cu secera sau coasa, la 8—10 cm de la colet; a doua recoltare la interval de 45—50 de zile.

Principii active. Ulei volatil (bogat în citral, acetat de geranil), substanțe amare, tanin, acid cafeic.

Acțiune farmacologică. Antispastic; carminativ; coleretic-colagog; stimulent al digestiei.

Recomandări majore. Colite spastice, balonări.

Alte recomandări. Diskinezie biliară; dispepsii, atonie gastrică.



Mod de administrare. Infuzie (1 linguriță la cană), 1—2 căni pe zi, după mesele principale. Intră în compoziția ceaiului gastric calmant.

HYSSOPUS OFFICINALIS L. — FAM. LABIATAE

Fr.: Hysope; G.: Ysop; M.: Izsóp; R.: Issop.

Subarbust de cultură cu aspect tufos, lignificat la bază, înalt pînă la 60—80 cm, cu tulpini muchiate, frunze opuse, liniar-lanceolate, lungi de 2—4 cm și înguste de 2—8 mm, aproape sesile, glabre, flori albastre, roz sau albe, cu staminele mult ieșite în afară, cu ambele buze puternic răsfrînte și adînc divizate, grupate în inflorescențe spiciforme, alcătuite din dichazii cu cîte 7—9 flori așezate la subsuoara frunzelor superioare.

Partea utilizată. Partea aeriană (Herba Hyssopi) — VI—IX (2—3 recoltări).

Ecologie, zonare. Isopul este o plantă cu temperament de lumină; are cerințe mari față de căldură, dar rezistă și la geruri aspre dacă solul este acoperit, este puțin pretențios față de umiditate (mai ales în anul II) și sol, putînd fi folosit și pentru lucrări antierozionale, fixarea nisipurilor mobile, taluzurilor. Fiind o plantă ornamentală se recomandă a fi cultivată în parcuri și spații verzi, îndeosebi în Oltenia (jud. Dolj, Olt), Muntenia (jud. Giurgiu, Teleorman, sudul jud. Buzău și Prahova), Cîmpia de Vest.

Tehnologia de cultură. Premergătoare — leguminoase pentru boabe, cereale de toamnă. **Îngrășămintă** — 60—80 kg/ha fosfor și 30—40 kg/ha potasiu încorporate la arătura de toamnă, 50—70 kg/ha azot dat primăvara.

Pregătirea terenului — 1—2 discui, arătură adîncă la 28—30 cm, în pragul iernii, lucrări grădinărești cu combinatorul și nivelare. **Însămînțare** — cu semănătoarea SUP-21 sau SUP-29 echipată cu distribuitor pentru semințe mici, la 50 cm interval și 2—3 cm adîncime, cu 8—10 kg sămînță la hectar. **Lucrări de întreținere** — plivit imediat ce se observă rîndurile, 2—3 prașile mecanice și tot atîtea manuale în fiecare an de vegetație, pînă în anul V; după fiecare recoltare se prașește mecanic între rînduri. **Recoltare** — la 8—12 cm de la colet, cînd plantele au 10—12% flori, cu Windroverul; se repetă de 2—3 ori la intervale de 45—50 de zile.

Principii active. Ulei volatil, flavone, substanțe amare, tanin.

Acțiune farmacologică. Expectorant foarte activ; tonic amar; hipotensor; antilitiazic; antiseptic și cicatrizant.



Recomandări majore. Bronșite (inclusiv în cele cu senzații de sufocare), astm.

Alte recomandări. INT. — Anorexie; hipertensiune; calculoză renală și biliară. EXT. — Răni (inclusiv cele purulente).

Mod de întrebuințare. INT. — Infuzie (1 linguriță la cană), 2—3 cani pe zi. EXT. — Băi sau comprese cu infuzie concentrată (1 lingură la 100 ml apă). Intră în formula ceaiurilor antiastmatic, pectoral, sudorific.

MENTHA PIPERITA (L.) HUDS. — FAM. LABIATAE

Fr.: Menthe poivrée; G.: Pfefferminze; M.: Borsos menta;
R.: Miata perecinaia.

Menta este o plantă perenă de cultură cu miros aromat caracteristic, înaltă de 50—120 cm, puternic ramificată chiar de la bază, tulpina în 4 muchii evidente, cu frunze opuse, oval-lanceolate, flori violacee asimetrice, cu 4 lobi din care unul mai mare, grupate într-o inflorescență spiciformă alcătuită la rîndul ei din mai multe cime.

Partea utilizată. Frunzele (Folium Menthae) — VII—IX (2 recoltări).

Ecologie, zonare. Temperatura ridicată este factorul determinant al conținutului în ulei volatil al mentei. Este o specie de lumină, cu cerințe ridicate față de umiditate pînă la butonizare, dar, după prima recoltare, excesul acesteia (mai ales apa care stagnează) îi este dăunător. Se dezvoltă optim pe soluri ușoare, afinate, bogate, fiind foarte bune cele aluvionare, turboase sau cele din locuri desecate. Zone foarte favorabile: Cîmpia de Vest, a Olteniei (jud. Olt, Dolj), Burnazului, Bărăganului, Dobrogei; zone favorabile: Țara Birsei (partea de est a jud. Brașov și cea de vest a jud. Covasna), sudul și centrul Moldovei (jud. Galați, Vrancea, Bacău, Neamț).

Tehnologia de cultură. Premergătoare — borceaguri pentru fin, leguminoase pentru boabe, cereale de toamnă, prășitoare neoleginoase, legume timpurii. **Îngrășăminte** — fosfor — 50—80 kg/ha și potasiu 35—50 kg/ha la arătura de bază; azot 50—60 kg/ha la desprîmăvărare, pe zăpadă. **Pregătirea terenului** — discuire la 10—12 cm și arătură de bază la adîncimea de 28—30 cm; înaintea plantării nivelare și lucrare cu combinatorul. **Plantare** — toamna, în ultima decadă a lunii septembrie, cu 1000—1200 kg/ha stoloni fasonați, așezați orizontal în șir continuu, în rigole, la intervale de 70 cm și adîncimea de 12—15 cm (numai cînd condițiile nu o permit, toamna, se poate face și primăvara). **Lucrări de întreținere** — erbicidare cu Gesagard 50; lucrare cu cultivatorul între rînduri la 8—10 cm adîncime, imediat după răsărire, plivit, 4—5 prașile. **Recoltare** — manual prin strujire pentru obținerea unui produs de calitate superioară; recoltarea întregii



părți aeriene la 7—8 cm de la sol. După uscare, prin prelucrare, se obține spărtură de frunză.

Principii active. Ulei volatil cu mentol, tanin, flavonoide, polifenoli, principii amare.

Acțiune farmacologică. Stimulent general al funcției digestive; antiseptic intestinal; antidiareic; antispasmodic; antivomitiv; carminativ; coleretic-colagog; nervin; diuretic și antilitiazic; antitusiv.

Recomandări majore. Diaree (îndeosebi la sugari); colici intestinale.

Alte recomandări. INT. — Atonia stomacului („stomacuri lenese”); vomă (gravide, rău de mare, rău de înălțime); balonări, aerofagie; diskinezie, litiază biliară; afecțiuni renale, inclusiv litiază; astenii fizice și nervoase; tuse de diferite etiologii. EXT. — Debilitate, astenie; dureri reumatice; urticarii; răgușeală, guturai.

Mod de administrare. INT. — Infuzie (1—2 lingurițe la cană), 1—2 căni pe zi; ca antivomitiv se bea rece și în înghițituri mici. EXT. — Băi tonice (cu 2 litri infuzie concentrată, cu 30—40 g la litru ce se adaugă în apa de baie sau cu 3—5 g dintr-un amestec în părți egale de ulei de mentă și alcool); fricțiuni antireumatismale și în urticarii (ulei de mentă 5% în alcool); inhalatii (cu ulei picurat peste apă fierbinte sau chiar cu infuzie fierbinte). Intră în formula ceaiurilor antiastmatic, anticolitic, antidiareic, gastric, hepatic.

GENTIANA ASCLEPIADEA L. — FAM.
GENTIANACEAE

Fr.: Gentiane; G.: Enzian; M.: Fecsketárnics;
R.: Goreciavka lastovennaia.

Ghințura albastră, cunoscută și sub numele de Luminărica pământului, este o plantă ierboasă perenă, înaltă de 40–80 cm, cu frunze ovale opuse, dispuse seriat, flori albastre, pe tipul 5, în formă de clopot, așezate la subsuoara frunzelor.

Partea utilizată. Rădăcinile și rizomii (*Radix Gentianae asclepiadeae*) — VIII—X.

Ecologie, răspindire. Specie de umbră sau semiumbră, cu cerințe ridicate față de umiditate, crește pe văioage umede, la margini de poieni sau păduri, în zona montană, pe versanții umbriți ai dealurilor, coborînd pînă la 400–500 m, în tot arcu carpatic.

Recoltare. Cu cazmaua sau sapa.

Principii active. Principii amare (gentiopicrină, gentioamarină, amarogentină), ulei volatil, alcaloidul gentianină, tanin.

Acțiune farmacologică. Stimulent puternic al secrețiilor salivare și gastrice; antihelmintic; coleretic-colagog; antipiretic și antimalaric.

Recomandări majore. Gastrită hipoacidă, tulburări dispeptice.

Alte recomandări. Anorexie; stări de debilitate la copii; diskinezie biliară, colecistite; helmintiaze; maladii febrile (inclusiv malarie).

Mod de administrare. Infuzie sau decoct (1/2 linguriță la cană), cîte 1/4 cană înainte de mese; tinctură (20 g macerate 7–8 zile în 100 ml alcool), cîte 5–10 picături înainte de mese pentru copii, iar pentru adulți 15–20 picături; pulbere (0,2–2 g/zi); sirop tonic pentru copii (macerat la cald, din 1 lingură de plantă cu 150 ml apă în clocot timp de 6 ore, se strecoară, se adaugă 250 g zahăr și se fierbe pînă capătă consistență siropoasă; se iau 3–4 lingurițe pe zi, înainte de mese).
Intră în formula ceaiului tonic-aperitiv.



CENTAUREA CYANUS L. — FAM. COMPOSITAE

Fr.: Bleuets; **G.:** Kornblume; **M.:** Büzavirág; **R.:** Vasilek sinii.

Plantă anuală, erectă, înaltă de 0,5—1 m, cu frunze alterne, liniare, lungi de 8—9 cm și înguste de 4—9 mm, cu peri mătăsoși, flori albastre în antodii globuloase terminale.

Partea utilizată. Inflorescențele — impropriu „flori“ (Flores Cyani cum receptaculis) — VII—VIII.

Ecologie, răspândire. Buruiiană de culturi, tipică pentru semănăturile de grâu și de secară, uneori crește și pe marginea drumurilor și prin locuri uscate și pietroase în regiunea de cîmpie și de deal din întreaga țară.

Recoltare. Inflorescențele se rup întregi cu pedunculul sub 1 cm.

Principii active. Principii amare, tanin, glicozidul cicorina, mucilagii, antocianidine, săruri de potasiu.

Acțiune farmacologică. Diuretic ușor; calmant și antiseptic ocular; tonic-amar; antidiareic.

Recomandări majore. Conjunctivite, iritații și înroșiri ale pleoapelor (în uz extern).

Alte recomandări. Afecțiuni ale aparatului urinar (în special în amestec cu alte specii); reumatism; anorexie; diaree benignă.

Mod de întrebuințare. INT. — Infuzie (1/2 linguriță la cană) care se bea în 2—3 reprize. EXT. — Băi de ochi sau comprese cu infuzie (1 linguriță la cană).

Intră în compoziția ceaiului diuretic 2.



CICHORIUM INTYBUS L. — FAM. COMPOSITAE

Fr.: Chicorée sauvage; **G.:** Wegwarte; **M.:** Katángkóró;
R.: Țikorii abiknavennii.

Specie erbacee perenă, cu rozetă bazală de frunze alungite și neregulat crestate, tulpină ramificată, înaltă de 0,3—1 m, cu frunze mici, inflorescențe terminale și axilare cu flori ligulate albastre-azurii.

Partea utilizată. Rădăcinile (Radix Cichorii) — IX—XI; partea aeriană (Herba Cichorii) — VII—VIII.

Ecologie, răspîndire. Specie foarte răspîndită la noi în țară, cicoarea crește în pășuni și finețe, pe marginea drumurilor, a căilor ferate și șanțurilor, a culturilor, în locuri necultivate, din zonă de cîmpie pînă în cea montană.

Recoltare. Partea aeriană se taie în prima perioadă a înfloririi, cu tot cu rozeta bazală; rădăcinile se scot cu cazmaua.

Principii active. Glicozidul cicorină, inulină, aminoacizi esențiali, acid cicoric, un principiu amar (lactucina), tanin, ulei volatil.

Acțiune farmacologică. Coleretic-colagog, prin stimularea activității ficatului și a eliminării bilei pe care o și fluidifică; tonic-amar, ușor laxativ (îndeosebi rădăcina); depurativ: favorizează funcția glicogenetică a ficatului și calmează setea caracteristică a diabeticilor.

Recomandări majore. Diskinezie biliară, colecistopatii.

Alte recomandări. Anorexie; constipație (îndeosebi provocată de afecțiuni hepatice); furunculoză; acnee; diabet.

Mod de întrebuințare. Infuzie (1—2 lingurițe la cană), 2 cani pe zi.

Partea aeriană intră în compoziția ceaiului depurativ, iar rădăcina în pulberea laxativ-purgativă.



INDEX DE DENUMIRI POPULARE ROMÂNEȘTI

Afinul	176	Musețelul	10
Albăstrelele	226	Muștarul alb	11
Anasonul	84	Muștarul negru	12
Anghinarea	200	Nalba de cultură	17
Armurariul	202	Nalba de grădină	17
Arnica	148	Nalba mare	17
Brusturele	198	Nalba mică	17
Busuiocul	98	Negelarita	18
Cașul popii	174	Nucul	18
Cătina	118	Obligeana	32
Cerentelul	122	Odoleanul	19
Chimionul	82	Osul iepurelui	16
Cicoarea	228	Pădăcelul	16
Cimbrisorul	190	Păpădia	15
Cimbrul de cultură	192	Pătlagina	13
Cimbrul de grădină	186	Pelinul	14
Ciuboșica cucului	132	Pinul montan	11
Cireșul	72	Pirul medicinal	5
Ciuinul alb	56	Plăminărica	18
Ciuinul roșu	58	Popul negru	21
Coacăzul negru	160	Podbalul	14
Coadă calului	16	Porumbarul	7
Coadă racului	120	Porumbul	4
Coadă șoricelului	102	Răchitanul	16
Coriandrul	86	Răscoagea	16
Crușinul	80	Reventul	4
Dudul	32	Roinița	9
Fasolea	76	Rostopasca	10
Peniculul	130	Salcia	30
Fragul	68	Salcimul	7
Frasinul	44	Salvia	18
Gălbenelele	150	Săpunarița	3
Ghimpele	46	Sburătoarea	16
Ghințura albastră	224	Scaul vinăt	21
Ghințura galbenă	138	Schinulul	13
Hameiul	34	Socul	10
Holera	46	Stejarul	2
Iarba mare	140	Stinjenelul	21
Ienupărul	20	Sulfina	13
Inul	208	Sunătoarea	11
Ipcărigea	56	Șovîrvul	18
Isopul	220	Talpa găstei	18
Izma bună	222	Tarhonul	14
Jneapănul	18	Tătăneasa	21
Levănțica	216	Teiul	12
Lemnul dulce	206	Traista ciobanului	6
Lichenul de Islanda	14	Trei frați pătași	11
Lichenul de piatră	14	Troscotul	4
Luminărica	134	Turița mare	12
Luminărica pământului	224	Țintaura	19
Macul roșu de cîmp	158	Ungurașul	9
Măceșul	162	Urzica	3
Măghiranul	96	Urzica moartă albă	9
Mătăciunea	218	Valeriana	19
Menta	222	Vișinul	7
Merisorul	178	Viscul	3
Mesteacănul	22	Volbura	8
Murul	66	Zmeurul	6

INDEX DE DENUMIRI ȘTIINȚIFICE

Achillea millefolium	102	Majorana hortensis	96
Acorus calamus	52	Malva glabra	172
Agrimonia eupatoria	124	Malva neglecta	174
Agropyron repens	50	Marrubium vulgare	90
Althaea officinalis	78	Matricaria chamomilla	104
Althaea rosea var. nigra	170	Melilotus officinalis	126
Arctium lappa	198	Melissa officinalis	94
Arnica montana	148	Mentha piperita	222
Artemisia absinthium	142	Morus sp.	32
Artemisia dracunculus	144	Ocimum basilicum	98
Betula verrucosa	22	Ononis spinosa	164
Brassica nigra	112	Origanum vulgare	188
Calendula officinalis	150	Papaver rhoeas	158
Capsella bursa-pastoris	60	Phaseolus vulgaris	76
Carum carvi	82	Pimpinella anisum	84
Centaurea cyanus	226	Pinus montana	18
Centaureum umbellatum	194	Plantago sp.	136
Cerasus sp.	72	Polygonum aviculare	40
Cetraria islandica	14	Populus nigra	26
Chamaenerion angustifolium	168	Potentilla anserina	120
Chelidonium majus	108	Primula officinalis	132
Cichorium intybus	228	Prunus spinosa	70
Cnicus benedictus	152	Pulmonaria officinalis	180
Convolvulus arvensis	88	Quercus sp.	24
Coriandrum sativum	86	Rhamnus frangula	80
Crataegus sp.	62	Rheum sp.	42
Cynara scolymus	200	Ribes nigrum	160
Dracocephalum moldavica	218	Robinia pseudacacia	74
Equisetum arvense	16	Rosa canina	162
Eryngium planum	210	Rubus fruticosus	66
Foeniculum vulgare	130	Rubus idaeus	64
Fragaria vesca	68	Salix sp.	30
Fraxinus excelsior	44	Salvia officinalis	184
Gentiana asclepiadea	224	Sambucus nigra	100
Gentiana lutea	138	Saponaria officinalis	58
Geum urbanum	122	Satureja hortensis	186
Glycyrrhiza glabra	206	Silybum marianum	202
Gypsophila paniculata	56	Sinapis alba	110
Hippophaë rhamnoides	118	Symphytum officinale	214
Humulus lupulus	34	Taraxacum officinale	154
Hypericum perforatum	116	Thymus serpyllum	190
Hyssopus officinalis	220	Thymus vulgaris	192
Inula helenium	140	Tilia sp.	128
Iris germanica	212	Tussilago farfara	146
Juglans regia	26	Urtica dioica	36
Juniperus communis	20	Vaccinium myrtillus	176
Lamium album	92	Vaccinium vitis-idaea	178
Lavandula angustifolia	216	Valeriana officinalis	196
Leonurus cardiaca	182	Verbascum sp.	134
Linum usitatissimum	208	Viola tricolor	114
Lythrum salicaria	166	Viscum album	38
		Xanthium spinosum	46
		Zea mays	48

INDEX DE DENUMIRI ÎN LIMBA FRANCEZĂ

Absinthe	142
Acore aromatique	52
Agripaume	182
Aigremoine	124
Airelle myrtille	176
Airelle rouge	178
Anis	84
Anserine	120
Argentine	120
Argousier	118
Arnica	148
Artichaut	200
Aubépine	62
Aunée officinale	140
Bardane	198
Basilic	98
Benoît	122
Bleuet	226
Bois doux	206
Bouillon blanc	134
Bouleau	22
Bourdaie	80
Bourse-à-pasteur	60
Bugrane	164
Camomille commune	104
Cassis	160
Cerisier	72
Chardon benit	152
Chardon Marie	202
Chélidoine	108
Chêne	24
Chicorée sauvage	228
Chiendent	50
Consoude	214
Coquelicot	158
Coriandre	86
Cumin des prés	82
Eglantier	162
Estragon	144
Fenouil	130
Fraisier	68
Framboisier	64
Frêne	44
Genévrier commun	20
Gentiane	138, 224
Grande ortie	36
Griottier	72
Gui	38
Guimauve	78
Haricot	76
Houblon	34
Hysope	220
Iris	212
Lamier blanc	92
Lampourde	46
Lavande	216

Lichen d'Islande	14
Lin	208
Liseron des champs	84
Mais	46
Marjolaine	96
Marrube blanc	90
Matricaire	104
Mauve	172
Mauve arborée	170
Meillot	126
Mélisse	94
Mélisse de Moldavie	218
Mélisse turque	218
Menthe poivrée	222
Millefeuille	102
Millepertuis	116
Moutarde blanche	110
Moutarde noir	112
Mûre	66
Mûrier	32
Noyer	26
Origan	188
Osieur fleuri	168
Panicaut plane	210
Pavot rouge	154
Pensée sauvage	114
Peuplier noir	20
Petit centauree	194
Petit mauve	174
Pin de montagne	18
Pissenlit	154
Plantaine	136
Prele	10
Primevère	132
Prunellier	70
Pulmonaire	180
Queue-de-cheval	10
Réglisse	206
Renouée	40
Rhubarbe	42
Robinier	74
Ronce	66
Rose trémière	170
Salicaire	166
Saponaire d'Orient	56
Saponaire officinale	50
Sariette	186
Sauge	184
Saule	30
Serpolet	190
Souci	154
Sureau	100
Thym	192
Tilleul	120
Tussilage	146
Valériane	196

INDEX DE DENUMIRI ÎN LIMBA GERMANĂ

Ackerschachtelhalm	16
Ackerwinde	88
Alant	140
Anis	84
Artischocke	200
Baldrian	196
Basilic	98
Beinwell	214
Benediktenkraut	122
Benedikterkraut	152
Berg-Föhre	18
Bergwohlverleih	148
Birke	22
Blut-Weiderich	166
Bohne	76
Bohnenkraut	186
Brombeere	66
Citronen-Melisse	94
Distel	46
Dornige Spitzklette	46
Dost	188
Echte Kamille	104
Eibisch	78
Enzian	138, 224
Esche	44
Estragon	144
Faulbaum	86
Feldthymian	190
Fenchel	130
Feuer Mohn	158
Flachblättrige	
Männertreu	210
Gänsefingerkraut	120
Garten Thymian	192
Gelber Steinklee	126
Gemeine Käsepappel	174
Gemeine Robinie	74
Gemeines Seifenkraut	58
Gemeines Unholdenkraut	168
Grosse Brennessel	36
Hauhechel	164
Heidelbeere	176
Herzgespann	182
Himbeere	64
Hirtentäschel	60
Holunder	100
Hopfen	34
Huflattich	146
Hunds Rose	162
Iris	212
Isländisches Moos	14
Johanneskraut	116
Kalmus	52
Klette	198
Königskerze	134

Koriander	86
Kornblume	226
Kukuruz	48
Kultur Käsepappel	172
Kümmel	82
Lavendel	216
Lein	208
Linde	128
Löwenzahn	154
Lungenkraut	180
Mariendistel	202
Maulbeerbaum	32
Nessbaum	26
Odermennig	124
Pappelrose	170
Pfefferminze	222
Preisseibeere	178
Quecke	50
Quendel	190
Rhabarber	42
Rispiges Gypskraut	56
Ringelblume	150
Salbei	184
Sanddorn	118
Sauerkirsche	72
Schafgarbe	102
Schlehdorn	70
Schlüsselblume	132
Schöllkraut	108
Schwarze Johannisbeere	160
Schwarzer Senf	112
Schwarzpappel	28
Silber Weide	30
Stiefmütterchen	114
Stiel-Eiche	24
Stockrose	170
Süßholz	206
Tausendguldenkraut	194
Türkische Melisse	218
Vogelkirsche	72
Vogelknöterich	40
Vogelmistel	38
Wacholder	20
Wald-Erdbeere	68
Wegerich	136
Wegwarte	228
Weissdorn	62
Weisse Taubnessel	92
Weisser Adorn	90
Weisser Senf	110
Wermut	142
Wohlgemut	188
Wurstkraut	96
Ysop	220

INDEX DE DENUMIRI ÎN LIMBA MAGHIARĂ

Articsóka	200	Komló	34
Bab	76	Körömvirag	150
Bazsalikom	98	Közönséges nyirfa	22
Benedekfű	152	Kutyabenge	80
Bojtorján	198	Len	208
Boróka	20	Libapimpó	120
Borsos menta	222	Lilliom	212
Buglyós dercefü	56	Lökörmű martilapu	146
Búzavirág	226	Magas köris	44
Cickafarkkóró	102	Majorána	96
Citromfű	94	Málna	64
Cseresnyefa	72	Mályvarózsa	170
Csombord	186	Máriatövis	202
Diófa	26	Meggyfa	72
Édes kömény	130	Mehfű	94
Edesgyöker	206	Mezei macskagyöker	196
Eperfa	32	Mezei szulák	88
Erdei deréce	168	Mezei zsurló	16
Erdei szamóca	68	Nagy csalán	36
Fecsketárnics	224	Ökörfarkkóró	134
Fehér akác	74	Orbánfű	116
Fehér árvacsálan	92	Örvénygyöker	140
Fehér fagyöngy	38	Orvosi kálmos	52
Fehér fűz	30	Orvosi kankalin	132
Fehér mustár	110	Orvosi pemetefű	90
Fehér üröm	142	Orvosi somkóró	126
Fekete áfonya	176	Orvosi székfű	104
Kekete bodza	100	Orvosi ziliz	78
Kekete mustár	112	Orvosi zsálya	184
Kekete nadálytő	214	Papsajt	172
Kekete nyárfa	28	Pászortaska	60
Kekete ribizke	160	Paszuly	76
Füzény	166	Patika parlófű	124
Galagonya	62	Pongyola pitypang	154
Gyepű rózsá	162	Porcsinfű	40
Gyömbérgyöker	122	Rebarbara	42
Gyöngyajak	182	Szagos levendula	216
Hamvas szeder	66	Szappanfű	58
Harcsa	128	Szerbtövis	46
Hegyi arnika	148	Szurokfű	188
Homoktövis	118	Tarackbúza	50
Izlandi zuzmó	14	Tárkony	144
Izóp	220	Tárnic	138
Katángkóró	228	Törökbúza	48
Kék iringó	210	Törpefenyő	18
Keleti anizs	84	Tövises iglic	164
Kerek levelű mályva	174	Tüdőfű	180
Kerti kakukkfű	192	Utifű	136
Kerti sárkányfű	218	Vadárvácska	114
Kis ezerjófű	194	Vadkakukkfű	190
Kocsányos tölg	24	Vérehulló fecskefű	108
Koriánder	86	Vetési pipacs	158
Kökény	70	Vörös áfonya	178
Köménymag	82		

INDEX DE DENUMIRI ÎN LIMBA RUȘĂ

Ablepiha krušinovidnaia	118	Lopuh balșoi	198
Aduvancik lekarstvennii	154	Maioran sadovii	96
Air	52	Mak samaseika	158
Akopnik lekarstvennii	214	Malina	64
Altai lekarstvennii	78	Mati-i-macieha	146
Amela belaia	38	Medunița lekarstvennaia	180
Anis	84	Melissa lekarstvennaia	94
Arch grețkil	26	Miata perecinaia	222
Arnica gornaia	148	Milnianska lekarstvennaia	58
Asakori	28	Mojjevelnik abiknavennii	20
Bazilik kamfornii	98	Nogotki	150
Bereza pavislaia	22	Pastușia sumka	
Boiarișnik adnopesticinii	62	abiknavennaia	60
Brusnika	178	Pervoțvet vesenii	132
Buzina ciornaia	100	Pirei palzucii	50
Claber sadovii	186	Podarojnik	136
Ciernica abiknavennaia	176	Polini estragon	144
Cistatei balșoi	108	Polini gorkaia	142
Derienik ivolistnii	166	Prasvirnik lesnoi	172
Deviasil visokii	140	Prasvirnik prenebrejennii	174
Donnik lekarstvennii	126	Pustirnik piatilopastnii	182
Dub	24	Repeinicek aptecinii	124
Durnișnik igolciatii	46	Revent tangutskii	42
Dușia abiknavennaia	188	Robinia lojnoakația	74
Ejevika	66	Romașka aptecinaia	104
Fasoli abiknavennaia	76	Romașka lekarstvennaia	104
Fenheli abiknavennii	130	Roza sabacia	162
Fialka trehțvetnaia	114	Salfei lekarstvennii	184
Gareț pticii	40	Salodka golaia	206
Gorcița belala	110	Silibum	202
Gorcița ciornaia	112	Sinegolovnik ploskalistnii	210
Goreciavka jioltaia	138	Sliva kaliuciaia	70
Goreciavka lastovennaia	224	Smaradina ciornaia	160
Gravilat tarodscoi	122	Sosna koha	18
Hmeli abiknavennii	34	Stalnik kaliucii	164
Hvoșci palevoi	16	Șandra abiknavennaia	90
Iaseni visokii	44	Șcitokroza rozovaia	170
Iasnotka belaia	92	Timian abiknavennii	192
Islandski lșainik	14	Timian palzucii	190
Issop	220	Tisiacielistnic	102
Iva	30	Tmin	82
Ivan ceai	168	Tut	32
Kacim metelciatii	56	Țikorii abiknavennii	228
Kasatik ghermanskii	212	Ținara	200
Kiprei uskolistnii	168	Valeriana lekarstvennaia	196
Koriandr pasevnoi	86	Vasilek sinii	226
Koroviac	134	Vișnia abiknavennaia	72
Krapiva dvudomnaia	36	Vișnia pticia	72
Krușcina olhavidnaia	80	Viunok	88
Kukuruza	48	Volciț kudriavii	152
Lapciatka gușinaia	120	Zalatotisiacinik malii	194
Lavanda kalasovaia	216	Zemlianka lesnaia	68
Len	208	Zmeegalovnik moldavskii	218
Lipa	128	Zveroboi abiknavennii	116

DICTIONAR DE TERMENI FITOTERAPEUTICI

ACNEE — erupții (coșuri), indeosebi pe față, dar și pe umeri, pe partea superioară a toracelui, la tineri.

ALGIE — senzație de durere localizată (ex. nevralgie — de nervi, mialgie — de mușchi ș.a.).

AMENOREE — oprirea menstruelor.

ANACIDITATE — lipsa acidului clorhidric din suc gastric.

ANAFRODISIAC — inhibitor al apetitului sexual exagerat.

ANALGETIC — principiu activ care suprimă sau inhibă temporar durerea.

ANGINA — durere datorată unor inflamații acute cu irigare insuficientă a zonei respective (de ex. angina pectorală care se manifestă în zona inimii).

ANOREXIE — lipsa poftei de mâncare.

ANTIABIETICE — plante cu acțiune hipoglicemiantă, utilizate ca adjuvante în tratamentul diabetului.

ANTHELMINTICE — cu acțiune împotriva viermilor intestinali (sin. vermifuge).

ANTILITIAZICE — plante care previn și combat formarea calculilor.

ANTIPIRETICE — principii active care combat febra.

ANTISPASTICE — principii active care diminuează sau suprimă durerea.

ANXIETATE — stare de neliniște, teamă, însoțită de palpații și insomnii.

APERITIV — stimulent al poftei de mâncare.

ARITMIE — tulburare a ritmului cardiac normal.

ASCARICID — vermifug cu acțiune specifică asupra ascarizilor (limbricilor).

ASTRINGENT — principiu activ (de regulă din grupa taninurilor) care produce o stringere a țesuturilor (în general la nivelul capilarelor și orificiilor); în această categorie intră antiidiareicele și antihemoragicele.

ATONIE — lipsa tonusului muscular al unui organ.

AZOTEMIE — acumularea în sînge a produșilor azotați degradați.

BALSAMIC — care alină și vindecă rănilor.

BLEFARITĂ — inflamarea pleoapelor și a rădăcinii genelor.

BRADICARDIZANT — care duce la rădăcinii genelor.

BRONȘITĂ — inflamarea bronhiilor.

CALCULOZĂ — afecțiune care se manifestă prin depunerea de concreții (calculi) în diverse organe (vezica biliară — c. biliară, rinichi — c. renală, vezica urinară — c. veziculă ș.a.).

CARMINATIVE — specii de plante care favorizează eliminarea gazelor din intestine.

CATAR — stare inflamatorie a unei mucoase interne (digestivă, respiratorie etc.).

CICATRIZANTE — specii de plante care favorizează vindecarea rănilor.

CISTITĂ — inflamație a vezicii urinare.

COLAGOGE — plante stimulente ale contracției vezicii biliare și ale evacuării bilei în intestin.

COLECISTITĂ — inflamație acută sau cronică a vezicii biliare.

COLERETICE — specii care stimulează secrețiile celulei hepatice și prin aceasta volumul de bilă.

COLICĂ — durere abdominală (de ex. renală, hepatică).

COLITĂ — inflamație a intestinului gros.

DECLORURANT — care duce la eliminarea de clorură de sodiu prin urină.

DECONGESTIVE — plante cu efecte de înlăturare sau reducere a congestiei unor țesuturi sau organe.

DEPURATIVE — specii de plante care ajută la eliminarea toxinelor din sînge și din organism, în general.

DISKINEZIE BILIARĂ — tulburare funcțională motorie a căilor biliare care duce la greutate în scurgerea bilei, însoțite de manifestări dureroase.

DISPEPSIE — tulburare digestivă, dificultate în digerarea alimentelor.

DIURETICE — plante care duc la creșterea cantității de urină eliminată de organism.

DRASTIC — purgativ foarte puternic.

ECHIMOZĂ — vinătaie.

EDEM — acumulare de lichid în spațiul intercelular.

EMENAGOGE — principii active care favorizează apariția ciclului menstrual întârziat sau suprimat.

EMFIZEM — umflarea unui țesut prin infiltrarea în el a aerului sau a lichidelor seroase.

EMOLIENTE — substanțe care diminuează stările de inflamație ale mucoaselor.

ENTERITĂ — inflamația intestinului subțire.

ESTROGEN — substanță cu acțiune stimulantă asupra organelor și caracterelor sexuale feminine.

EUPEPTICE — plante care ajută la stabilirea unei digestii normale.

EXPECTORANTE — plante care provoacă fluidificarea și eliminarea secrețiilor traheo-bronhice.

FARINGITĂ — inflamația faringelui.

FEBRIFUGE — specii care scad febra.

FLATULENȚĂ — eliminarea gazelor intestinale.

GALACTOGOGE — plante care stimulează secreția de lapte.

GINGIVITĂ — inflamația gingiilor.

GLICOZURIE — simptom al diabetului care constă în prezența glucozei în urină.

HELMINTIAZĂ — boală produsă prin infestarea cu viermi paraziți.

HEMOPTIZIE — pierdere de sînge prin gură care provine dintr-o hemoragie bronhopulmonară.

HEMOSTATIC — care oprește hemoragia.

HIDROPIZIE — retenție de apă în țesuturi.

HIPERTROFIE — mărirea volumului unui organ.

HIPNOTIC — care provoacă somnul.

HIPOGLICEMIANTE — plante care duc la micșorarea glicemiei, cu efecte favorabile în diabet.

HIPOTENSOARE — specii cu acțiune în diminuarea tensiunii arteriale.

INAPETENȚĂ — lipsa poftei de mâncare.

ISCHEMIE — suferință provocată de circulația sanguină deficitară în unele organe (de ex. ischemie cardiacă).

LARINGITĂ — inflamarea laringelui.

LAXATIVE — plante care provoacă o purgație ușoară, fără a irita mucoasa intestinală.

LEUCOREE — scurgere vaginală purulentă (sin. poală albă).

LITIAZĂ — vezi Calculoză.

LITONTRIPTICE — specii care au proprietatea de a mărunți unii calculi, ajutînd la eliminarea lor.

MATURATIV — cu efecte în grăbirea colectării unor abcese, furuncule.

MELENĂ — eliminarea prin scaun a sîngelui provenit dintr-o hemoragie a tubului digestiv.

METEORISM — balonarea abdomenului din cauza acumulării de gaze în stomac sau intestin.

MIGRENĂ — durere de cap.

NARCOTIC — anestezic general.

NERVIN — tonic al sistemului nervos.

NEUROSEDATIV — calmant al sistemului nervos.

NEVRALGIE — senzație de durere.

NEFRITĂ — inflamația rinichiului.

PANARIȚIU — inflamație supurativă a țesuturilor din jurul unghiilor.

PECINGINE — boală a pielii caracterizată prin apariția de vezicule și bule al căror conținut devine purulent, apoi se ulcerează și se acoperă de cruste (sin, impetigo).

PIELITĂ — inflamația bazinețului renal.

PIROZIS — senzație de arsură la nivelul stomacului.

PRURIT — mâncărime de piele.

PSORIAZIS — boală de piele care apare sub formă de pete roșii ce se acoperă de scuame și se extind.

PURGATIVE — materii prime vegetale care determină evacuarea conținutului intestinal.

REVULSIVE — specii de plante care, aplicate extern, produc o congestie locală superficială, având ca efect decongestionarea unor organe interne.

SEBOREE — producere accentuată de sebum.

SEDATIV — calmant.

SOPORIFIC — somnifer.

SPASMOLITICE — plante care suprimă spasmele.

STOMACHICE — specii de plante care favorizează digestia.

STOMATITĂ — inflamația mucoasei bucale.

SUDORIFICE — plante care au proprietatea de a mări sudorația, favorizând scăderea temperaturii și eliminarea toxinelor.

TENIFUGE — specii vermifuge utilizate contra teniei.

TONICE APERITIVE — plante care măresc pofta de mâncare.

TRAHEITĂ — inflamarea traheei.

TRICHOMONOZĂ — boală produsă de protozoarul flagelat parazit *Trichomonas vaginalis*, caracterizată prin inflamația vaginului.

UREMIE — intoxicație a organismului cu uree și acid uric, datorită nefuncționării normale a rinichiului.

URETRITĂ — inflamarea uretrei.

UTEROTONIC — cu efect de tonifiere a uterului, în special după naștere.

VAZODILATATOR — care produce dilatarea vaselor sanguine.

VERMIFUGE — specii de plante care produc expulzarea viermilor intestinali.

VULNERARE — plante utilizate în uzul extern pentru vindecarea rănilor.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

ALEXAN M. — Minidictionar de plante medicinale; Almanahul Sănătatea, București, 1983.

ALEXAN M. — Ghidul micului culegător de plante medicinale; Recoop, București, 1976.

BOJOR O., ALEXAN M. — Plantele medicinale — izvor de sănătate; Ed. Ceres, București, 1981.

BOJOR O., ALEXAN M. — Plantele medicinale de la A la Z; Recoop, București, 1983.

BÖRNGEN S. — Pflanzen helfen heilen; Ed. Volk und Gesundheit, Berlin, 1981.

BORZA AL. — Dictionar etnobotanic; Ed. Academiei, București, 1968.

BRAUN H. — Heilpflanzen-Lexicon für Ärzte und Apotheker; Ed. Gustav Fischer, Stuttgart—New York, 1978.

BUTURĂ V. — Enciclopedie de etnobotanică românească; Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1979.

COICIU E., RACZ G. — Plante medicinale și aromatice; Ed. Academiei, București, 1962.

CONSTANTINESCU C. — Plantele medicinale în apărarea sănătății (ed. a III-a); Recoop, București, 1971.

CONSTANTINESCU D. GR., BOJOR O. — Plantele medicinale; Ed. Medicală, București, 1969.

CONSTANTINESCU D. GR., CONSTANTINESCU C. — Formular fitoterapeutic; Ed. Ministerului Sănătății și Prevederilor Sociale, București, 1958.

CONSTANTINESCU D. GR., HAȚIEGANU ELENA — Plantele medicinale; Ed. Medicală, București, 1979.

CRĂCIUN FL., BOJOR O., ALEXAN M. — Farmacia naturii, vol. I—II; Ed. Ceres, București, 1976—1977.

CRĂCIUN FL., CONSTANTINESCU A. — Plante medicinale și aromatice cultivate; Centrocoop, București, 1969.

CSEDŐ K., FUZI I., GIURGIU M., KISGYÖRGY Z., LAZA A., RACZ G. — Plantele medicinale și condimentare din județul Harghita; Tg. Mureș, 1979.

DEBUIGNE G. — Dictionnaire des plantes qui guérissent; Ed. Larousse, Paris, 1972.

- DOBRESCU D. — Farmacoterapie; Ed. Medicală, București, 1981.
- GRIGORESCU E., STĂNESCU U. — Farmacognozie, vol. I—III; Ed. I.M.F., Iași, 1974—1977.
- HERAUD A. — Nouveau dictionnaire des plantes médicinales; Ed. Librairie Baillière et Fils, Paris, 1932.
- IONESCU-STOIAN ST., SAVOPOL E. — Extracte farmaceutice vegetale; Ed. Medicală, București, 1977.
- KROCHMAL A., WALTERS R., DOUGHTY R. — A guide to medicinal plants of Appalachia; Ed. U. S. Department of Agriculture, Washington, 1971.
- LAZA A., RACZ G. — Plante medicinale și aromatice; Ed. Ceres, București, 1975.
- MOCANU ȘT., RĂDUCANU D. — Plantele medicinale în terapeutică; Ed. Militară, București, 1983.
- NIKITOCIKIN T. — Lekarstvennie rastenia; Ed. Izobrazitelnoe iskustvo, Moscova, 1977.
- PAHLOW M. — Heilpflanzen Kompass; Ed. Gräfe und Unzer, München, 1981.
- PETCU P., ANDRONESCU E., RADU A., BEDELEANU D., ȚĂRMURE C., BORZA V. — Cercetări biochimice asupra speciei *Xanthium spinosum* L.; Lucrările celui de al VII-lea Congres Național de Farmacie, București, 1979.
- POPESCU M. — Galenoterapia; Ed. Presa, București, 1943.
- SCHADEWALDT H., KNEFELI U., BOSSARD E., SCHULTES R. E., VONARBURG B., DAEMS W. — Heilpflanzen und ihre Kräfte; Ed. Lingen, Köln, 1978.
- SCHNEIDER E. — La santé par les aliments; Ed. SdT, Demmarie les Lys, 1975.
- TODOR I. — Mic atlas de plante din flora R.S.R.; Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1968.
- VALNET J. — Aromathérapie; E. Maloine, Paris, 1972.
- * * * — Dicționar medical, vol. I—II; Ed. Medicală, București, 1969.
- * * * — Farmacopeea română, ed. a IX-a; Ed. Medicală, București, 1969.
- * * * — Flora R.P.R. — R.S.R., vol. I—XIII; Ed. Academiei, București, 1952—1977.